제2부 » 주요통계결과

Ⅲ. 이환 및 의료이용

1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률
2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태
3. 질환별 인지율
4. 의료이용

Ⅲ. 이환 및 의료이용


1. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

- 충청북도의 만성·급성질환 및 사고중독 경험률(조율)은 2013년 전체 10.1%, 남자 7.3%, 여자 12.8%로 여자가 훨씬 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다<그림 89>. 또한 교육수준별로는 무학이 25.9%, 직업별로는 기타 14.2%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 22.1%로 가장 높았다<표 147>.
- 만성·급성질환 및 사고중독 경험률(표준화율)은 2013년 전체 8.9%로, 전년 8.4% 대비 0.5%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 7.3%에 비해 1.6%p 높았다. 또한 2010년 이후에는 해마다 소폭 증가하는 추세를 보였다<그림 89>.
- 2013년 시군구 단위 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 최소 3.3%(진천군)~최대 16.3%(옥천군)에 분포하고 있고, 13.0%p의 차이가 난다<그림 90>.
- 2013년 결과 옥천군, 음성군은 전국 중앙값(시군구 단위) 7.0% 보다 높은 편이고 진천, 청주 상당구는 낮은 편이다<그림 90>.
- 충청북도의 2013년 만성·급성질환 및 사고중독 경험률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 청주 흥덕구, 옥천군에서 증가하였고 제천시, 진천군에서는 감소하였다<그림 90>. 또한 제천시, 증평군은 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 53>.


<표 53> 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	6.3(0.9)	3.9(0.7)	16.1(1.2)	13.1(1.9)	14.5(1.2)	10.9(1.8)	13.5(1.2)	10.5(1.6)
단양군	1.5(0.4)	0.8(0.3)	9.4(1.0)	5.9(0.7)	11.4(1.3)	9.8(1.3)	6.8(1.0)	4.4(0.7)
보은군	4.1(0.8)	3.1(0.9)	3.4(0.7)	2.7(0.8)	9.3(1.2)	8.8(1.5)	7.6(1.2)	7.0(1.3)
영동군	5.6(1.0)	3.9(0.6)	3.4(0.8)	3.0(0.6)	7.0(1.0)	4.7(0.8)	8.8(1.5)	6.1(1.0)
옥천군	14.1(1.7)	10.6(1.0)	16.7(1.3)	12.9(1.3)	16.3(1.4)	12.2(1.2)	17.2(1.9)	16.3(1.7)
음성군	9.5(1.1)	7.8(0.8)	18.5(1.5)	16.6(1.5)	18.0(1.9)	13.8(1.1)	18.6(1.4)	16.0(1.4)
제천시	11.1(1.3)	9.9(1.1)	10.3(1.1)	8.9(1.0)	9.3(1.0)	8.1(0.9)	8.0(1.0)	6.0(0.7)
증평군	14.0(2.0)	13.0(1.3)	14.6(1.5)	12.6(1.1)	13.4(2.0)	11.5(1.0)	12.2(2.8)	10.9(1.2)
진천군	12.7(1.7)	11.5(1.2)	6.8(0.9)	6.1(0.9)	0.8(0.3)	0.6(0.3)	3.1(0.7)	3.3(0.8)
청원군	2.1(0.5)	1.9(0.5)	5.5(0.6)	4.7(0.7)	5.8(0.9)	5.4(0.8)	9.6(1.0)	8.0(0.7)
청주 상당구	6.2(0.7)	6.0(0.7)	5.6(0.7)	5.4(0.7)	7.5(1.1)	7.2(0.9)	3.9(0.7)	3.8(0.6)
청주 흥덕구	2.1(0.4)	2.1(0.5)	5.5(0.8)	5.8(0.8)	9.1(1.2)	9.3(1.0)	12.2(1.3)	12.1(1.0)
충주시	5.7(0.9)	5.0(0.8)	11.1(1.0)	9.2(0.9)	11.3(1.2)	9.5(0.9)	11.3(1.2)	9.3(0.9)
충청북도	5.9(0.3)	5.2(0.2)	8.4(0.3)	7.4(0.3)	9.5(0.4)	8.4(0.3)	10.1(0.4)	8.9(0.4)
국민건강영양조사	22.2(0.7)	21.1(0.6)	19.8(0.7)	18.7(0.7)	16.6(0.6)	15.5(0.6)	-	-



〈그림 89〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률



〈그림 90〉 시군구별 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

2. 주요 질환별 평생 의사진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압


(1) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 고혈압 평생 의사진단 경험률(조율)은 2013년 전체 23.6%, 남자 21.7%, 여자 25.5%로 여자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가할수록 증가하여 70대 이상에서 가장 높았다<그림 91>. 또한 교육수준별로는 무학 53.3%, 직업별로는 기타 35.8%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 46.7%로 가장 높았다.
- 30세 이상 고혈압 평생 의사진단 경험률(표준화율)은 2013년 전체 19.5%로, 전년 19.8% 대비 0.3%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 18.6%에 비해 0.9%p 높았다. 또한 2010년 이후에는 해마다 증가하였으나, 2013년에는 2012년에 비해 0.3%p만큼 감소하였다<그림 91>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 고혈압 평생 의사진단 경험률은 최소 15.9%(청원군)~최대 23.6%(충주시)에 분포하고 있고, 7.7%p의 차이가 난다<그림 92>.
- 2013년 결과 충주시, 괴산군은 전국 중앙값(시군구 단위) 18.9% 보다 높은 편이고 청원군은 낮은 편이다<그림 92>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 고혈압 평생 의사진단 경험률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해 보면 금년도는 괴산군, 충주시에서 증가하였고 청원군에서는 감소하였으나 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 92>. 특히 괴산군, 충주시는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 54>.


<표 54> 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	30.5(1.6)	18.5(1.1)	28.7(1.9)	19.1(1.5)	33.4(1.7)	20.6(1.5)	34.0(2.0)	23.0(2.4)
단양군	28.5(1.8)	20.4(1.3)	29.1(1.8)	20.5(1.2)	29.5(1.8)	20.0(1.2)	32.0(1.9)	22.3(1.5)
보은군	31.0(1.7)	20.4(1.3)	35.4(1.8)	24.3(1.8)	35.1(1.8)	23.2(1.5)	34.2(1.6)	21.4(1.7)
영동군	29.6(1.8)	20.4(1.3)	32.3(2.0)	21.5(1.4)	29.2(1.6)	19.0(1.3)	33.4(1.8)	22.6(1.6)
옥천군	24.7(1.6)	17.9(1.2)	30.9(1.8)	22.3(1.4)	30.9(2.0)	22.1(1.4)	30.1(1.9)	18.9(1.2)
음성군	27.3(1.8)	22.6(1.3)	26.5(1.6)	21.5(1.2)	26.5(1.3)	21.1(1.2)	26.8(1.6)	21.6(1.4)
제천시	21.8(1.4)	17.2(1.1)	25.2(1.8)	20.0(1.2)	27.8(1.7)	22.3(1.4)	25.7(1.8)	19.4(1.2)
증평군	21.7(1.9)	19.1(1.4)	20.1(1.7)	17.1(1.2)	23.9(1.6)	20.3(1.3)	23.0(2.4)	19.7(1.3)
진천군	24.5(1.5)	20.5(1.2)	22.0(1.4)	17.5(1.1)	26.1(1.6)	21.3(1.2)	25.8(1.7)	20.2(1.1)
청원군	19.5(1.5)	16.6(1.1)	22.3(1.4)	19.4(1.2)	20.9(1.4)	17.8(1.3)	18.8(1.6)	15.9(1.1)
청주 상당구	20.1(1.7)	19.6(1.3)	18.9(1.3)	18.3(1.2)	19.6(1.3)	18.1(1.2)	20.4(1.7)	18.6(1.2)
청주 흥덕구	14.1(1.1)	15.4(1.1)	17.3(1.4)	18.3(1.3)	17.6(1.4)	18.6(1.3)	17.6(1.5)	18.3(1.2)
충주시	23.8(1.4)	19.8(1.2)	24.8(1.4)	20.4(1.3)	25.8(1.6)	20.9(1.3)	28.6(1.6)	23.6(1.3)
충청북도	21.2(0.5)	18.3(0.4)	22.8(0.5)	19.4(0.4)	23.4(0.5)	19.8(0.4)	23.6(0.6)	19.5(0.4)



〈그림 91〉 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 92〉 시군구별 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30)


(2) 고혈압 약물치료율(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 고혈압 약물치료율(조율)은 2013년 전체 90.1%, 남자 85.4%, 여자 93.9%로 여자에서 매우 높았다. 연령대별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가할수록 증가하여 70대 이상에서 가장 높았다<그림 93>. 또한 교육수준별로는 중학교 졸업 96.0%, 직업별로는 기타 94.1%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 94.2%로 가장 높았다.
- 30세 이상 고혈압 약물치료율(표준화율)은 2013년 전체 89.0%로, 전년 87.2% 대비 1.8%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 88.8%에 비해 0.2%p 높았다. 또한 2011년에는 2010년 대비 2.6%p 증가하였으나, 2012년에 1.6%p 감소하였다가 2013년에 다시 0.2%p 만큼 증가하였다<그림 93>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 고혈압 약물치료율은 최소 82.8%(청주 상당구)~최대 93.4%(충주시)에 분포하고 있고, 10.6%p의 차이가 난다<그림 94>.
- 2013년 결과 충주시 전국 중앙값(시군구 단위) 88.6% 보다 높은 편이고 청주 상당구는 낮은 편이고, 대부분의 지역에서는 비슷한 편이었다<그림 94>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 고혈압 약물치료율은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 충주시, 보은군에서 증가하였고 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 94>. 또한 괴산군, 보은군, 옥천군은 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 55>.


<표 55> 고혈압 약물치료율(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	91.7(1.6)	85.9(2.3)	92.1(1.9)	87.5(2.1)	91.0(2.0)	88.3(3.1)	94.0(1.7)	89.8(2.5)
단양군	94.7(1.5)	94.0(1.6)	93.4(1.9)	90.6(1.4)	91.6(1.6)	88.2(2.3)	88.9(2.5)	89.1(2.1)
보은군	91.2(2.2)	86.1(2.3)	89.4(2.2)	86.7(2.2)	92.6(1.5)	89.6(1.5)	93.4(1.5)	91.4(2.8)
영동군	89.0(2.1)	85.1(2.7)	91.0(1.9)	87.2(2.0)	93.6(1.7)	92.5(2.1)	90.3(1.9)	87.3(1.9)
옥천군	86.8(2.5)	85.3(2.8)	89.7(2.1)	88.1(2.4)	93.7(2.0)	89.7(2.0)	92.6(2.2)	90.6(2.2)
음성군	89.3(2.2)	87.1(1.7)	89.7(2.2)	87.9(2.4)	92.0(1.9)	90.8(2.1)	89.8(2.5)	89.3(1.8)
제천시	90.9(2.8)	83.2(3.3)	94.6(1.4)	93.1(1.9)	90.0(2.1)	89.6(2.1)	91.9(2.0)	89.4(2.0)
증평군	79.0(3.9)	78.8(3.0)	93.1(2.0)	93.0(1.8)	94.0(1.8)	92.9(1.9)	89.4(2.9)	89.4(2.3)
진천군	90.5(2.2)	90.8(2.1)	88.6(2.6)	86.0(3.1)	87.5(2.3)	86.8(2.2)	91.4(2.1)	89.1(2.4)
청원군	94.8(1.8)	92.7(2.4)	90.0(2.2)	89.2(2.0)	87.3(3.6)	87.5(2.4)	89.5(2.7)	89.3(2.2)
청주 상당구	82.4(3.6)	82.8(3.2)	86.9(3.2)	85.9(2.3)	86.9(2.6)	85.1(2.6)	84.4(2.5)	82.8(2.7)
청주 흥덕구	86.9(3.3)	87.3(2.4)	86.4(3.0)	86.3(2.3)	77.1(3.3)	81.3(3.0)	88.2(2.2)	87.6(2.3)
충주시	84.5(2.7)	81.6(2.5)	91.6(2.0)	91.0(2.1)	92.0(2.0)	90.0(1.7)	93.4(1.6)	93.4(1.6)
충청북도	87.9(1.0)	86.2(0.9)	89.8(0.8)	88.8(0.8)	87.9(0.9)	87.2(0.9)	90.1(0.7)	89.0(0.8)



〈그림 93〉 고혈압 약물치료율(≥30)



〈그림 94〉 시군구별 고혈압 약물치료율(≥30)


(3) 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 고혈압 관리교육 이수율(조율)은 2013년 전체 27.0%, 남자 27.3%, 여자 26.8%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 50대에서 가장 높았고, 60대에서 가장 낮았다<그림 95>. 또한 교육수준별로는 대학교 졸업 이상 33.7%, 직업별로는 농림어업 34.3%, 월 가구소득별로는 200~300만원이 33.4%로 가장 높았다.
- 30세 이상 고혈압 관리교육 이수율(표준화율)은 2013년 전체 26.8%로, 전년 33.3% 대비 6.5%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 26.3%에 비해 0.5%p 높았다. 또한 2012년 에는 2011년 대비 5.7%p 증가하였으나, 2013년에 다시 6.5%p 만큼 감소하였다<그림 95>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 고혈압 관리교육 이수율은 최소 6.7%(청주 흥덕구)~최대 71.0%(영동군)에 분포하고 있고, 64.3%p의 차이가 난다<그림 96>.
- 2013년 결과 영동군, 증평군은 전국 중앙값(시군구 단위) 23.6% 보다 높은 편이고 청주 흥덕구, 청원군은 낮은 편이다<그림 96>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 고혈압 관리교육 이수율은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 단양군, 영동군에서 증가하였고 제천시, 청원군에서는 감소하였다<그림 96>. 또한 단양군, 영동군, 증평군, 진천군, 청주 상당구는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 56>.


〈표 56〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	45.5(3.9)	43.9(3.3)	21.1(3.3)	20.8(3.5)	21.3(3.2)	20.7(3.3)
단양군	2.3(0.9)	2.1(0.8)	9.6(2.2)	8.3(1.7)	32.0(4.2)	30.3(3.1)
보은군	34.2(4.0)	31.7(2.7)	25.8(3.9)	24.0(2.7)	22.5(3.9)	22.1(3.0)
영동군	52.4(4.2)	52.3(3.4)	66.9(3.7)	65.4(3.2)	71.7(3.9)	71.0(2.9)
옥천군	30.0(3.3)	27.1(2.8)	40.6(3.8)	39.0(3.1)	40.1(4.7)	38.1(3.4)
음성군	9.3(2.5)	9.9(2.3)	54.2(4.8)	55.2(3.7)	42.5(4.4)	41.1(3.5)
제천시	49.7(3.3)	51.0(2.9)	28.9(3.6)	27.1(2.9)	21.4(2.5)	20.3(2.7)
증평군	40.4(5.9)	40.3(4.4)	47.7(6.6)	47.8(4.1)	49.9(9.7)	50.0(4.6)
진천군	5.6(1.9)	4.9(1.6)	6.4(1.9)	7.1(2.0)	5.3(1.5)	7.3(1.9)
청원군	22.5(3.3)	22.3(3.1)	23.2(3.0)	23.2(2.8)	6.3(1.6)	7.0(1.4)
청주 상당구	17.3(3.1)	17.0(2.7)	29.7(2.7)	28.9(3.0)	30.2(3.3)	31.3(3.5)
청주 흥덕구	14.5(2.8)	13.9(3.1)	29.2(3.8)	27.5(3.3)	6.4(1.3)	6.7(2.0)
충주시	41.8(3.0)	41.7(3.1)	47.7(5.0)	47.0(3.4)	41.4(3.6)	41.5(3.3)
충청북도	27.4(1.0)	27.6(1.1)	33.8(1.3)	33.3(1.2)	27.0(1.1)	26.8(1.0)



〈그림 95〉 고혈압 관리교육 이수율(≥30)



〈그림 96〉 시군구별 고혈압 관리교육 이수율(≥30)

나. 당뇨병


(1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 당뇨병 평생 의사진단 경험률(조율)은 2013년 전체 8.9%, 남자 9.5%, 여자 8.3%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가할수록 증가하여 70대 이상에서 가장 높았다<그림 97>. 또한 교육수준별로는 무학 19.4%, 직업별로는 기타 14.0%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 16.9%로 가장 높았다.
- 30세 이상 당뇨병 평생 의사진단 경험률(표준화율)은 2013년 전체 7.3%로, 전년 6.8% 대비 0.5%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 7.3%와 같았다. 또한 2011년에는 2010년 대비 1.0%p 증가하였으나, 2012년에 1.0%p 감소하였다가 2013년에 다시 0.5%p 만큼 증가하였다<그림 97>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 당뇨병 평생 의사진단 경험률은 최소 6.1%(청원군)~최대 8.5%(충주시)에 분포하고 있고, 2.4%p의 차이가 난다<그림 98>.
- 2013년 결과 충주시, 음성군은 전국 중앙값(시군구 단위) 7.2% 보다 높은 편이고 청원군은 낮은 편이다<그림 98>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 당뇨병 평생 의사진단 경험률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해 보면 금년도는 제천시에서 증가하였고 청주 상당구에서는 감소하였으나 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 98>. 또한 보은군은 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 57>.


<표 57> 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	10.0(1.0)	7.2(0.9)	11.8(1.2)	8.0(0.9)	11.9(1.2)	7.7(1.0)	12.7(1.2)	7.8(0.8)
단양군	11.0(1.2)	7.8(0.9)	10.7(1.2)	7.7(0.9)	11.4(1.0)	7.7(0.9)	11.8(1.2)	7.9(0.9)
보은군	10.9(1.1)	8.8(1.2)	12.0(1.2)	8.6(1.1)	11.2(1.1)	8.3(1.1)	10.6(1.2)	7.8(1.3)
영동군	8.9(1.0)	6.4(0.8)	9.6(1.0)	7.0(1.0)	8.5(1.1)	5.8(0.8)	8.5(0.9)	7.0(1.1)
옥천군	9.8(1.2)	7.5(0.9)	9.5(1.0)	6.8(0.8)	11.8(1.2)	8.3(0.9)	10.6(1.0)	7.0(0.8)
음성군	9.7(1.2)	8.3(1.0)	11.9(1.3)	9.7(1.0)	8.9(1.0)	6.9(0.8)	10.7(1.2)	8.4(0.9)
제천시	8.4(0.8)	6.6(0.7)	6.6(0.9)	5.3(0.6)	8.3(1.0)	6.8(0.8)	10.9(1.3)	8.3(0.9)
증평군	6.1(0.7)	5.4(0.8)	9.8(1.4)	8.6(1.0)	10.5(1.5)	8.8(1.0)	8.1(1.2)	6.9(0.8)
진천군	11.2(1.1)	9.8(1.1)	8.8(1.0)	7.5(0.8)	10.3(1.1)	8.1(0.8)	10.3(1.2)	8.2(0.9)
청원군	7.0(0.9)	6.0(0.8)	8.7(1.1)	7.3(0.8)	7.2(1.2)	6.4(0.9)	7.2(0.8)	6.1(0.6)
청주 상당구	7.2(1.1)	7.2(0.9)	10.0(1.2)	9.4(1.0)	7.4(1.1)	6.6(0.8)	7.1(0.8)	6.5(0.8)
청주 흥덕구	5.5(0.9)	6.2(0.8)	8.3(1.2)	9.1(1.0)	5.5(0.9)	5.8(0.8)	7.1(0.9)	7.2(0.9)
충주시	9.3(1.0)	7.8(0.8)	7.9(0.9)	7.0(0.9)	9.8(0.9)	7.9(0.8)	10.9(1.0)	8.5(0.8)
충청북도	7.9(0.3)	6.8(0.3)	9.0(0.4)	7.8(0.3)	8.1(0.4)	6.8(0.3)	8.9(0.3)	7.3(0.3)



〈그림 97〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 98〉 시군구별 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30)


(2) 당뇨병 치료율(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 당뇨병 치료율(조율)은 2013년 전체 89.0%, 남자 87.6%, 여자 90.6%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 60대에서 가장 높았고, 30대에서 가장 낮았다<그림 99>. 또한 교육수준별로는 초등학교 졸업 95.2%, 직업별로는 기타 92.2%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 93.6%로 가장 높았다.
- 30세 이상 당뇨병 치료율(표준화율)은 2013년 전체 88.0%로, 전년 89.0% 대비 1.0%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 86.7%에 비해 1.3%p 높았다. 또한 2010년 이후 해마다 증가하였으나, 2013년에는 2012년에 비해 1.0%p 만큼 감소하였다<그림 99>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 당뇨병 치료율은 최소 76.8%(단양군)~최대 93.3%(청주 흥덕구)에 분포하고 있고, 16.5%p의 차이가 난다<그림 100>.
- 2013년 결과 청주 흥덕구, 충주시는 전국 중앙값(시군구 단위) 86.5% 보다 높은 편이고 단양군, 제천시는 낮은 편이다<그림 100>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 당뇨병 치료율은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 청주 흥덕구, 증평군에서 증가하였고 제천시, 단양군에서는 감소하였으나 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 100>. 특히 증평군, 청주 흥덕구는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 58>.


<표 58> 당뇨병 치료율(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	87.1(4.4)	83.6(2.1)	90.6(2.7)	85.9(3.1)	87.5(3.3)	81.2(2.9)	91.2(2.9)	86.4(4.0)
단양군	91.8(3.2)	92.0(2.6)	88.6(3.4)	86.2(3.0)	83.6(4.2)	80.9(4.0)	81.9(4.2)	76.8(4.7)
보은군	86.0(3.5)	85.7(3.6)	93.8(2.9)	91.7(2.2)	86.1(4.0)	84.4(3.2)	90.1(4.0)	87.3(4.4)
영동군	89.4(4.4)	80.8(3.9)	89.4(3.1)	87.2(3.4)	90.3(4.2)	85.7(5.0)	84.5(5.0)	83.6(3.8)
옥천군	89.4(3.1)	87.3(2.7)	82.6(3.9)	79.8(5.0)	84.2(4.1)	80.0(3.6)	84.9(4.4)	81.9(3.9)
음성군	90.0(3.1)	87.6(3.5)	86.3(3.7)	82.5(3.5)	83.0(5.1)	78.7(4.4)	90.8(2.4)	89.8(2.1)
제천시	89.8(3.5)	89.8(2.3)	93.1(2.9)	88.4(3.3)	91.9(3.0)	92.3(2.9)	86.3(3.9)	79.3(4.0)
증평군	83.5(5.8)	75.2(4.9)	84.3(4.3)	81.0(4.1)	87.1(4.1)	86.3(4.0)	87.5(5.1)	87.0(3.9)
진천군	86.1(3.6)	87.0(3.6)	83.6(4.2)	83.4(3.6)	73.9(5.0)	72.5(4.5)	82.4(5.3)	84.8(2.6)
청원군	85.0(4.7)	81.0(5.1)	84.0(4.6)	79.9(4.0)	88.5(3.5)	86.0(3.9)	89.4(3.8)	84.1(2.6)
청주 상당구	79.9(4.6)	77.5(3.7)	87.9(3.2)	89.0(2.7)	84.7(4.1)	81.5(4.6)	81.6(5.1)	82.3(4.5)
청주 흥덕구	87.2(5.7)	79.6(4.2)	83.2(4.4)	84.3(3.5)	93.2(4.0)	92.1(2.4)	92.5(3.0)	93.3(3.7)
충주시	85.5(3.7)	82.7(3.4)	87.6(3.1)	88.8(3.0)	98.5(1.5)	94.7(2.4)	95.6(1.9)	90.9(2.6)
충청북도	86.4(1.5)	85.3(1.5)	86.5(1.4)	86.7(1.3)	89.1(1.2)	89.0(1.2)	89.0(1.2)	88.0(1.3)



〈그림 99〉 당뇨병 치료율(≥30)



〈그림 100〉 시군구별 당뇨병 치료율(≥30)


(3) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 당뇨병 관리교육 이수율(조율)은 2013년 전체 32.6%, 남자 30.5%, 여자 35.0%로 여자가 높았다. 연령대별로는 30대에서 가장 높았고, 50대에서 가장 낮았다<그림 101>. 또한 교육수준별로는 대학교 졸업 이상 38.0%, 직업별로는 사무직 51.7%, 월 가구소득별로는 300-400만원이 38.6%로 가장 높았다.
- 30세 이상 당뇨병 관리교육 이수율(표준화율)은 2013년 전체 33.8%로, 전년 38.4% 대비 4.6%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 32.7%에 비해 1.1%p 높았다. 또한 2012년에는 2011년 대비 6.6%p 증가하였으나, 2013년에 다시 4.6%p 만큼 감소하였다<그림 101>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 당뇨병 관리교육 이수율은 최소 12.8%(청주 흥덕구)~최대 72.4%(영동군)에 분포하고 있고, 59.6%p의 차이가 난다<그림 102>.
- 2013년 결과 영동군, 증평군은 전국 중앙값(시군구 단위) 30.9% 보다 높은 편이고 청주 흥덕구, 진천군은 낮은 편이다<그림 102>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 당뇨병 관리교육 이수율은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 단양군, 음성군에서 증가하였고 제천시, 괴산군에서는 감소하였다<그림 102>. 또한 단양군, 영동군, 옥천군, 증평군은 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 59>.


<표 59> 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	56.0(5.3)	55.2(4.6)	30.2(5.0)	28.3(3.6)	21.5(3.6)	18.5(3.1)
단양군	7.7(2.5)	7.4(2.4)	19.3(4.5)	17.4(4.2)	33.6(5.8)	33.3(5.2)
보은군	32.4(4.7)	32.5(4.5)	27.1(5.0)	23.9(4.4)	24.2(5.0)	24.3(4.3)
영동군	55.7(5.7)	55.5(5.6)	71.4(5.8)	68.8(3.7)	71.6(5.3)	72.4(4.3)
옥천군	39.5(6.0)	37.1(4.5)	41.7(5.7)	39.3(5.2)	47.6(6.4)	42.5(5.3)
음성군	9.2(3.4)	7.6(2.4)	58.5(5.7)	59.7(5.2)	52.3(5.3)	49.5(5.5)
제천시	70.6(5.3)	68.0(5.1)	41.5(5.2)	42.4(4.7)	28.9(5.1)	27.4(4.8)
증평군	43.3(8.3)	41.7(5.8)	48.4(9.4)	46.3(6.3)	51.8(7.8)	51.1(6.8)
진천군	10.1(2.5)	8.7(2.6)	16.4(4.6)	17.1(3.9)	13.9(4.0)	13.0(3.7)
청원군	27.6(4.4)	26.3(4.8)	21.1(3.3)	19.5(3.7)	14.4(3.5)	14.5(2.7)
청주 상당구	18.1(3.9)	16.4(2.3)	38.3(3.7)	40.0(5.5)	36.3(5.1)	37.8(5.0)
청주 흥덕구	20.8(3.6)	20.3(4.4)	27.9(6.8)	24.7(5.2)	15.9(5.0)	12.8(3.9)
충주시	53.3(5.2)	53.3(5.0)	54.5(5.3)	53.6(4.6)	47.5(5.8)	45.8(4.3)
충청북도	31.0(1.5)	31.8(1.7)	38.6(1.8)	38.4(1.8)	32.6(1.9)	33.8(1.8)



〈그림 101〉 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)



〈그림 102〉 시군구별 당뇨병 관리교육 이수율(≥30)


(4) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(조율)은 2013년 전체 27.0%, 남자 25.6%, 여자 28.6%로 여자가 더 높았다. 연령대별로는 50대에서 가장 높았고, 40대에서 가장 낮았다<그림 103>. 또한 교육수준별로는 중학교 졸업 36.4%, 직업별로는 판매·서비스직 35.3%, 월 가구소득별로는 200-300만원이 32.3%로 가장 높았다.
- 30세 이상 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(표준화율)은 2013년 전체 27.0%로, 전년 31.2% 대비 4.2%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 31.2%에 비해 4.2%p 낮았다. 또한 2010년 이후에는 해마다 감소하는 추세를 보였다<그림 103>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율은 최소 5.2%(단양군)~최대 42.8%(증평군)에 분포하고 있고, 37.6%p의 차이가 난다<그림 104>.
- 2013년 결과 증평군, 청주 상당구는 전국 중앙값(시군구 단위) 30.9% 보다 높은 편이고 단양군, 영동군은 낮은 편이다<그림 104>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 증평군, 청원군에서 증가하였고 단양군, 청주 흥덕구에서는 감소하였다<그림 104>.


〈표 60〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	31.2(4.7)	30.9(4.6)	27.1(4.5)	26.6(4.1)	49.8(4.4)	46.5(4.3)	32.8(4.3)	33.3(3.2)
단양군	34.0(5.9)	36.3(5.9)	22.7(5.3)	20.4(3.9)	23.0(5.5)	25.2(4.2)	7.9(2.5)	5.2(1.8)
보은군	22.6(4.8)	23.4(3.9)	21.8(3.9)	20.1(3.8)	24.5(4.0)	24.2(4.5)	26.7(4.8)	27.1(4.3)
영동군	21.7(4.6)	20.4(4.3)	19.6(4.3)	20.0(4.8)	24.1(5.4)	22.8(4.7)	13.7(3.5)	13.4(3.7)
옥천군	37.3(5.1)	35.5(5.0)	28.4(5.8)	26.8(5.1)	36.6(5.2)	32.2(4.2)	30.2(5.4)	29.3(5.0)
음성군	27.6(6.0)	27.6(4.7)	40.5(4.6)	38.8(4.6)	28.7(7.1)	22.5(4.6)	28.4(4.8)	28.8(5.2)
제천시	35.1(4.8)	32.3(4.9)	39.7(5.4)	37.5(5.3)	28.0(5.9)	29.7(5.0)	26.2(4.6)	24.6(4.2)
증평군	34.0(7.1)	30.5(5.7)	28.9(5.5)	26.5(4.4)	24.7(4.4)	21.7(4.3)	43.5(6.6)	42.8(5.8)
진천군	35.5(5.3)	36.0(5.0)	25.6(5.1)	24.1(4.5)	9.1(3.4)	8.7(3.0)	13.8(3.7)	15.9(3.6)
청원군	16.1(4.5)	15.9(4.8)	31.2(5.0)	30.3(4.6)	17.7(3.1)	16.2(3.1)	30.6(4.6)	31.3(4.7)
청주 상당구	42.4(6.8)	43.6(5.0)	24.3(4.6)	21.1(3.7)	38.7(5.4)	35.2(4.7)	40.5(5.8)	40.6(5.1)
청주 흥덕구	40.8(6.2)	36(4.5.0)	35.2(4.7)	36.5(5.2)	26.6(3.6)	22.5(3.8)	17.6(4.5)	18.3(4.8)
충주시	49.4(4.1)	47.1(4.1)	46.7(5.4)	50.4(5.0)	46.1(3.8)	45.6(4.5)	32.8(3.9)	34.7(4.3)
충청북도	36.1(1.9)	35.5(1.7)	32.6(1.7)	32.4(1.8)	31.1(1.5)	31.2(1.7)	27.0(1.6)	27.0(1.6)



〈그림 103〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)



〈그림 104〉 시군구별 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30)


(5) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(조율)은 2013년 전체 28.1%, 남자 29.0%, 여자 27.0%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 50대에서 가장 높았고, 40대에서 가장 낮았다<그림 105>. 또한 교육수준별로는 고등학교 졸업 32.9%, 직업별로는 판매·서비스직 39.4%, 월 가구소득별로는 300-400만원이 42.7%로 가장 높았다.
- 30세 이상 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(표준화율)은 2013년 전체 28.2%로, 전년 39.2% 대비 11.0%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 29.9%에 비해 1.7%p 낮았다. 또한 2012년에는 2011년 대비 7.4%p 증가하였으나, 2013년에 다시 11.0%p 만큼 감소하였다<그림 105>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율은 최소 9.2%(단양군)~최대 42.3%(증평군)에 분포하고 있고, 33.1%p의 차이가 난다<그림 106>.
- 2013년 결과 증평군, 청주 상당구는 전국 중앙값(시군구 단위) 28.5% 보다 높은 편이고 단양군, 영동군은 낮은 편이다<그림 106>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 증평군, 청주 상당구에서 증가하였고 영동군, 충주시에서는 감소하였다<그림 106>. 또한 보은군, 증평군은 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 61>.


〈표 61〉 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	38.3(5.1)	39.0(4.6)	50.3(4.3)	46.8(3.6)	31.5(4.0)	32.1(3.5)
단양군	18.3(4.5)	17.8(3.9)	25.0(5.7)	27.2(4.1)	10.1(3.3)	9.2(3.2)
보은군	19.8(4.2)	18.8(3.3)	22.1(4.4)	21.9(4.3)	27.6(5.4)	28.5(4.1)
영동군	21.2(4.8)	22.6(4.4)	41.8(5.6)	42.5(5.2)	10.7(3.4)	10.6(3.5)
옥천군	27.4(5.7)	26.4(5.1)	45.7(5.6)	40.6(4.1)	28.5(5.3)	27.6(4.8)
음성군	40.0(5.2)	37.3(4.3)	27.2(6.9)	30.1(4.6)	22.3(4.4)	24.5(5.2)
제천시	34.3(5.8)	32.6(5.1)	39.1(5.4)	41.2(5.1)	30.2(4.5)	28.9(4.3)
증평군	16.8(4.0)	15.3(3.6)	15.6(3.5)	16.1(4.1)	40.5(6.0)	42.3(5.9)
진천군	17.0(4.5)	16.6(4.1)	18.9(4.8)	19.8(4.0)	16.0(3.0)	15.7(3.3)
청원군	23.2(4.2)	25.2(4.7)	20.9(5.8)	20.8(4.9)	25.3(4.3)	22.4(4.0)
청주 상당구	19.4(3.7)	17.3(3.4)	42.4(5.9)	42.1(4.1)	40.4(5.3)	40.0(6.0)
청주 흥덕구	40.6(5.0)	42.1(5.7)	32.4(5.0)	30.3(5.9)	21.3(6.2)	19.5(5.3)
충주시	49.3(6.2)	51.4(5.1)	70.7(3.6)	69.0(4.1)	38.0(4.5)	38.8(4.2)
충청북도	31.8(1.8)	31.8(1.9)	39.4(1.7)	39.2(1.9)	28.1(1.8)	28.2(1.8)



〈그림 105〉 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)



〈그림 106〉 시군구별 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30)

다. 관절염


(1) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)

- 충청북도의 50세 이상 관절염 평생 의사진단 경험률(조율)은 2013년 전체 24.1%, 남자 10.1%, 여자 36.5%로 여자가 3배 이상 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다<그림 107>. 또한 교육수준별로는 무학 45.8%, 직업별로는 기타 32.0%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 37.4%로 가장 높았다.
- 50세 이상 관절염 평생 의사진단 경험률(표준화율)은 2013년 전체 24.1%로, 전년 24.0% 대비 0.1%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 20.7%에 비해 3.4%p 높았다. 또한 2010년 이후에는 해마다 소폭 증가하는 추세를 보였다 <그림 107>.
- 2013년 시군구 단위 50세 이상 관절염 평생 의사진단 경험률은 최소 17.7%(청주 흥덕구)~최대 34.3%(음성군)에 분포하고 있고, 16.6%p의 차이가 난다<그림 108>.
- 2013년 결과 음성군, 보은군은 전국 중앙값(시군구 단위) 20.5% 보다 높은 편이고 청주 흥덕구, 영동군은 낮은 편이다<그림 108>.
- 충청북도의 2013년 50세 이상 관절염 평생 의사진단 경험률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해 보면 금년도는 음성군에서 증가하였고 영동군, 청주 흥덕구에서는 감소하였으나 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 108>.


<표 62> 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	31.5(1.7)	28.8(1.6)	29.0(2.0)	27.0(1.5)	35.3(1.8)	32.9(1.8)	29.7(2.1)	27.8(1.7)
단양군	22.5(2.2)	21.4(1.6)	24.4(1.5)	22.7(1.8)	26.4(1.9)	25.4(1.6)	26.6(1.6)	25.2(1.9)
보은군	26.6(1.8)	23.1(1.5)	33.2(1.9)	31.9(1.9)	32.8(1.9)	30.5(1.8)	32.1(1.9)	29.4(1.7)
영동군	26.5(1.8)	23.7(1.7)	18.9(1.6)	17.1(1.7)	23.5(1.8)	21.5(1.6)	19.8(1.6)	18.0(1.4)
옥천군	30.5(2.1)	27.7(1.9)	32.8(1.9)	29.5(1.7)	34.5(2.1)	32.5(2.0)	30.3(1.8)	28.8(1.8)
음성군	31.3(2.4)	30.5(2.0)	20.6(1.9)	20.4(1.6)	22.3(2.0)	20.7(1.9)	34.2(2.6)	34.3(2.2)
제천시	27.9(1.9)	28.0(1.6)	25.2(2.0)	25.2(1.8)	26.4(1.6)	26.1(1.7)	25.7(1.7)	25.9(1.8)
증평군	22.2(2.2)	21.5(2.1)	26.4(2.2)	24.2(1.9)	24.1(2.4)	23.5(2.0)	26.2(2.1)	25.5(1.9)
진천군	29.7(2.1)	27.8(1.9)	23.2(1.9)	22.0(1.8)	20.1(1.9)	19.4(1.8)	26.8(2.2)	25.8(2.0)
청원군	15.6(1.6)	15.2(1.6)	29.7(2.8)	28.8(2.1)	23.8(2.0)	23.2(1.8)	25.0(1.9)	24.2(1.7)
청주 상당구	23.9(2.3)	24.8(1.8)	21.5(2.6)	22.3(2.2)	23.9(2.3)	25.5(2.2)	22.5(2.3)	23.6(1.8)
청주 흥덕구	16.8(2.0)	18.8(1.9)	18.9(2.1)	21.1(2.2)	18.3(1.9)	21.1(2.2)	16.1(2.0)	17.7(2.1)
충주시	28.0(1.9)	26.9(1.7)	23.9(1.7)	23.9(1.7)	24.9(2.1)	24.5(1.7)	25.0(2.2)	25.4(1.7)
충청북도	24.2(0.7)	23.7(0.6)	23.9(0.7)	23.9(0.7)	24.3(0.7)	24.0(0.6)	24.1(0.7)	24.1(0.6)



〈그림 107〉 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)



〈그림 108〉 시군구별 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)


(2) 관절염 관리교육 이수율(≥50)

- 충청북도의 50세 이상 관절염 관리교육 이수율(조율)은 2013년 전체 23.6%, 남자 24.9%, 여자 23.3%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 연령이 증가할수록 증가하여 70대 이상에서 가장 높았다<그림 109>. 또한 교육수준별로는 무학 28.7%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 27.5%로 가장 높았다.
- 50세 이상 관절염 관리교육 이수율(표준화율)은 2013년 전체 23.3%로, 전년 33.8% 대비 10.5%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 22.8%에 비해 0.5%p 높았다. 또한 2012년에는 2011년 대비 6.1%p 증가하였으나, 2013년에 다시 10.5%p 만큼 감소하였다<그림 109>.
- 2013년 시군구 단위 50세 이상 관절염 관리교육 이수율은 최소 2.5%(진천군)~최대 61.7%(증평군)에 분포하고 있고, 59.2%p의 차이가 난다<그림 110>.
- 2013년 결과 증평군, 음성군은 전국 중앙값(시군구 단위) 18.8% 보다 높은 편이고 진천군, 괴산군은 낮은 편이다<그림 110>.
- 충청북도의 2013년 50세 이상 관절염 관리교육 이수율은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 단양군, 증평군에서 증가하였고 제천시, 괴산군에서는 감소하였다<그림 110>. 또한 단양군, 영동군, 증평군은 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 63>.


〈표 63〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	41.7(4.0)	41.1(3.3)	11.8(2.1)	11.8(2.0)	3.9(0.7)	3.6(0.7)
단양군	1.3(0.9)	1.2(0.7)	8.8(2.3)	8.8(2.2)	41.3(4.5)	40.3(4.1)
보은군	48.4(4.4)	48.4(3.8)	34.0(3.6)	32.2(3.3)	26.2(3.7)	28.9(3.3)
영동군	54.7(4.7)	52.2(4.8)	56.3(4.6)	54.9(4.5)	51.8(5.3)	55.1(4.2)
옥천군	29.3(3.8)	28.7(3.6)	34.9(4.0)	35.4(3.5)	32.8(3.8)	32.1(3.4)
음성군	20.2(4.1)	18.1(3.6)	63.8(6.2)	63.6(5.4)	55.7(4.9)	54.9(4.2)
제천시	43.0(4.0)	41.5(4.1)	28.8(4.2)	27.1(4.1)	10.7(2.5)	10.3(2.4)
증평군	31.7(5.6)	30.0(4.9)	41.0(8.0)	41.9(5.9)	62.3(8.5)	61.7(5.2)
진천군	2.9(1.4)	3.7(1.9)	7.5(2.6)	6.9(2.4)	2.9(1.3)	2.5(1.1)
청원군	19.4(4.4)	20.1(3.6)	14.8(2.2)	15.0(3.0)	7.2(2.1)	6.9(2.3)
청주 상당구	23.5(4.1)	23.3(4.3)	42.6(4.1)	41.6(4.4)	26.4(4.2)	26.4(4.0)
청주 흥덕구	12.5(2.4)	10.4(3.4)	30.5(4.3)	28.8(3.9)	5.3(3.0)	4.8(2.5)
충주시	38.5(3.4)	36.7(3.8)	50.7(4.6)	51.3(3.9)	29.4(3.5)	29.4(3.0)
충청북도	27.7(1.2)	27.7(1.3)	34.7(1.4)	33.8(1.3)	23.6(1.1)	23.3(1.0)



〈그림 109〉 관절염 관리교육 이수율(≥50)



〈그림 110〉 시군구별 관절염 관리교육 이수율(≥50)

라. 이상지질혈증(고지혈증 포함)


(1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

- 충청북도의 30세 이상 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(조율)은 2013년 전체 14.0%, 남자 12.8%, 여자 15.1%로 여자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 60대에서 가장 높았다<그림 111>. 또한 교육수준별로는 초등학교 졸업 21.6%, 직업별로는 기타 17.7%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 18.9%로 가장 높았다.
- 30세 이상 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(표준화율)은 2013년 전체 12.5%로, 전년 12.3% 대비 0.2%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 10.8%에 비해 1.7%p 높았다. 또한 2011년 이후 해마다 소폭 증가하는 추세를 보였다<그림 111>.
- 2013년 시군구 단위 30세 이상 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률은 최소 9.1%(청주 상당구)~최대 16.1%(옥천군·충주시)에 분포하고 있고, 7.0%p의 차이가 난다<그림 112>.
- 2013년 결과 옥천군, 충주시, 단양군은 전국 중앙값(시군구 단위) 10.8% 보다 높은 편이고 청주 상당구, 영동군은 낮은 편이다<그림 112>.
- 충청북도의 2013년 30세 이상 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 진천군, 괴산군, 보은군에서 증가하였고 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 112>. 또한 영동군은 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 64>.


<표 64> 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	8.8(1.1)	7.9(1.2)	13.5(1.4)	10.4(1.1)	13.6(1.4)	12.4(2.2)
단양군	13.9(1.4)	13.1(1.3)	15.1(1.4)	14.4(1.4)	17.7(1.3)	15.8(1.5)
보은군	9.0(1.0)	7.6(1.1)	13.6(1.2)	11.9(1.4)	15.0(1.5)	13.0(1.6)
영동군	10.4(1.4)	9.8(1.3)	11.7(1.2)	9.6(1.1)	11.1(1.3)	9.5(1.2)
옥천군	16.4(1.6)	15.3(1.5)	20.4(1.7)	17.3(1.7)	19.8(1.6)	16.1(1.5)
음성군	11.6(1.1)	10.3(1.0)	9.8(1.2)	8.3(1.0)	12.3(1.6)	10.9(1.1)
제천시	12.3(1.2)	10.7(1.0)	16.2(1.3)	14.1(1.2)	15.6(1.2)	13.2(1.1)
증평군	9.5(1.5)	8.8(1.1)	12.9(1.3)	12.0(1.2)	11.6(1.3)	10.6(1.3)
진천군	11.8(1.2)	11.5(1.2)	13.0(1.3)	11.8(1.1)	17.6(1.3)	15.5(1.3)
청원군	10.0(1.1)	9.3(1.1)	11.5(1.1)	11.3(1.2)	12.3(1.1)	11.5(1.0)
청주 상당구	9.6(1.1)	9.5(1.0)	9.5(1.0)	8.9(1.0)	9.9(1.2)	9.1(1.0)
청주 흥덕구	9.2(1.1)	9.5(1.0)	14.2(1.4)	14.0(1.2)	13.2(1.3)	13.2(1.2)
충주시	16.4(1.4)	15.1(1.2)	16.1(1.2)	14.2(1.1)	18.5(1.3)	16.1(1.2)
충청북도	11.3(0.4)	10.5(0.4)	13.5(0.5)	12.3(0.4)	14.0(0.5)	12.5(0.4)



〈그림 111〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)



〈그림 112〉 시군구별 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30)

3. 질환별 인지율


가. 대사증후군 인지율

- 충청북도의 대사증후군 인지율(조율)은 2013 년 전체 31.1%, 남자 28.7%, 여자 33.5%로 여자가 훨씬 높았다. 연령대별로는 40대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 가장 낮았다<그림 113>. 또한 교육수준별로는 대학교 졸업 이상 43.8%, 직업별로는 전문행정관리 44.7%, 월 가구소득별로는 400만원 이상이 38.7%로 가장 높았다.
- 대사증후군 인지율(표준화율)은 2013년 전체 31.8%로, 전년 24.8% 대비 7.0%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 28.5%에 비해 3.3%p 높았다. 또한 2010년 이후 해마다 증가하는 추세를 보였다<그림 113>.
- 2013년 시군구 단위 대사증후군 인지율은 최소 18.1%(영동군)~최대 40.6%(증평군)에 분포하고 있고, 22.5%p의 차이가 난다<그림 114>.
- 2013년 결과 증평군, 진천군은 전국 중앙값(시군구 단위) 27.5% 보다 높은 편이고 영동군, 제천시는 낮은 편이다<그림 114>.
- 충청북도의 2013년 대사증후군 인지율은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 영동군에서 비슷한 수준이었으며 대다수의 지역에서 증가하였다<그림 114>. 또한 괴산군, 단양군, 보은군, 진천군, 청주 흥덕구는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 65>.


〈표 65〉 대사증후군 인지율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	11.2(1.4)	14.0(1.9)	14.9(1.6)	17.8(2.0)	24.7(1.9)	29.3(2.8)	24.5(2.1)	29.5(3.0)
단양군	9.1(1.7)	11.4(1.6)	13.9(1.8)	15.3(1.6)	21.7(1.7)	25.9(1.8)	23.9(1.6)	27.9(1.8)
보은군	13.6(1.8)	17.2(1.9)	14.2(2.2)	20.0(2.6)	18.0(1.9)	21.5(2.2)	22.4(2.7)	31.5(2.7)
영동군	10.2(1.3)	14.2(1.7)	17.2(2.0)	23.4(2.0)	16.2(2.1)	20.4(2.0)	14.9(1.9)	18.1(2.1)
옥천군	13.6(1.3)	17.3(1.5)	14.0(1.6)	17.2(1.6)	20.9(2.1)	24.3(1.9)	22.2(1.7)	26.7(2.0)
음성군	16.2(1.7)	17.6(1.4)	8.9(1.2)	9.9(1.2)	32.9(2.0)	36.9(1.8)	23.5(2.1)	26.1(1.8)
제천시	15.7(1.4)	16.5(1.3)	17.1(1.4)	18.8(1.5)	23.2(1.8)	25.1(1.7)	21.2(1.4)	23.4(1.7)
증평군	20.9(2.2)	22.1(1.6)	15.7(2.2)	17.2(1.6)	29.9(2.1)	31.6(1.7)	39.3(1.9)	40.6(1.9)
진천군	12.4(1.4)	13.3(1.4)	17.2(1.5)	18.1(1.5)	28.4(1.5)	30.1(1.6)	35.3(2.1)	37.3(1.9)
청원군	13.9(1.9)	14.6(1.4)	17.6(1.6)	18.7(1.4)	13.7(1.1)	14.2(1.3)	32.1(2.3)	33.4(1.6)
청주 상당구	26.9(1.7)	26.5(1.6)	27.8(1.7)	27.6(1.5)	27.7(1.6)	27.4(1.5)	37.1(1.9)	36.5(1.6)
청주 흥덕구	16.3(1.8)	16.0(1.3)	22.7(1.7)	22.0(1.3)	27.4(1.6)	26.7(1.4)	35.1(1.6)	33.9(1.5)
충주시	17.1(1.4)	18.6(1.5)	16.5(1.3)	17.4(1.4)	18.4(1.6)	18.6(1.5)	33.3(1.7)	32.9(1.5)
충청북도	17.0(0.6)	17.9(0.5)	19.3(0.6)	20.4(0.5)	23.9(0.6)	24.8(0.6)	31.1(0.6)	31.8(0.6)



〈그림 113〉 대사증후군 인지율



〈그림 114〉 시군구별 대사증후군 인지율


나. 에이즈 인지율

- 충청북도의 에이즈 인지율(조율)은 2013년 전체 81.4%, 남자 84.7%, 여자 78.1%로 남자가 훨씬 높았다. 연령대별로는 30대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 가장 낮았다<그림 115>. 또한 교육수준별로는 대학교 졸업 이상 93.8%, 직업별로는 사무직 94.6%, 월 가구 소득별로는 400만원 이상이 90.9%로 가장 높았다.
- 에이즈 인지율(표준화율)은 2013년 전체 84.5%로, 전년 87.2% 대비 2.7%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 79.0%에 비해 5.5%p 높았다. 또한 2011년에는 2010년 대비 0.6%p 감소하였으나, 2012년에 2.4%p 증가하였다가 2013년에 다시 2.7%p 만큼 감소하였다<그림 115>.
- 2013년 시군구 단위 에이즈 인지율은 최소 72.7%(영동군)~최대 89.6%(제천시·충주시)에 분포하고 있고, 16.9%p의 차이가 난다<그림 116>.
- 2013년 결과 제천시, 충주시, 진천군은 전국 중앙값(시군구 단위) 78.8% 보다 높은 편이고 영동군, 단양군은 낮은 편이다<그림 116>.
- 충청북도의 2013년 에이즈 인지율은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 단양군, 충주시에서 증가하였고 청주 상당구, 영동군에서는 감소하였다<그림 116>.


〈표 66〉 에이즈 인지율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	70.4(2.9)	77.2(2.2)	68.2(2.1)	79.1(2.0)	76.6(1.5)	87.0(1.2)	64.6(2.2)	78.4(2.1)
단양군	50.1(3.2)	56.4(2.3)	69.2(2.0)	81.4(1.2)	56.6(3.2)	65.2(2.3)	65.5(2.1)	74.6(1.7)
보은군	71.5(2.2)	80.9(1.7)	66.1(2.0)	82.4(1.5)	73.2(1.6)	86.6(1.1)	61.0(2.0)	77.8(1.6)
영동군	68.1(2.5)	79.0(1.5)	74.7(2.0)	85.2(1.3)	69.5(2.7)	79.5(1.7)	61.7(2.8)	72.7(2.4)
옥천군	76.0(1.8)	85.0(1.0)	68.4(2.1)	78.1(1.4)	77.6(1.5)	86.7(1.2)	70.9(2.1)	82.0(1.3)
음성군	81.6(1.6)	86.4(1.0)	75.1(1.7)	80.3(1.2)	80.5(1.5)	86.8(0.9)	76.3(1.9)	80.8(1.4)
제천시	83.3(1.4)	85.1(1.5)	88.4(1.1)	91.0(0.8)	89.1(1.0)	92.5(0.7)	85.0(1.3)	89.6(0.8)
증평군	77.4(2.5)	80.7(1.4)	76.0(2.2)	80.3(1.2)	84.0(2.0)	86.7(1.1)	84.0(2.3)	86.4(1.0)
진천군	80.8(1.8)	84.7(1.2)	71.7(2.1)	77.1(1.5)	86.3(1.4)	89.1(1.0)	83.0(1.5)	87.9(1.0)
청원군	81.3(1.5)	83.2(1.2)	73.8(1.6)	76.0(1.3)	77.2(1.9)	81.7(1.2)	80.5(1.6)	83.8(1.0)
청주 상당구	93.9(0.9)	94.0(0.7)	92.8(0.9)	92.6(0.8)	93.2(0.7)	92.9(0.8)	81.0(1.6)	81.6(1.2)
청주 흥덕구	87.9(1.2)	86.6(0.9)	91.2(1.1)	89.5(1.0)	90.4(1.0)	89.5(0.9)	88.2(1.2)	87.4(1.1)
충주시	81.8(1.4)	84.6(1.1)	77.8(1.5)	81.7(1.1)	80.3(1.3)	84.0(1.1)	85.8(1.2)	89.6(0.8)
충청북도	83.2(0.5)	85.4(0.4)	82.4(0.5)	84.8(0.4)	84.4(0.4)	87.2(0.4)	81.4(0.5)	84.5(0.4)



〈그림 115〉 에이즈 인지율



〈그림 116〉 시군구별 에이즈 인지율

4. 의료이용


가. 필요의료서비스 미치료율

- 충청북도의 필요의료서비스 미치료율(조율)은 2013년 전체 14.0%, 남자 12.0%, 여자 15.9%로 여자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남자는 30대에서, 여자는 70대 이상에서 가장 높았다<그림 117>. 또한 교육수준별로는 무학 21.9%, 직업별로는 농림어업 16.7%, 월 가구 소득별로는 100만원 이하가 20.9%로 가장 높았다<표 182>.
- 필요의료서비스 미치료율(표준화율)은 2013년 전체 13.9%로, 전년 11.0% 대비 2.9%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 13.3%에 비해 0.6%p 높았다. 또한 2012년에는 2011년 대비 1.2%p 감소하였으나, 2013년에 다시 2.9%p 만큼 증가하였다<그림 117>.
- 2013년 시군구 단위 필요의료서비스 미치료율은 최소 6.2%(영동군)~최대 20.2%(보은군)에 분포하고 있고, 14.0%p의 차이가 난다<그림 118>.
- 2013년 결과 보은군, 옥천군은 전국 중앙값(시군구 단위) 13.6% 보다 높은 편이고 영동군, 청주 상당구는 낮은 편이다<그림 118>.
- 충청북도의 2013년 필요의료서비스 미치료율은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 보은군, 진천군에서 증가하였고 영동군에서는 감소하였다<그림 118>. 특히 영동군은 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 67>.


〈표 67〉 필요의료서비스 미치료율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	12.0(1.2)	11.4(1.6)	18.7(1.6)	17.2(2.0)	14.9(1.5)	14.1(2.1)
단양군	16.2(1.7)	15.2(1.6)	17.7(1.6)	16.4(1.6)	17.9(1.6)	16.5(1.6)
보은군	9.9(1.3)	8.8(1.6)	12.7(1.3)	11.9(1.7)	19.4(1.8)	20.2(2.4)
영동군	17.9(1.6)	17.0(1.7)	12.1(2.2)	12.4(1.8)	9.4(1.4)	6.2(0.9)
옥천군	22.0(2.1)	21.6(1.7)	12.8(1.3)	13.2(1.6)	18.3(1.9)	19.0(1.8)
음성군	13.2(1.5)	13.8(1.5)	22.2(2.0)	22.2(1.6)	18.7(1.4)	18.3(1.4)
제천시	10.9(1.0)	10.5(1.1)	10.9(0.9)	11.3(1.2)	15.4(1.0)	15.4(1.4)
증평군	14.3(1.7)	14.4(1.4)	8.7(1.3)	8.5(1.0)	16.4(1.4)	17.0(1.4)
진천군	11.8(1.2)	11.5(1.2)	3.5(0.7)	3.6(0.7)	12.9(1.7)	13.6(1.5)
청원군	17.3(1.5)	16.7(1.4)	10.2(1.2)	10.0(1.1)	13.6(1.4)	13.3(1.2)
청주 상당구	8.1(1.1)	8.2(0.9)	7.1(1.0)	7.0(0.9)	9.5(1.0)	9.3(0.9)
청주 흥덕구	7.4(0.7)	7.5(0.9)	9.3(0.9)	9.2(0.9)	12.3(1.2)	12.3(1.1)
충주시	20.4(1.3)	20.0(1.4)	15.1(1.3)	15.1(1.3)	17.6(1.5)	18.1(1.5)
충청북도	12.5(0.4)	12.2(0.4)	11.2(0.4)	11.0(0.4)	14.0(0.5)	13.9(0.5)
국민건강영양조사	18.7(0.7)	18.7(0.8)	16.7(0.7)	16.7(0.7)	-	-



〈그림 117〉 필요의료서비스 미치료율



〈그림 118〉 시군구별 필요의료서비스 미치료율

제2부 » 주요통계결과

Ⅳ. 사고 및 중독

1. 연간 사고중독 경험률

Ⅳ. 사고 및 중독


1. 연간 사고중독 경험률

- 충청북도의 연간 사고중독 경험률(조율)은 2013년 전체 8.3%, 남자 9.1%, 여자 7.5%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다<그림 119>. 또한 교육수준별로는 무학 12.2%, 직업별로는 농림어업 9.7%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 11.4%로 가장 높았다<표 189>.
- 연간 사고중독 경험률(표준화율)은 2013년 전체 8.0%로, 전년 7.3% 대비 0.7%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 7.2%에 비해 0.8%p 높았다. 또한 2010년 이후에는 해마다 소폭 증가하는 추세를 보였다<그림 119>.
- 2013년 시군구 단위 연간 사고중독 경험률은 최소 4.7%(제천시)~최대 14.7%(음성군)에 분포하고 있고, 10.0%p의 차이가 난다<그림 120>.
- 2013년 결과 음성군, 옥천군은 전국 중앙값(시군구 단위) 7.1% 보다 높은 편이고 제천시, 진천군은 낮은 편이다<그림 120>.
- 충청북도의 2013년 연간 사고중독 경험률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 제천시, 진천군에서 감소하였고 괴산군에서는 비슷하였으나 대다수의 지역에서 증가하였다<그림 120>. 또한 영동군, 음성군, 청원군, 청주 흥덕구는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 68>.


<표 68> 연간 사고중독 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	3.9(0.9)	4.3(1.3)	5.1(0.8)	4.5(1.1)	10.6(1.5)	11.6(2.1)	7.7(1.0)	6.6(1.4)
단양군	2.1(0.5)	1.8(0.5)	4.4(0.7)	3.9(0.8)	7.5(1.0)	7.0(1.2)	6.3(1.0)	6.0(1.0)
보은군	2.5(0.6)	2.7(0.8)	3.4(0.6)	2.1(0.6)	9.7(1.3)	10.0(1.8)	6.3(1.0)	6.8(1.5)
영동군	3.8(0.7)	2.9(0.6)	4.9(0.8)	4.7(1.0)	5.8(0.8)	5.0(0.9)	6.5(1.1)	6.4(1.3)
옥천군	7.9(0.9)	6.8(0.9)	13.3(1.5)	12.1(1.2)	10.5(1.1)	8.7(1.2)	13.0(1.4)	12.9(1.5)
음성군	6.2(0.9)	6.6(0.9)	10.6(1.1)	9.8(1.1)	12.0(1.2)	11.3(1.2)	16.4(1.3)	14.7(1.4)
제천시	4.1(0.7)	4.1(0.8)	9.9(1.2)	10.5(1.2)	7.1(0.8)	7.1(1.1)	5.2(0.7)	4.7(0.8)
증평군	5.9(1.1)	5.4(0.8)	5.7(1.0)	5.1(0.9)	10.2(1.4)	10.0(1.2)	8.8(1.7)	8.3(1.0)
진천군	6.7(0.8)	6.9(1.0)	7.8(1.2)	7.8(1.2)	7.2(0.9)	7.5(1.2)	5.9(0.8)	5.6(0.9)
청원군	3.6(0.6)	3.2(0.6)	3.7(0.7)	3.3(0.6)	6.6(0.9)	6.3(0.9)	9.9(1.1)	9.7(1.1)
청주 상당구	5.3(0.8)	5.1(0.7)	5.4(0.8)	5.4(0.7)	4.3(0.8)	4.3(0.7)	7.3(0.9)	7.0(0.9)
청주 흥덕구	2.8(0.6)	2.8(0.5)	3.3(0.6)	3.4(0.6)	7.5(0.8)	7.6(0.9)	8.0(1.0)	8.0(1.0)
충주시	4.3(0.6)	4.1(0.7)	7.2(0.8)	7.1(1.0)	8.2(0.8)	8.2(0.9)	7.8(0.7)	7.9(1.0)
충청북도	4.2(0.2)	4.1(0.2)	6.0(0.3)	5.7(0.3)	7.5(0.3)	7.3(0.4)	8.3(0.4)	8.0(0.4)
국민건강영양조사	7.5(0.5)	7.4(0.5)	7.0(0.4)	7.1(0.5)	7.0(0.5)	7.0(0.5)	-	-



〈그림 119〉 연간 사고중독 경험률



〈그림 120〉 시군구별 연간 사고중독 경험률

제2부 » 주요통계결과

V. 활동제한 및 삶의 질

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율
2. 침상와병 경험률
3. 결근결석 경험률
4. 오늘의 건강상태

V. 활동제한 및 삶의 질


1. 양호한 주관적 건강수준 인지율

- 충청북도의 양호한 주관적 건강수준 인지율(조율)은 2013년 전체 43.8%, 남자 49.1%, 여자 38.6%로 남자가 훨씬 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 가장 높았고, 연령이 증가할수록 감소하여 70대 이상에서 가장 낮았다<그림 121>. 또한 교육수준별로는 대학교 졸업 이상 53.6%, 직업별로는 전문행정관리 53.1%, 월 가구소득별로는 400만원 이상이 53.4%로 가장 높았다<표 191>.
- 양호한 주관적 건강수준 인지율(표준화율)은 2013년 전체 46.8%로, 전년 47.1% 대비 0.3%p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 45.5%에 비해 1.3%p 높았다. 또한 2010년 이후에는 해마다 감소하는 추세를 보였다<그림 121>.
- 2013년 시군구 단위 양호한 주관적 건강수준 인지율은 최소 38.2%(옥천군)~최대 58.5%(단양군)에 분포하고 있고, 20.3%p의 차이가 난다<그림 122>.
- 2013년 결과 단양군, 영동군은 전국 중앙값(시군구 단위) 46.2% 보다 높은 편이고 옥천군, 청원군은 낮은 편이다<그림 122>.
- 충청북도의 2013년 양호한 주관적 건강수준 인지율은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 제천시에서 증가하였고 청원군, 청주 흥덕구에서는 감소하였으나 대다수의 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 122>. 또한 옥천군, 청원군, 청주 흥덕구, 충주시는 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 69>.


<표 69> 양호한 주관적 건강수준 인지율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	38.5(2.1)	49.2(2.4)	41.9(2.1)	52.4(2.8)	34.0(1.9)	41.2(2.9)	36.0(2.1)	45.9(3.1)
단양군	52.4(2.1)	64.5(1.6)	42.9(2.1)	54.7(2.0)	40.5(2.2)	48.3(2.3)	45.6(2.2)	58.5(2.0)
보은군	45.6(1.9)	57.2(2.2)	37.6(2.3)	45.9(3.0)	31.9(2.3)	38.2(3.0)	36.4(2.0)	46.8(2.6)
영동군	46.8(2.3)	56.2(1.9)	49.5(2.3)	58.4(2.0)	43.0(2.2)	52.1(2.2)	44.7(2.3)	56.0(2.3)
옥천군	39.3(1.9)	43.3(1.9)	37.4(1.8)	43.0(2.0)	36.0(1.5)	42.3(2.1)	34.5(1.9)	38.2(2.6)
음성군	44.5(1.7)	48.3(1.6)	45.8(2.1)	48.7(2.0)	43.1(1.8)	48.8(1.8)	41.4(2.3)	46.1(1.9)
제천시	43.0(2.0)	45.6(2.0)	39.1(1.9)	42.5(1.9)	37.2(1.8)	40.0(1.9)	44.0(1.8)	48.5(1.9)
증평군	43.4(2.2)	45.5(1.8)	39.5(2.2)	42.0(1.8)	46.8(2.0)	50.1(1.6)	44.0(1.6)	47.2(1.5)
진천군	38.1(1.7)	40.3(1.8)	40.0(1.9)	42.3(2.0)	52.3(2.2)	56.1(1.9)	45.9(2.0)	49.1(2.1)
청원군	61.2(1.8)	64.9(1.6)	47.7(2.1)	51.2(1.6)	43.8(2.3)	46.8(2.0)	40.5(1.6)	42.3(1.7)
청주 상당구	53.6(2.1)	54.8(1.6)	58.9(1.9)	59.8(1.5)	49.6(1.9)	51.5(1.6)	53.7(1.7)	55.5(1.7)
청주 흥덕구	62.2(1.8)	61.0(1.3)	51.9(1.8)	51.9(1.6)	46.4(1.5)	46.5(1.5)	45.1(1.7)	45.2(1.6)
충주시	46.3(1.9)	49.5(1.8)	41.6(1.7)	45.1(1.8)	41.7(1.8)	44.8(1.7)	37.8(1.6)	42.4(1.8)
충청북도	51.8(0.7)	54.9(0.6)	47.4(0.7)	50.5(0.7)	43.9(0.6)	47.1(0.6)	43.8(0.7)	46.8(0.7)
국민건강영양조사	36.0(0.8)	36.6(0.8)	35.3(0.9)	36.0(0.9)	32.0(0.8)	33.1(0.9)	-	-



〈그림 121〉 양호한 주관적 건강수준 인지율



〈그림 122〉 시군구별 양호한 주관적 건강수준 인지율


2. 침상와병 경험률

- 충청북도의 침상와병 경험률(조율)은 2013년 전체 5.6%, 남자 3.9%, 여자 7.3%로 여자가 두 배 가까이 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다<그림 123>. 또한 교육수준별로는 무학 11.5%, 직업별로는 기타 7.7%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 10.2%로 가장 높았다<표 192>.
- 침상와병 경험률(표준화율)은 2013년 전체 5.5%로, 전년 4.4% 대비 1.1%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 5.5%와 같았다. 또한 2010년 이후 해마다 소폭 증가하는 추세를 보였다<그림 123>.
- 2013년 시군구 단위 침상와병 경험률은 최소 3.4%(단양군)~최대 9.7%(옥천군)에 분포하고 있고, 6.3%p의 차이가 난다<그림 124>.
- 2013년 결과 옥천군, 충주시는 전국 중앙값(시군구 단위) 5.2% 보다 높은 편이고 단양군, 영동군은 낮은 편이다<그림 124>.
- 충청북도의 2013년 침상와병 경험률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 단양군에서 비슷하였고 대다수의 지역에서 증가하였다<그림 124>. 특히 음성군, 제천시, 청원군, 충주시는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 70>.


<표 70> 침상와병 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	3.3(0.7)	3.4(1.0)	3.3(0.9)	4.0(1.3)	6.2(0.6)	3.6(0.6)	6.4(1.0)	5.3(1.3)
단양군	2.4(0.5)	1.5(0.4)	6.2(0.8)	5.5(0.9)	3.4(0.6)	2.8(0.7)	3.9(0.7)	3.4(0.7)
보은군	2.1(0.6)	1.7(0.7)	3.0(0.9)	3.5(1.4)	2.4(0.7)	2.6(1.1)	5.8(1.2)	6.5(1.3)
영동군	3.5(0.7)	2.2(0.4)	2.8(0.7)	2.1(0.5)	3.9(0.7)	3.4(0.8)	5.1(0.8)	4.1(1.0)
옥천군	6.2(0.9)	5.4(0.9)	7.1(1.2)	6.2(1.0)	6.2(0.9)	5.5(1.0)	8.7(1.2)	9.7(1.5)
음성군	3.5(0.7)	3.0(0.6)	4.4(0.7)	4.2(0.7)	5.1(0.8)	4.6(0.8)	6.9(1.0)	6.7(1.1)
제천시	2.9(0.6)	2.5(0.5)	4.5(0.9)	4.6(0.9)	4.6(0.7)	4.7(0.8)	5.4(0.8)	5.6(0.9)
증평군	3.1(0.6)	2.9(0.6)	2.0(0.6)	2.2(0.5)	4.5(0.8)	4.1(0.7)	4.3(0.8)	4.4(0.9)
진천군	2.9(0.6)	2.9(0.7)	4.2(0.8)	4.2(0.9)	1.9(0.5)	1.9(0.6)	4.1(0.8)	4.4(0.9)
청원군	2.3(0.5)	2.0(0.4)	3.1(0.5)	2.7(0.5)	4.2(0.7)	3.9(0.7)	6.2(0.9)	6.0(0.9)
청주 상당구	4.1(0.8)	4.0(0.6)	4.3(0.7)	4.3(0.7)	3.2(0.5)	3.2(0.5)	4.9(0.8)	4.8(0.7)
청주 흥덕구	1.7(0.4)	1.7(0.4)	3.4(0.6)	3.4(0.6)	4.8(0.8)	4.8(0.7)	4.3(0.6)	4.5(0.7)
충주시	3.3(0.7)	2.7(0.5)	6.5(0.8)	6.4(0.9)	6.7(0.8)	6.4(0.8)	8.1(0.9)	8.1(0.9)
충청북도	2.9(0.2)	2.6(0.2)	4.3(0.3)	4.1(0.3)	4.6(0.3)	4.4(0.3)	5.6(0.3)	5.5(0.3)



〈그림 123〉 침상와병 경험률



〈그림 124〉 시군구별 침상와병 경험률


3. 결근결석 경험률

- 충청북도의 결근결석 경험률(조율)은 2013년 전체 3.9%, 남자 3.1%, 여자 5.0%로 여자에서 다소 높았다. 연령대별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 50대에서 가장 낮았다<그림 125>. 또한 교육수준별로는 중학교 졸업 6.4%, 직업별로는 농림어업 5.2%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 7.3%로 가장 높았다<표 194>.
- 결근결석 경험률(표준화율)은 2013년 전체 4.3%로, 전년 3.0% 대비 1.3%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 3.6%에 비해 0.7%p 높았다. 또한 2012년에는 2011년 대비 0.3%p 감소하였으나, 2013년에 다시 1.3%p 만큼 증가하였다<그림 125>.
- 2013년 시군구 단위 결근결석 경험률은 최소 2.2%(영동군)~최대 7.4%(충주시)에 분포하고 있고, 5.2%p의 차이가 난다<그림 126>.
- 2013년 결과 충주시, 옥천군은 전국 중앙값(시군구 단위) 3.3% 보다 높은 편이고 영동군은 낮은 편이다<그림 126>.
- 충청북도의 2013년 결근결석 경험률은 지난 2년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 충주시, 옥천군에서 증가하였고 청원군, 단양군에서는 비슷한 수준을 유지하였다<그림 126>. 또한 보은군, 증평군, 청주 흥덕구는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 71>.


〈표 71〉 결근결석 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	4.9(1.2)	6.2(1.8)	3.7(0.7)	2.9(0.7)	4.1(1.1)	4.0(1.6)
단양군	4.2(0.9)	4.1(0.9)	2.0(0.6)	1.7(0.5)	3.0(0.8)	3.2(0.9)
보은군	0.7(0.4)	0.5(0.3)	3.2(0.9)	3.2(1.2)	3.0(1.0)	3.4(1.0)
영동군	0.8(0.3)	0.5(0.2)	4.0(0.8)	4.7(1.3)	2.3(0.8)	2.2(0.8)
옥천군	4.9(0.9)	4.6(1.1)	3.4(0.7)	3.0(0.7)	7.1(1.2)	7.3(1.2)
음성군	3.8(0.8)	4.1(1.0)	3.2(0.7)	3.6(0.8)	5.0(1.1)	5.3(1.0)
제천시	4.8(1.0)	5.4(1.1)	2.6(0.7)	2.5(0.6)	4.7(1.0)	5.0(1.1)
증평군	2.1(0.8)	2.6(0.8)	2.6(0.7)	2.8(0.7)	3.1(0.7)	3.5(0.8)
진천군	1.4(0.5)	1.8(0.7)	1.3(0.5)	1.2(0.5)	3.3(0.7)	3.2(0.8)
청원군	2.6(0.8)	3.2(0.8)	2.6(0.7)	2.6(0.6)	3.2(0.6)	3.0(0.8)
청주 상당구	3.6(0.7)	4.0(1.0)	1.3(0.3)	1.2(0.4)	2.3(0.7)	3.1(1.1)
청주 흥덕구	2.4(0.8)	2.4(0.7)	3.7(0.7)	3.8(0.9)	3.5(0.8)	3.8(0.8)
충주시	3.1(0.9)	3.0(0.8)	2.8(0.7)	2.9(0.7)	5.8(0.8)	7.4(1.1)
충청북도	3.1(0.3)	3.3(0.3)	2.8(0.2)	3.0(0.3)	3.9(0.3)	4.3(0.3)



〈그림 125〉 결근결석 경험률



〈그림 126〉 시군구별 결근결석 경험률


4. 오늘의 건강상태

- 충청북도의 오늘의 건강상태(조율)는 2013년 전체 평균 72.8점, 남자 74.4점, 여자 71.2점으로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 20대에서 가장 높았고, 70대 이상에서 가장 낮았다<그림 127>. 또한 교육수준별로는 대학교 졸업 이상 75.7점, 직업별로는 사무직 75.8점, 월 가구소득별로는 400만원 이상이 75.6점으로 가장 높았다<표 197>.
- 오늘의 건강상태(표준화율)는 2013년 전체 73.5점으로, 전년 74.7점 대비 1.2p 낮았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 73.4점에 비해 0.1p 높았다. 또한 2011년에는 2010년 대비 2.7p 감소하였으나, 2012년에 2.3p 증가하였다가 2013년에 다시 1.2p 만큼 감소하였다<그림 127>.
- 2013년 시군구 단위 오늘의 건강상태는 최소 71.8점(보은군)~최대 75.9점(진천군)에 분포하고 있고, 4.1p의 차이가 난다<그림 128>.
- 2013년 결과 모든 지역에서 전국 중앙값(시군구 단위) 73.5점과 비슷한 편이었다<그림 128>.
- 충청북도의 2013년 오늘의 건강상태는 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 전 지역에서 비슷한 수준을 유지하였다<그림 128>. 또한 보은군, 청원군은 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 72>.


<표 72> 오늘의 건강상태(EQ-VAS)

(단위 : 점(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	69.9(0.8)	72.5(0.9)	69.4(0.8)	71.9(0.9)	69.9(0.7)	73.0(0.9)	69.6(0.7)	72.3(0.9)
단양군	70.1(0.8)	73.6(0.5)	67.1(0.8)	70.6(0.6)	71.7(0.7)	74.0(0.6)	71.3(0.7)	74.5(0.6)
보은군	73.8(0.9)	76.6(0.9)	73.2(0.8)	74.7(1.2)	72.0(0.9)	74.7(0.9)	69.9(0.9)	71.8(1.0)
영동군	72.4(0.7)	76.4(0.6)	70.8(0.8)	73.9(0.8)	74.5(0.6)	76.4(0.7)	71.1(0.7)	73.9(0.8)
옥천군	71.2(0.6)	73.1(0.6)	69.6(0.7)	71.7(0.7)	72.9(0.6)	74.9(0.6)	71.6(0.9)	72.3(0.9)
음성군	75.5(0.6)	76.7(0.6)	73.0(0.6)	73.6(0.7)	75.0(0.7)	76.5(0.6)	74.4(0.9)	75.2(0.7)
제천시	74.0(0.7)	74.7(0.5)	69.8(0.7)	70.9(0.6)	73.9(0.6)	75.2(0.5)	71.5(0.7)	72.8(0.6)
증평군	73.6(0.7)	74.1(0.5)	69.9(1.2)	70.7(0.8)	72.3(0.9)	73.0(0.6)	71.4(1.5)	73.0(0.7)
진천군	73.4(0.7)	74.0(0.6)	72.3(0.9)	73.5(0.8)	76.3(0.6)	77.6(0.6)	75.0(0.6)	75.9(0.7)
청원군	76.8(0.5)	77.6(0.4)	73.9(0.5)	74.8(0.5)	72.3(0.8)	73.4(0.7)	72.8(0.6)	73.4(0.6)
청주 상당구	76.8(0.6)	76.8(0.4)	69.8(0.7)	70.0(0.6)	73.6(0.7)	73.7(0.5)	71.8(0.7)	72.0(0.6)
청주 흥덕구	75.3(0.5)	75.1(0.4)	72.7(0.5)	72.6(0.5)	73.9(0.7)	73.7(0.6)	73.3(0.8)	73.1(0.6)
충주시	71.6(0.7)	72.9(0.6)	72.4(0.7)	73.6(0.6)	77.5(0.5)	78.0(0.5)	74.8(0.7)	75.6(0.6)
충청북도	74.4(0.2)	75.1(0.2)	71.6(0.2)	72.4(0.2)	74.1(0.3)	74.7(0.2)	72.8(0.3)	73.5(0.2)
국민건강영양조사	73.7(0.3)	74.0(0.3)	74.2(0.3)	74.5(0.3)	73.9(0.3)	74.3(0.3)	-	-



〈그림 127〉 오늘의 건강상태(EQ-VAS)



〈그림 128〉 시군구별 오늘의 건강상태(EQ-VAS)

제 2 부 주요통계결과

Ⅵ. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용

Ⅵ. 보건기관 이용

1. 보건기관 이용


가. 보건기관 이용률

- 충청북도의 보건기관 이용률(조율)은 2013년 전체 35.7%, 남자 28.8%, 여자 42.5%로 여자가 훨씬 더 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다<그림 129>. 또한 교육수준별로는 무학 69.0%, 직업별로는 농림어업 61.5%, 월 가구소득별로는 100만원 이하가 62.0%로 가장 높았다<표 199>.
- 보건기관 이용률(표준화율)은 2013년 전체 32.6%로, 전년 30.5% 대비 2.1%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 29.3%에 비해 3.3%p 높았다. 또한 2010년 이후 해마다 소폭 증가하는 추세를 보였다<그림 129>.
- 2013년 시군구 단위 보건기관 이용률은 최소 23.3%(청주 상당구)~최대 54.6%(단양군)에 분포하고 있고, 31.3%p의 차이가 난다<그림 130>.
- 2013년 결과 단양군, 보은군은 전국 중앙값(시군구 단위) 28.8% 보다 높은 편이고 청주 상당구, 흥덕구는 낮은 편이다<그림 130>.
- 충청북도의 2013년 보건기관 이용률은 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 단양군, 증평군에서 증가하였고 영동군, 제천시에서는 감소하였다<그림 130>. 특히 단양군, 청주 흥덕구는 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보였다<표 73>.


〈표 73〉 보건기관 이용률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	50.6(2.6)	42.1(2.6)	48.7(3.0)	37.5(2.6)	47.2(2.6)	38.4(2.8)	50.3(2.5)	37.7(2.6)
단양군	47.8(2.7)	38.1(1.9)	53.6(2.0)	46.9(2.0)	55.0(2.2)	47.5(2.2)	61.5(2.2)	54.6(2.3)
보은군	60.8(2.6)	48.4(2.3)	71.6(2.4)	63.0(2.6)	64.3(2.3)	54.7(2.5)	63.0(2.0)	52.3(2.6)
영동군	50.1(2.5)	40.8(2.0)	56.9(2.5)	49.5(2.4)	48.7(2.6)	39.2(2.5)	43.2(2.7)	32.4(2.3)
옥천군	45.0(2.2)	36.4(1.6)	49.1(1.8)	39.5(1.8)	50.9(2.3)	40.8(1.9)	48.7(2.3)	39.4(2.0)
음성군	39.5(2.3)	35.1(1.6)	42.6(2.2)	39.1(2.0)	44.7(1.9)	39.5(1.8)	42.9(2.3)	37.1(1.7)
제천시	45.6(1.8)	42.2(1.7)	47.5(2.0)	43.9(2.0)	40.4(1.8)	37.8(1.7)	37.2(1.8)	35.3(1.6)
증평군	41.5(2.0)	39.1(1.7)	42.2(2.1)	41.1(1.9)	42.4(1.8)	40.1(1.6)	53.1(3.7)	50.1(2.1)
진천군	35.3(2.0)	31.5(1.7)	35.9(1.8)	32.3(1.9)	34.2(1.9)	31.4(1.7)	45.6(1.8)	40.4(1.8)
청원군	29.1(2.4)	25.5(1.4)	37.6(2.3)	34.1(1.5)	32.2(2.0)	29.0(1.6)	38.0(2.2)	33.8(1.4)
청주 상당구	20.9(1.5)	20.8(1.3)	19.8(1.6)	19.4(1.3)	20.2(1.5)	19.8(1.3)	23.7(1.5)	23.3(1.4)
청주 흥덕구	12.2(1.1)	13.1(1.0)	17.4(1.5)	18.5(1.3)	21.0(1.5)	21.3(1.4)	24.6(1.5)	25.1(1.4)
충주시	35.0(1.9)	32.2(1.5)	30.4(1.6)	27.5(1.6)	36.8(1.7)	34.0(1.6)	41.6(1.9)	36.1(1.6)
충청북도	30.1(0.6)	27.4(0.5)	32.5(0.7)	29.9(0.5)	32.8(0.6)	30.5(0.6)	35.7(0.6)	32.6(0.6)



〈그림 129〉 보건기관 이용률



〈그림 130〉 시군구별 보건기관 이용률


나. 보건기관 서비스 만족도

- 충청북도의 보건기관 서비스 만족도(조율)는 2013년 전체 77.8%, 남자 78.6%, 여자 77.3%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 70대 이상에서 가장 높았고, 30대에서 가장 낮았다<그림 131>. 또한 교육수준별로는 무학 84.5%, 직업별로는 농림어업 81.1%, 월 가구소득별로는 100-200만원이 81.8%로 가장 높았다<표 202>.
- 보건기관 서비스 만족도(표준화율)는 2013년 전체 76.9%로, 전년 74.2% 대비 2.7%p 높았으며, 전국 중앙값(시도 단위) 73.5%에 비해 3.4%p 높았다. 또한 2010년 이후 해마다 감소하였으나, 2013년에는 2012년에 비해 2.7%p 만큼 증가하였다<그림 131>.
- 2013년 시군구 단위 보건기관 서비스 만족도는 최소 68.4%(청주 흥덕구)~최대 87.8%(증평군)에 분포하고 있고, 19.4%p의 차이가 난다<그림 132>.
- 2013년 결과 증평군, 진천군은 전국 중앙값(시군구 단위) 74.2% 보다 높은 편이고 청주 흥덕구는 낮은 편이다<그림 132>.
- 충청북도의 2013년 보건기관 서비스 만족도 지난 3년간 시군구 평균과 비교해보면 금년도는 진천군, 증평군에서 증가하였고 보은군, 영동군에서는 감소하였다<그림 132>. 또한 제천시는 해마다 꾸준히 감소하는 추세를 보였다<표 74>.


〈표 74〉 보건기관 서비스 만족도

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사							
	2010년		2011년		2012년		2013년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	92.4(1.5)	93.2(1.3)	82.7(2.6)	77.0(2.0)	81.6(2.2)	83.8(1.9)	76.8(2.2)	78.7(2.3)
단양군	87.6(2.2)	85.5(2.3)	76.8(2.1)	76.7(2.4)	83.6(1.9)	83.6(2.0)	84.7(1.8)	84.1(1.9)
보은군	95.7(0.9)	94.0(1.8)	95.1(1.0)	94.4(1.4)	91.0(1.4)	89.3(2.0)	87.4(1.7)	86.3(2.0)
영동군	87.9(1.7)	86.4(1.9)	87.2(1.9)	85.8(2.2)	72.5(2.7)	68.6(3.0)	79.6(2.7)	74.2(3.6)
옥천군	78.5(2.3)	75.4(2.6)	78.8(2.1)	74.3(2.6)	81.7(2.0)	75.2(2.5)	79.9(2.3)	77.0(2.8)
음성군	79.8(2.6)	79.9(2.3)	81.1(2.4)	81.0(2.2)	73.0(3.0)	70.4(2.6)	76.6(2.3)	74.0(2.7)
제천시	83.9(2.1)	83.0(2.0)	81.6(2.0)	80.6(2.1)	79.0(2.7)	77.1(2.4)	76.8(2.2)	76.5(2.5)
증평군	84.1(2.2)	83.7(1.8)	77.0(2.9)	76.9(2.2)	73.6(2.5)	74.1(2.3)	88.0(1.4)	87.8(2.0)
진천군	68.8(3.0)	69.6(2.8)	68.9(3.3)	68.3(2.9)	82.2(2.4)	82.4(2.1)	87.3(2.1)	87.0(1.9)
청원군	82.5(2.3)	80.0(2.4)	63.9(3.0)	62.9(3.0)	72.3(2.9)	72.2(3.1)	74.0(2.6)	75.3(2.4)
청주 상당구	71.0(4.0)	71.9(3.0)	83.2(2.2)	82.0(2.8)	72.2(3.4)	74.6(3.0)	82.3(2.5)	81.8(2.5)
청주 흥덕구	75.0(5.4)	74.0(4.7)	73.5(3.9)	73.4(3.4)	64.5(3.0)	66.0(3.7)	68.9(3.5)	68.4(3.1)
충주시	88.0(2.1)	87.6(1.9)	81.2(2.5)	79.3(2.8)	76.4(2.6)	75.6(2.4)	78.7(1.7)	76.4(2.6)
충청북도	82.2(0.9)	81.0(0.9)	78.6(0.8)	77.7(0.9)	75.0(0.9)	74.2(0.9)	77.8(0.9)	76.9(0.9)




〈그림 131〉 보건기관 서비스 만족도



〈그림 132〉 시군구별 보건기관 서비스 만족도

제3부 통계표

Community Health Survey



제3부 » 통계표

Ⅰ. 통계표

〈표 75〉 현재흡연율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	24.6(0.5)	2.2	5,311	45.8(1.0)	2.1	6,288	3.5(0.3)	9.6
연령									
19-29	1,036	25.0(1.7)	6.8	471	43.5(2.8)	6.5	565	3.2(0.8)	24.7
30-39	1,603	32.3(1.3)	4.0	758	59.8(2.1)	3.5	845	3.0(0.7)	22.4
40-49	1,957	30.2(1.3)	4.3	965	54.3(1.9)	3.5	992	4.4(0.9)	19.4
50-59	2,480	24.5(1.1)	4.6	1,178	44.7(1.8)	4.1	1,302	3.4(0.7)	20.7
60-69	1,933	16.1(1.1)	6.8	895	30.6(2.0)	6.4	1,038	4.1(1.0)	23.7
70 이상	2,590	11.3(0.8)	7.0	1,044	23.3(1.8)	7.6	1,546	3.0(0.4)	13.9
생애주기별									
19-64	8,059	27.3(0.7)	2.4	3,845	49.4(1.1)	2.3	4,214	3.6(0.4)	11.5
65 이상	3,540	12.2(0.7)	5.9	1,466	24.8(1.5)	6.2	2,074	3.4(0.5)	14.9
교육수준[2]									
무학	1,705	10.2(0.9)	8.7	327	33.2(3.4)	10.2	1,378	4.7(0.8)	17.0
초등학교	2,307	15.7(1.0)	6.3	973	33.7(2.1)	6.1	1,334	3.1(0.7)	23.6
중학교	1,389	24.4(1.6)	6.5	683	45.9(2.5)	5.5	706	6.2(1.4)	21.9
고등학교	3,730	28.3(1.0)	3.7	1,925	49.7(1.6)	3.3	1,805	3.8(0.6)	16.1
대학교 이상	2,458	27.7(1.0)	3.7	1,400	45.8(1.5)	3.3	1,058	1.6(0.4)	25.9
직업									
전문행정관리	1,038	25.0(1.6)	6.6	545	45.0(2.5)	5.5	493	1.7(0.7)	42.3
사무직	742	29.2(2.0)	6.8	382	48.2(3.1)	6.5	360	3.2(0.9)	27.3
판매·서비스직	1,294	25.3(1.6)	6.2	423	58.2(3.1)	5.4	871	6.0(1.1)	19.2
농림어업	2,098	25.0(1.2)	4.6	1,203	39.1(1.7)	4.3	895	2.2(0.8)	37.0
기능단순노무직	2,411	38.8(1.3)	3.3	1,586	52.4(1.6)	3.0	825	4.0(0.9)	21.8
기타[3]	4,014	13.2(0.8)	5.9	1,171	33.1(1.9)	5.8	2,843	3.2(0.4)	13.3
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	17.7(1.1)	6.3	863	35.0(2.2)	6.2	1,434	6.0(1.0)	16.4
101-200만원	1,953	26.0(1.4)	5.4	898	47.5(2.3)	4.9	1,055	6.1(1.2)	18.8
201-300만원	1,927	26.3(1.3)	5.0	939	46.5(2.2)	4.7	988	4.1(0.9)	21.4
301-400만원	1,698	27.3(1.3)	4.8	831	49.7(2.3)	4.6	867	3.1(0.7)	21.6
401만원 이상	3,085	24.7(0.9)	3.8	1,503	46.1(1.7)	3.7	1,582	1.5(0.4)	26.0
거주유형									
동	3,231	24.5(0.8)	3.3	1,467	46.2(1.5)	3.2	1,764	3.5(0.5)	14.5
읍·면	8,368	24.8(0.6)	2.5	3,844	45.2(1.1)	2.4	4,524	3.5(0.3)	9.8

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수 × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 76〉 흡연시작연령[1]

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	4,621	20.3(0.1)	0.5	4,247	19.7(0.1)	0.4	374	28.6(0.8)	2.8
연령									
19-29	283	18.0(0.2)	1.0	253	17.9(0.2)	1.0	30	18.3(0.6)	3.3
30-39	664	18.7(0.1)	0.5	612	18.7(0.1)	0.5	52	19.5(0.4)	1.9
40-49	847	20.1(0.2)	0.9	787	19.6(0.1)	0.8	60	27.3(1.3)	4.9
50-59	1,053	21.2(0.3)	1.3	980	20.2(0.2)	1.0	73	34.9(1.8)	5.1
60-69	798	22.1(0.3)	1.4	752	20.9(0.2)	1.1	46	36.3(1.5)	4.2
70 이상	976	22.8(0.3)	1.2	863	21.2(0.2)	1.1	113	37.5(1.3)	3.4
생애주기별									
19-64	3,258	19.9(0.1)	0.5	3,021	19.4(0.1)	0.4	237	26.4(0.9)	3.3
65 이상	1,363	22.6(0.2)	1.0	1,226	21.1(0.2)	0.9	137	37.2(1.2)	3.2
교육수준[2]									
무학	397	24.2(0.6)	2.6	281	19.8(0.3)	1.5	116	34.5(1.4)	3.9
초등학교	878	21.5(0.3)	1.5	812	20.1(0.2)	1.0	66	36.2(1.5)	4.2
중학교	624	22.1(0.4)	1.9	579	20.7(0.3)	1.4	45	34.4(2.3)	6.7
고등학교	1,670	19.7(0.1)	0.7	1,551	19.4(0.1)	0.6	119	23.8(1.0)	4.0
대학교 이상	1,050	19.6(0.1)	0.7	1,022	19.5(0.1)	0.7	28	20.5(0.4)	2.1
직업									
전문행정관리	416	19.2(0.2)	0.8	398	19.2(0.2)	0.8	18	-(-)	-
사무직	306	19.7(0.2)	1.2	295	19.6(0.2)	1.2	11	-(-)	-
판매·서비스직	428	20.4(0.4)	1.8	353	19.0(0.2)	1.1	75	28.0(1.9)	6.7
농림어업	1,004	21.2(0.2)	0.9	972	20.8(0.2)	0.8	32	34.7(1.9)	5.6
기능단순노무직	1,368	19.9(0.1)	0.7	1,320	19.5(0.1)	0.7	48	29.9(2.2)	7.5
기타[3]	1,097	21.5(0.2)	1.2	908	20.0(0.2)	1.0	189	30.1(0.9)	3.1
월 가구소득									
100만원 이하	842	22.7(0.4)	1.6	728	20.6(0.2)	1.1	114	35.6(1.2)	3.5
101-200만원	813	21.1(0.3)	1.3	741	19.9(0.2)	1.1	72	31.4(1.7)	5.3
201-300만원	803	20.3(0.3)	1.3	742	19.8(0.2)	1.2	61	27.4(1.6)	5.7
301-400만원	709	19.7(0.2)	1.2	661	19.3(0.2)	0.9	48	25.9(2.1)	8.0
401만원 이상	1,221	19.6(0.1)	0.6	1,165	19.4(0.1)	0.6	56	22.6(0.9)	4.1
거주유형									
동	1,272	20.0(0.1)	0.7	1,159	19.4(0.1)	0.6	113	27.4(1.2)	4.2
읍·면	3,349	20.7(0.1)	0.5	3,088	20.0(0.1)	0.4	261	30.5(0.9)	2.9

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 77〉 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량[1)]

(단위 : %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	개비 (표준오차)	변동계수
전체	2,338	11.0(0.9)	7.9	42.6(1.4)	3.2	43.5(1.3)	3.1	3.0(0.4)	14.1	16.1(0.2)	1.2
성											
남자	2,164	9.0(0.8)	9.4	43.2(1.4)	3.2	44.7(1.4)	3.2	3.2(0.4)	14.0	16.5(0.2)	1.3
여자	174	44.0(4.0)	9.2	32.2(4.4)	13.7	23.8(3.7)	15.5	0.0(0.0)	.	10.7(0.5)	4.7
연령											
19-29	212	21.6(3.0)	13.7	52.2(3.6)	6.9	26.1(2.9)	11.3	0.2(0.2)	100.3	12.6(0.4)	3.3
30-39	449	8.7(1.7)	19.7	51.0(2.8)	5.6	38.1(2.4)	6.4	2.2(0.8)	34.8	15.2(0.3)	2.2
40-49	545	7.1(1.4)	19.1	37.9(2.7)	7.2	50.7(2.8)	5.5	4.3(1.1)	26.1	17.8(0.4)	2.4
50-59	535	4.7(1.1)	22.5	33.8(2.8)	8.1	56.8(2.9)	5.1	4.7(1.0)	21.1	18.6(0.4)	2.3
60-69	296	10.3(2.1)	20.6	34.1(3.6)	10.5	51.5(3.9)	7.7	4.1(1.5)	36.5	17.1(0.6)	3.7
70 이상	301	29.2(4.0)	13.6	39.4(4.0)	10.2	30.2(3.5)	11.7	1.3(0.8)	62.5	13.0(0.6)	4.8
생애주기별											
19-64	1,902	9.6(0.9)	9.5	42.9(1.5)	3.4	44.4(1.4)	3.2	3.1(0.4)	14.3	16.3(0.2)	1.3
65 이상	436	25.9(3.2)	12.3	39.2(3.2)	8.2	33.4(2.9)	8.8	1.6(0.8)	47.6	13.7(0.5)	3.7
교육수준[2)]											
무학	171	27.1(3.7)	13.7	37.9(4.6)	12.2	31.6(4.3)	13.6	3.4(2.2)	65.1	14.0(0.9)	6.2
초등학교	340	14.0(2.2)	15.6	26.6(3.1)	11.5	54.8(3.7)	6.8	4.6(1.4)	31.6	18.0(0.7)	3.8
중학교	287	7.7(1.6)	20.8	29.9(3.3)	11.0	56.9(3.6)	6.3	5.5(1.1)	19.8	18.7(0.5)	2.8
고등학교	939	9.4(1.3)	13.4	43.2(2.0)	4.5	45.2(2.0)	4.4	2.3(0.5)	20.6	16.2(0.3)	1.6
대학교 이상	600	11.8(1.7)	14.8	49.4(2.5)	5.0	36.1(2.3)	6.3	2.7(0.9)	31.7	15.0(0.3)	2.3
직업											
전문행정관리	233	13.9(3.6)	25.9	42.1(3.8)	9.1	42.3(3.4)	8.0	1.7(0.5)	29.7	15.3(0.5)	3.4
사무직	178	8.9(2.2)	24.3	53.5(4.4)	8.2	36.0(4.2)	11.6	1.6(1.5)	89.9	14.9(0.6)	3.9
판매·서비스직	251	7.5(1.7)	22.9	42.2(4.1)	9.7	44.8(4.0)	9.0	5.5(2.0)	35.8	17.1(0.6)	3.7
농림어업	443	8.2(1.5)	18.5	30.4(2.6)	8.5	55.6(2.7)	4.9	5.8(1.3)	21.8	18.3(0.5)	2.9
기능단순노무직	808	7.5(1.2)	16.3	42.5(2.1)	5.0	47.0(2.1)	4.4	2.9(0.6)	21.5	16.9(0.3)	1.7
기타[3)]	424	21.7(2.4)	11.1	43.2(3.2)	7.5	33.7(3.3)	9.8	1.4(0.5)	32.7	13.9(0.5)	3.5
월 가구소득											
100만원 이하	336	19.7(2.7)	13.7	36.1(3.3)	9.1	42.9(3.6)	8.4	1.3(0.5)	40.5	14.9(0.6)	3.8
101-200만원	383	12.8(2.4)	19.0	35.1(3.2)	9.2	48.3(3.2)	6.6	3.8(0.9)	23.7	16.9(0.5)	2.9
201-300만원	435	8.8(1.8)	21.0	42.8(2.9)	6.9	45.7(3.0)	6.5	2.8(0.7)	25.8	16.5(0.4)	2.3
301-400만원	406	6.5(1.5)	22.6	47.6(2.9)	6.1	41.7(2.7)	6.5	4.2(1.4)	32.1	16.5(0.5)	2.8
401만원 이상	654	11.8(1.7)	14.1	44.4(2.4)	5.3	41.7(2.2)	5.4	2.1(0.7)	31.7	15.7(0.3)	2.1
거주유형											
동	674	10.3(1.3)	13.0	47.0(2.1)	4.5	40.4(2.0)	5.0	2.3(0.6)	27.0	15.7(0.3)	1.8
읍·면	1,664	12.1(0.9)	7.4	36.2(1.4)	3.7	47.9(1.5)	3.2	3.9(0.5)	12.4	16.7(0.2)	1.5

주 : 1) 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 : 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 매일 흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 78〉 흡연자의 금연시도율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,489	20.4(1.1)	5.3	2,272	20.0(1.1)	5.4	217	26.0(4.2)	16.3
연령									
19-29	230	24.6(3.1)	12.7	215	23.7(3.4)	14.1	15	-(-)	-
30-39	483	26.1(2.3)	8.7	456	26.5(2.4)	8.9	27	18.1(8.7)	47.8
40-49	574	19.7(2.1)	10.4	530	18.7(2.1)	11.2	44	33.3(8.9)	26.8
50-59	565	15.7(2.0)	13.0	523	15.1(1.9)	12.4	42	23.0(11.3)	49.2
60-69	312	14.1(2.4)	16.7	284	12.3(2.3)	18.7	28	25.5(9.2)	36.2
70 이상	325	11.2(2.4)	21.6	264	11.3(2.7)	24.2	61	10.5(4.4)	41.4
생애주기별									
19-64	2,021	21.2(1.2)	5.5	1,880	20.7(1.2)	5.7	141	28.1(5.0)	17.8
65 이상	468	12.8(2.1)	16.3	392	12.0(2.1)	18.0	76	17.1(6.1)	35.9
교육수준[2]									
무학	181	12.1(3.2)	26.2	117	6.6(2.5)	38.4	64	21.3(7.1)	33.4
초등학교	362	15.1(2.9)	19.5	325	13.8(2.8)	20.1	37	25.4(13.1)	51.5
중학교	310	18.5(2.8)	14.9	277	16.3(2.5)	15.5	33	32.2(11.3)	35.1
고등학교	997	19.4(1.5)	7.9	928	19.3(1.6)	8.3	69	21.6(5.6)	25.8
대학교 이상	638	24.4(2.2)	8.8	624	24.0(2.1)	8.9	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	250	24.2(3.3)	13.8	243	24.9(3.4)	13.6	7	-(-)	-
사무직	193	25.2(4.4)	17.6	184	24.4(4.6)	18.7	9	-(-)	-
판매·서비스직	275	23.5(3.0)	12.9	222	21.1(3.2)	15.1	53	37.3(8.6)	23.1
농림어업	465	12.6(1.8)	13.9	450	11.9(1.6)	13.4	15	-(-)	-
기능단순노무직	841	19.5(1.5)	7.9	811	19.7(1.6)	7.9	30	11.5(6.0)	52.1
기타[3]	463	18.5(2.6)	14.1	361	17.5(2.7)	15.6	102	23.7(7.1)	29.9
월 가구소득									
100만원 이하	364	15.4(2.8)	18.3	294	13.6(2.8)	20.6	70	22.2(7.8)	35.1
101-200만원	402	14.1(2.2)	15.5	357	12.5(2.2)	17.7	45	25.7(8.5)	33.0
201-300만원	461	25.0(2.8)	11.1	420	24.2(2.8)	11.6	41	34.1(10.8)	31.6
301-400만원	433	22.8(2.6)	11.6	409	23.1(2.8)	12.0	24	17.3(9.6)	55.5
401만원 이상	696	21.3(1.8)	8.2	673	21.0(1.8)	8.4	23	31.4(10.8)	34.4
거주유형									
동	728	21.1(1.7)	8.0	663	20.6(1.7)	8.3	65	27.1(6.5)	24.1
읍·면	1,761	19.5(1.0)	5.1	1,609	19.1(1.0)	5.3	152	24.3(3.8)	15.5

주 : 1) 흡연자의 금연시도율 : (최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 79〉 흡연자의 1개월 내 금연계획률[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,486	4.6(0.6)	12.2	2,269	4.5(0.6)	12.7	217	6.3(2.4)	38.4
연령									
19-29	230	7.6(2.0)	26.4	215	7.1(2.1)	28.8	15	-(-)	-
30-39	482	5.0(1.1)	21.7	455	4.8(1.1)	22.7	27	9.7(6.6)	68.7
40-49	573	3.0(0.8)	26.4	529	3.1(0.8)	27.2	44	1.9(1.9)	100.0
50-59	564	4.0(1.2)	29.3	522	3.6(1.1)	31.4	42	10.1(7.7)	76.0
60-69	312	4.8(1.3)	27.7	284	5.4(1.5)	28.1	28	1.1(1.2)	101.8
70 이상	325	2.1(1.0)	45.8	264	2.4(1.1)	47.9	61	0.7(0.7)	100.5
생애주기별									
19-64	2,018	4.8(0.6)	12.7	1,877	4.6(0.6)	13.3	141	7.5(2.9)	39.1
65 이상	468	2.6(0.8)	32.4	392	2.8(1.0)	34.3	76	1.2(0.9)	74.8
교육수준[2)]									
무학	181	2.0(1.2)	61.8	117	2.6(1.8)	70.6	64	0.9(0.9)	100.6
초등학교	362	1.1(0.5)	46.5	325	1.2(0.6)	49.1	37	0.6(0.7)	102.6
중학교	307	6.5(1.9)	28.7	274	6.2(1.8)	28.3	33	7.9(7.5)	94.5
고등학교	997	5.2(0.9)	18.0	928	5.1(1.0)	19.0	69	7.9(4.1)	51.4
대학교 이상	638	4.3(0.9)	20.8	624	4.1(0.9)	21.8	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	249	4.0(1.2)	29.5	242	3.7(1.2)	31.2	7	-(-)	-
사무직	193	6.0(2.1)	35.2	184	6.3(2.2)	34.9	9	-(-)	-
판매·서비스직	275	7.9(2.2)	27.9	222	6.7(2.2)	33.3	53	15.1(7.2)	47.7
농림어업	464	3.5(0.9)	25.9	449	3.7(0.9)	25.8	15	-(-)	-
기능단순노무직	840	3.0(0.7)	21.9	810	3.1(0.7)	22.1	30	1.1(1.1)	101.5
기타[3)]	463	5.5(1.4)	26.4	361	6.0(1.7)	28.2	102	2.8(1.9)	68.0
월 가구소득									
100만원 이하	364	2.6(0.8)	30.4	294	3.0(1.0)	32.2	70	1.0(0.7)	75.4
101-200만원	402	3.5(1.3)	36.2	357	2.6(1.1)	43.3	45	9.8(6.4)	64.7
201-300만원	461	5.1(1.5)	28.5	420	5.0(1.5)	30.2	41	6.3(4.4)	70.5
301-400만원	432	4.3(1.2)	28.6	408	4.3(1.3)	29.4	24	2.7(2.7)	99.7
401만원 이상	694	5.8(1.0)	17.8	671	5.5(1.0)	18.4	23	13.1(9.1)	69.2
거주유형									
동	728	4.8(0.9)	17.7	663	4.5(0.9)	19.2	65	8.5(3.8)	44.7
읍·면	1,758	4.2(0.6)	13.5	1,606	4.3(0.6)	13.7	152	2.9(1.9)	66.8

주 : 1) 흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 80〉 현재 흡연자의 금연권고 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,486	73.8(1.2)	1.6	2,270	75.3(1.2)	1.6	216	53.2(4.2)	7.8
연령									
19-29	229	62.7(3.9)	6.2	215	63.4(4.1)	6.5	14	-(-)	-
30-39	483	73.6(2.5)	3.5	456	74.2(2.6)	3.5	27	60.1(10.8)	18.0
40-49	574	76.7(2.0)	2.7	530	78.8(2.0)	2.6	44	49.6(9.7)	19.5
50-59	564	80.5(2.1)	2.6	522	82.6(2.1)	2.6	42	51.3(10.4)	20.4
60-69	312	73.1(3.0)	4.1	284	74.6(3.0)	4.1	28	63.8(11.6)	18.2
70 이상	324	72.6(3.0)	4.2	263	77.7(3.1)	4.0	61	45.4(8.5)	18.8
생애주기별									
19-64	2,019	73.7(1.3)	1.7	1,879	75.2(1.3)	1.7	140	51.3(4.7)	9.2
65 이상	467	74.2(2.4)	3.2	391	76.8(2.5)	3.3	76	60.8(7.5)	12.3
교육수준[2]									
무학	180	65.8(4.3)	6.5	116	70.8(4.9)	7.0	64	57.4(8.6)	14.9
초등학교	362	76.1(2.9)	3.8	325	77.7(3.1)	3.9	37	64.0(9.9)	15.5
중학교	310	74.0(2.8)	3.8	277	77.9(2.7)	3.5	33	49.1(11.0)	22.5
고등학교	995	70.6(1.7)	2.5	927	71.6(1.8)	2.6	68	55.5(6.2)	11.2
대학교 이상	638	78.0(2.2)	2.8	624	79.2(2.1)	2.7	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	250	78.5(3.0)	3.8	243	78.9(3.0)	3.8	7	-(-)	-
사무직	193	73.3(3.8)	5.2	184	75.4(4.2)	5.5	9	-(-)	-
판매·서비스직	275	76.4(3.1)	4.0	222	81.6(2.9)	3.6	53	46.6(8.5)	18.2
농림어업	464	77.1(2.3)	3.0	449	77.8(2.2)	2.9	15	-(-)	-
기능단순노무직	840	73.6(1.9)	2.6	810	74.3(1.9)	2.6	30	50.4(10.8)	21.3
기타[3]	462	67.3(3.3)	4.9	361	68.7(3.8)	5.5	101	60.2(6.2)	10.4
월 가구소득									
100만원 이하	364	68.1(3.0)	4.4	294	69.2(3.7)	5.3	70	63.6(7.1)	11.1
101-200만원	400	66.7(3.3)	5.0	355	70.1(3.5)	5.1	45	41.9(9.2)	22.0
201-300만원	461	74.9(2.3)	3.1	420	76.0(2.4)	3.1	41	61.1(10.0)	16.3
301-400만원	433	74.6(2.9)	3.9	409	75.3(3.0)	4.0	24	63.2(10.7)	16.9
401만원 이상	695	77.9(2.0)	2.6	673	79.1(2.0)	2.5	22	37.2(12.0)	32.2
거주유형									
동	728	74.3(1.8)	2.4	663	75.9(1.9)	2.5	65	53.8(6.3)	11.6
읍·면	1,758	73.0(1.2)	1.6	1,607	74.5(1.2)	1.6	151	52.2(4.4)	8.4

주 : 1) 현재 흡연자의 금연권고 경험률 : (주위 사람들로부터 담배를 끊거나 줄이라는 말을 "항상" 또는 "대체로" 듣는 사람의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) ×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 81〉 금연클리닉•금연상담전화 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,520	62.5(0.7)	1.2	5,290	70.2(0.9)	1.3	6,230	54.8(1.0)	1.7
연령									
19-29	1,035	63.2(2.1)	3.2	471	64.6(2.8)	4.3	564	61.5(2.6)	4.3
30-39	1,600	73.6(1.4)	2.0	757	78.3(1.8)	2.2	843	68.5(1.9)	2.7
40-49	1,948	72.9(1.2)	1.7	963	78.1(1.7)	2.2	985	67.3(1.9)	2.9
50-59	2,469	67.6(1.4)	2.0	1,174	76.5(1.5)	2.0	1,295	58.4(2.0)	3.5
60-69	1,922	55.3(1.6)	2.9	894	66.6(2.1)	3.2	1,028	45.9(2.3)	4.9
70 이상	2,546	25.8(1.4)	5.4	1,031	39.3(2.3)	5.9	1,515	16.4(1.2)	7.5
생애주기별									
19-64	8,030	68.6(0.8)	1.2	3,836	73.9(1.0)	1.3	4,194	62.9(1.1)	1.7
65 이상	3,490	33.7(1.3)	4.0	1,454	48.4(1.9)	4.0	2,036	23.1(1.3)	5.8
교육수준[2]									
무학	1,676	16.6(1.1)	6.8	324	29.0(3.2)	10.9	1,352	13.6(1.1)	8.2
초등학교	2,282	46.3(1.5)	3.2	963	54.7(2.2)	4.0	1,319	40.4(1.7)	4.2
중학교	1,378	62.2(1.8)	2.9	678	65.2(2.4)	3.7	700	59.6(2.4)	4.1
고등학교	3,718	69.2(1.1)	1.6	1,923	72.9(1.4)	2.0	1,795	65.0(1.6)	2.4
대학교 이상	2,456	73.1(1.2)	1.7	1,399	76.5(1.5)	2.0	1,057	68.2(1.7)	2.5
직업									
전문행정관리	1,036	74.3(1.6)	2.2	544	78.6(2.2)	2.8	492	69.3(2.4)	3.5
사무직	742	76.1(2.0)	2.7	382	80.6(2.6)	3.2	360	69.9(3.2)	4.5
판매·서비스직	1,293	66.2(1.8)	2.8	423	76.3(3.0)	3.9	870	60.4(2.4)	3.9
농림어업	2,081	56.7(1.4)	2.4	1,198	62.6(1.6)	2.5	883	46.9(2.0)	4.2
기능단순노무직	2,401	67.2(1.2)	1.8	1,580	74.6(1.4)	1.8	821	48.2(2.4)	4.9
기타[3]	3,965	51.4(1.2)	2.4	1,162	54.9(2.2)	4.0	2,803	49.6(1.4)	2.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,278	35.7(1.5)	4.3	859	48.4(2.4)	4.9	1,419	27.0(1.7)	6.4
101-200만원	1,933	57.7(1.6)	2.8	890	67.1(2.2)	3.2	1,043	49.0(2.3)	4.6
201-300만원	1,915	64.6(1.6)	2.4	936	70.0(2.0)	2.8	979	58.6(2.1)	3.6
301-400만원	1,686	69.1(1.5)	2.1	829	73.8(1.8)	2.5	857	64.1(2.0)	3.2
401만원 이상	3,073	69.7(1.4)	2.1	1,499	76.1(1.7)	2.3	1,574	62.7(1.8)	2.9
거주유형									
동	3,213	62.5(1.1)	1.8	1,460	70.0(1.4)	2.0	1,753	55.3(1.4)	2.6
읍·면	8,307	62.5(0.8)	1.3	3,830	70.4(0.9)	1.3	4,477	54.2(1.0)	1.9

주 : 1) 금연클리닉·금연상담전화 인지율 : (금연클리닉 또는 금연상담전화가 있다는 것을 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 82〉 현재 흡연자의 금연클리닉·금연상담전화 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,896	11.1(1.0)	8.9	1,760	11.4(1.0)	9.1	136	6.1(2.4)	39.4
연령									
19-29	175	6.0(2.0)	33.8	164	6.0(2.1)	35.6	11	-(-)	-
30-39	406	12.4(1.7)	14.0	385	12.9(1.8)	14.0	21	0.0(0.0)	.
40-49	480	12.2(2.0)	16.1	441	12.8(2.1)	16.4	39	5.2(3.1)	59.6
50-59	458	10.3(1.9)	18.5	426	10.9(2.0)	18.7	32	2.8(2.8)	99.8
60-69	223	12.8(3.2)	24.8	212	11.4(2.9)	25.8	11	-(-)	-
70 이상	154	16.7(3.6)	21.4	132	17.6(3.9)	22.3	22	8.4(6.2)	73.5
생애주기별									
19-64	1,640	11.0(1.0)	9.4	1,533	11.3(1.1)	9.5	107	5.7(2.6)	45.2
65 이상	256	12.6(2.3)	18.2	227	12.9(2.5)	19.2	29	10.2(5.4)	52.7
교육수준[2]									
무학	64	14.3(6.3)	44.1	44	6.8(3.7)	54.2	20	36.1(18.2)	50.5
초등학교	238	11.8(3.3)	27.6	215	12.7(3.5)	27.3	23	5.2(5.2)	99.6
중학교	238	8.5(2.0)	23.6	211	9.8(2.3)	23.9	27	0.7(0.7)	102.4
고등학교	813	12.0(1.7)	14.3	757	12.5(1.8)	14.5	56	3.9(2.3)	59.7
대학교 이상	543	10.3(1.4)	14.0	533	10.3(1.5)	14.2	10	-(-)	-
직업									
전문행정관리	216	13.6(2.6)	19.4	213	13.7(2.7)	19.4	3	-(-)	-
사무직	170	9.9(2.6)	26.4	163	10.4(2.7)	26.0	7	-(-)	-
판매·서비스직	217	8.2(1.8)	22.1	179	9.0(2.1)	22.7	38	3.4(2.3)	66.7
농림어업	331	11.1(2.0)	17.6	325	11.3(2.0)	17.6	6	-(-)	-
기능단순노무직	668	9.7(1.6)	16.2	649	9.8(1.6)	16.3	19	-(-)	-
기타[3]	293	15.4(2.9)	19.1	231	16.1(3.3)	20.8	62	11.6(5.4)	46.7
월 가구소득									
100만원 이하	196	13.7(3.3)	24.3	164	15.4(3.9)	25.1	32	6.5(4.1)	62.9
101-200만원	288	9.3(1.9)	19.8	262	9.2(1.9)	20.3	26	10.4(7.5)	72.9
201-300만원	366	13.7(2.4)	17.7	335	13.9(2.6)	18.3	31	10.3(6.3)	60.9
301-400만원	361	9.6(1.8)	19.3	341	10.0(1.9)	19.3	20	1.9(2.0)	101.1
401만원 이상	579	10.6(1.6)	15.5	560	10.9(1.7)	15.4	19	-(-)	-
거주유형									
동	560	10.3(1.5)	14.8	518	10.7(1.6)	15.0	42	4.2(3.2)	77.2
읍·면	1,336	12.1(1.0)	8.5	1,242	12.3(1.1)	8.7	94	8.7(3.4)	39.4

주 : 1) 현재 흡연자의 금연클리닉·금연상담전화 인지율 : (최근 1년 동안 금연클리닉, 금연상담전화를 이용한 사람의 수 / 현재 흡연자 중 금연클리닉, 금연상담전화가 있는 것을 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 83〉 가정실내 간접흡연 노출률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	12.7(0.5)	4.2	5,313	10.8(0.7)	6.3	6,288	14.6(0.7)	4.8
연령									
19-29	1,036	21.2(1.7)	7.8	471	22.7(2.4)	10.6	565	19.5(2.0)	10.3
30-39	1,603	12.3(1.0)	8.0	758	9.8(1.4)	14.0	845	15.0(1.3)	9.0
40-49	1,957	14.0(1.2)	8.3	965	10.6(1.5)	14.6	992	17.8(1.6)	8.7
50-59	2,481	10.3(0.9)	9.0	1,179	7.7(1.0)	12.9	1,302	13.1(1.3)	10.1
60-69	1,934	8.3(0.8)	10.0	896	4.4(0.8)	17.6	1,038	11.6(1.3)	11.7
70 이상	2,590	7.3(0.7)	9.3	1,044	4.3(0.8)	18.4	1,546	9.4(0.9)	9.9
생애주기별									
19-64	8,060	13.9(0.6)	4.6	3,846	11.9(0.8)	6.6	4,214	16.0(0.8)	5.3
65 이상	3,541	7.4(0.6)	7.5	1,467	4.6(0.7)	14.8	2,074	9.4(0.8)	8.3
교육수준[2]									
무학	1,706	10.7(1.0)	9.5	328	7.8(2.2)	28.4	1,378	11.4(1.1)	10.1
초등학교	2,307	10.2(0.9)	8.7	973	6.2(1.1)	17.5	1,334	13.0(1.2)	9.2
중학교	1,390	12.5(1.3)	10.5	684	7.6(1.4)	18.6	706	16.7(1.9)	11.6
고등학교	3,730	15.9(0.9)	5.8	1,925	14.5(1.2)	8.2	1,805	17.5(1.2)	6.8
대학교 이상	2,458	10.4(0.8)	7.9	1,400	9.0(1.1)	11.8	1,058	12.3(1.2)	9.6
직업									
전문행정관리	1,038	11.1(1.3)	12.2	545	9.6(1.7)	17.6	493	12.8(1.9)	14.7
사무직	742	11.7(1.5)	12.9	382	11.0(2.1)	19.4	360	12.6(2.1)	16.5
판매·서비스직	1,294	15.5(1.4)	9.1	423	11.7(2.0)	16.8	871	17.8(1.9)	10.9
농림어업	2,099	9.8(0.9)	8.8	1,204	5.7(0.8)	14.1	895	16.4(1.6)	9.7
기능단순노무직	2,411	13.4(1.0)	7.7	1,586	12.4(1.2)	9.3	825	16.1(1.7)	10.6
기타[3]	4,015	12.9(0.8)	6.2	1,172	11.3(1.4)	12.5	2,843	13.6(1.0)	7.0
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	10.0(1.1)	10.7	864	9.4(2.0)	20.8	1,434	10.4(1.1)	10.5
101-200만원	1,953	12.1(1.3)	11.0	898	11.0(1.7)	15.4	1,055	13.0(1.7)	13.0
201-300만원	1,927	13.4(1.2)	9.0	939	11.9(1.7)	14.6	988	15.0(1.5)	10.0
301-400만원	1,698	14.8(1.2)	8.4	831	12.2(1.5)	12.1	867	17.6(1.8)	10.5
401만원 이상	3,086	13.2(1.0)	7.5	1,504	10.9(1.4)	12.5	1,582	15.7(1.2)	7.4
거주유형									
동	3,231	13.7(0.8)	6.1	1,467	12.7(1.1)	8.6	1,764	14.7(1.1)	7.2
읍·면	8,370	11.3(0.5)	4.3	3,846	8.2(0.6)	6.7	4,524	14.5(0.7)	4.9

주 : 1) 가정실내 간접흡연 노출률 : (가정실내 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자("1시간 미만" 또는 "1시간 이상")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 84〉 가정실내 간접흡연 노출시간[1]

(단위 : %)

구분	N	0시간		1시간 미만		1시간 이상	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	87.3(0.5)	0.6	10.4(0.5)	4.4	2.4(0.3)	12.7
성							
남자	5,313	89.2(0.7)	0.8	8.6(0.6)	6.9	2.2(0.3)	15.9
여자	6,288	85.4(0.7)	0.8	12.1(0.6)	5.0	2.5(0.4)	14.5
연령							
19-29	1,036	78.8(1.7)	2.1	17.6(1.5)	8.2	3.6(0.8)	23.1
30-39	1,603	87.7(1.0)	1.1	10.4(0.9)	8.7	1.9(0.5)	27.2
40-49	1,957	86.0(1.2)	1.3	11.7(1.0)	8.9	2.3(0.5)	19.7
50-59	2,481	89.7(0.9)	1.0	7.9(0.7)	9.3	2.4(0.6)	24.8
60-69	1,934	91.7(0.8)	0.9	7.1(0.8)	10.7	1.3(0.3)	27.0
70 이상	2,590	92.7(0.7)	0.7	5.2(0.5)	10.5	2.2(0.5)	23.2
생애주기별							
19-64	8,060	86.1(0.6)	0.7	11.4(0.5)	4.7	2.5(0.3)	14.1
65 이상	3,541	92.6(0.6)	0.6	5.6(0.5)	8.6	1.8(0.3)	18.6
교육수준[2]							
무학	1,706	89.3(1.0)	1.1	7.7(0.8)	10.9	3.0(0.7)	23.6
초등학교	2,307	89.8(0.9)	1.0	7.8(0.8)	9.7	2.3(0.5)	21.0
중학교	1,390	87.5(1.3)	1.5	9.8(1.1)	10.8	2.7(0.9)	31.6
고등학교	3,730	84.1(0.9)	1.1	13.1(0.8)	6.2	2.8(0.5)	16.4
대학교 이상	2,458	89.6(0.8)	0.9	8.9(0.7)	8.0	1.5(0.4)	27.1
직업							
전문행정관리	1,038	88.9(1.3)	1.5	9.8(1.3)	13.2	1.3(0.5)	35.0
사무직	742	88.3(1.5)	1.7	10.3(1.4)	13.9	1.4(0.6)	43.1
판매·서비스직	1,294	84.5(1.4)	1.7	12.1(1.1)	9.2	3.4(0.9)	26.4
농림어업	2,099	90.2(0.9)	1.0	7.8(0.8)	9.9	2.0(0.4)	18.1
기능단순노무직	2,411	86.6(1.0)	1.2	10.4(0.9)	8.5	3.0(0.6)	19.0
기타[3]	4,015	87.1(0.8)	0.9	10.6(0.7)	6.7	2.3(0.4)	16.5
월 가구소득							
100만원 이하	2,298	90.0(1.1)	1.2	7.2(0.8)	11.8	2.8(0.6)	21.5
101-200만원	1,953	87.9(1.3)	1.5	8.5(0.9)	10.6	3.6(1.0)	28.2
201-300만원	1,927	86.6(1.2)	1.4	11.2(1.0)	9.1	2.2(0.7)	29.9
301-400만원	1,698	85.2(1.2)	1.4	12.6(1.2)	9.4	2.1(0.5)	24.7
401만원 이상	3,086	86.8(1.0)	1.1	11.1(0.9)	8.0	2.1(0.4)	20.2
거주유형							
동	3,231	86.3(0.8)	1.0	11.0(0.7)	6.3	2.7(0.5)	17.8
읍·면	8,370	88.7(0.5)	0.5	9.5(0.5)	5.2	1.8(0.2)	10.6

주 : 1) 가정실내 간접흡연 노출시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 85〉 직장실내 간접흡연 노출률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	8,468	26.1(0.6)	2.5	4,460	33.4(0.9)	2.7	4,008	16.2(0.8)	5.1
연령									
19-29	715	27.9(2.0)	7.3	339	37.0(2.9)	7.8	376	16.8(2.3)	13.6
30-39	1,300	31.4(1.5)	4.7	728	40.1(2.1)	5.3	572	17.9(1.9)	10.7
40-49	1,704	30.5(1.4)	4.5	932	39.1(1.9)	4.8	772	18.5(1.9)	10.1
50-59	2,061	24.3(1.4)	5.8	1,111	29.0(1.9)	6.4	950	17.3(1.6)	9.4
60-69	1,315	17.7(1.3)	7.4	694	21.5(1.9)	9.0	621	13.1(1.8)	13.8
70 이상	1,373	7.2(1.0)	13.4	656	9.5(1.6)	17.1	717	4.9(0.9)	19.0
생애주기별									
19-64	6,464	28.1(0.7)	2.5	3,496	35.5(1.0)	2.8	2,968	17.6(0.9)	5.3
65 이상	2,004	9.8(0.9)	9.1	964	13.1(1.4)	10.7	1,040	6.6(1.0)	15.2
교육수준[2]									
무학	921	11.6(1.5)	13.2	217	20.2(3.9)	19.2	704	8.6(1.5)	17.3
초등학교	1,605	17.7(1.5)	8.2	775	21.4(2.2)	10.2	830	13.9(1.6)	11.6
중학교	1,027	26.2(1.9)	7.2	562	32.7(2.8)	8.4	465	19.1(2.6)	13.8
고등학교	2,858	29.2(1.0)	3.6	1,630	35.7(1.4)	3.9	1,228	19.5(1.5)	7.7
대학교 이상	2,049	27.3(1.2)	4.3	1,273	34.7(1.6)	4.6	776	14.1(1.5)	10.5
직업									
전문행정관리	1,023	22.1(1.7)	7.7	540	31.7(2.8)	8.9	483	10.6(1.7)	15.7
사무직	738	27.2(2.0)	7.3	380	30.5(2.7)	8.9	358	22.7(2.6)	11.6
판매·서비스직	1,264	30.1(1.8)	5.8	416	41.2(2.9)	7.0	848	23.4(2.0)	8.5
농림어업	1,985	9.9(0.8)	7.9	1,163	12.0(1.1)	9.1	822	6.2(0.9)	14.3
기능단순노무직	2,293	36.0(1.2)	3.4	1,548	42.6(1.6)	3.7	745	17.6(1.9)	10.6
기타[3]	1,163	13.9(1.5)	11.0	412	18.4(2.7)	14.8	751	10.3(1.8)	17.7
월 가구소득									
100만원 이하	1,294	16.0(1.5)	9.6	547	20.6(2.5)	12.4	747	12.2(1.9)	15.4
101-200만원	1,419	26.3(1.6)	6.3	728	30.6(2.3)	7.6	691	21.1(2.5)	12.1
201-300만원	1,454	28.7(1.7)	5.8	822	36.7(2.4)	6.6	632	15.5(1.7)	11.0
301-400만원	1,325	27.7(1.6)	5.6	749	35.6(2.2)	6.1	576	15.4(1.8)	11.9
401만원 이상	2,531	27.0(1.2)	4.4	1,381	34.4(1.5)	4.5	1,150	16.9(1.4)	8.2
거주유형									
동	2,157	29.0(1.0)	3.4	1,169	37.2(1.4)	3.8	988	17.8(1.3)	7.3
읍·면	6,311	22.4(0.7)	3.3	3,291	28.4(1.0)	3.4	3,020	14.0(0.9)	6.1

주 : 1) 직장실내 간접흡연 노출률 : (직장실내 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자("1시간 미만" 또는 "1시간 이상")의 수 / 조사대상 응답자 수[+]) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

+ 조사대상 응답자 수 : 직장을 다니고 있지 않은(주부, 학생, 무직) 대상자 제외

〈표 86〉 직장실내 간접흡연 노출시간[1]

(단위 : %)

구분	N	0시간		1시간 미만		1시간 이상	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	8,468	73.9(0.6)	0.9	20.6(0.6)	2.7	5.5(0.4)	7.0
성							
남자	4,460	66.6(0.9)	1.4	26.4(0.8)	3.1	6.9(0.5)	7.7
여자	4,008	83.8(0.8)	1.0	12.7(0.7)	5.6	3.4(0.5)	14.0
연령							
19-29	715	72.1(2.0)	2.8	22.6(1.9)	8.5	5.3(1.0)	19.7
30-39	1,300	68.6(1.5)	2.1	24.2(1.4)	5.7	7.2(1.0)	13.8
40-49	1,704	69.5(1.4)	2.0	24.5(1.2)	5.0	6.1(0.8)	13.1
50-59	2,061	75.7(1.4)	1.9	18.7(1.2)	6.4	5.7(0.7)	13.0
60-69	1,315	82.3(1.3)	1.6	14.7(1.1)	7.5	3.0(0.8)	25.3
70 이상	1,373	92.8(1.0)	1.0	6.1(0.8)	13.0	1.1(0.6)	51.1
생애주기별							
19-64	6,464	71.9(0.7)	1.0	22.2(0.6)	2.8	5.9(0.4)	7.1
65 이상	2,004	90.2(0.9)	1.0	8.2(0.8)	9.7	1.7(0.5)	27.9
교육수준[2]							
무학	921	88.4(1.5)	1.7	9.1(1.2)	12.9	2.5(1.1)	45.5
초등학교	1,605	82.3(1.5)	1.8	14.7(1.2)	8.2	3.0(0.7)	24.7
중학교	1,027	73.8(1.9)	2.6	18.7(1.7)	9.0	7.5(1.4)	18.2
고등학교	2,858	70.8(1.0)	1.5	22.4(0.9)	4.1	6.8(0.7)	9.8
대학교 이상	2,049	72.7(1.2)	1.6	22.7(1.1)	4.8	4.6(0.6)	12.7
직업							
전문행정관리	1,023	77.9(1.7)	2.2	18.4(1.6)	8.5	3.7(0.8)	21.2
사무직	738	72.8(2.0)	2.7	22.5(1.8)	8.2	4.8(1.0)	22.0
판매·서비스직	1,264	69.9(1.8)	2.5	21.7(1.5)	7.0	8.4(1.2)	14.0
농림어업	1,985	90.1(0.8)	0.9	8.7(0.8)	8.8	1.2(0.3)	23.9
기능단순노무직	2,293	64.0(1.2)	1.9	28.1(1.1)	3.9	8.0(0.8)	10.2
기타[3]	1,163	86.1(1.5)	1.8	12.0(1.4)	11.8	1.9(0.5)	23.9
월 가구소득							
100만원 이하	1,294	84.0(1.5)	1.8	12.4(1.2)	10.1	3.7(0.9)	24.2
101-200만원	1,419	73.7(1.6)	2.2	18.5(1.5)	8.1	7.8(1.2)	15.0
201-300만원	1,454	71.3(1.7)	2.3	22.2(1.4)	6.5	6.5(0.9)	13.5
301-400만원	1,325	72.3(1.6)	2.1	22.0(1.5)	6.8	5.7(0.9)	15.0
401만원 이상	2,531	73.0(1.2)	1.6	22.3(1.0)	4.7	4.7(0.7)	13.9
거주유형							
동	2,157	71.0(1.0)	1.4	22.3(0.9)	3.9	6.7(0.6)	9.2
읍·면	6,311	77.6(0.7)	0.9	18.5(0.7)	3.6	3.9(0.3)	8.7

주 : 1) 직장실내 간접흡연 노출시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수+) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

+ 조사대상 응답자 수 : 직장을 다니고 있지 않은(주부, 학생, 무직) 대상자 제외

〈표 87〉 공공장소 간접흡연 노출률[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,579	85.7(0.4)	0.5	5,306	87.2(0.6)	0.7	6,273	84.1(0.5)	0.6
연령									
19-29	1,036	93.0(0.8)	0.9	471	93.7(1.2)	1.2	565	92.1(1.1)	1.2
30-39	1,603	90.4(0.9)	1.0	758	89.0(1.2)	1.3	845	91.9(1.1)	1.2
40-49	1,957	85.4(1.0)	1.1	965	86.4(1.3)	1.5	992	84.4(1.3)	1.5
50-59	2,479	85.4(0.9)	1.0	1,177	86.0(1.2)	1.4	1,302	84.8(1.2)	1.4
60-69	1,931	84.3(1.0)	1.2	895	85.7(1.3)	1.5	1,036	83.0(1.3)	1.6
70 이상	2,573	70.6(1.2)	1.7	1,040	77.6(1.5)	2.0	1,533	65.7(1.6)	2.4
생애주기별									
19-64	8,056	88.1(0.4)	0.5	3,843	88.4(0.6)	0.7	4,213	87.7(0.6)	0.6
65 이상	3,523	74.4(1.0)	1.3	1,463	80.3(1.2)	1.5	2,060	70.2(1.2)	1.7
교육수준[2)]									
무학	1,693	70.1(1.5)	2.2	326	77.5(2.8)	3.7	1,367	68.3(1.7)	2.4
초등학교	2,302	79.3(1.2)	1.5	970	83.4(1.5)	1.8	1,332	76.5(1.5)	1.9
중학교	1,387	82.6(1.3)	1.6	683	81.2(1.8)	2.2	704	83.7(1.6)	2.0
고등학교	3,729	87.8(0.7)	0.8	1,924	87.8(1.0)	1.1	1,805	87.8(0.9)	1.0
대학교 이상	2,458	90.8(0.7)	0.7	1,400	90.0(0.9)	1.0	1,058	91.8(1.0)	1.1
직업									
전문행정관리	1,038	90.4(0.9)	1.0	545	88.8(1.4)	1.6	493	92.3(1.3)	1.4
사무직	742	90.9(1.2)	1.3	382	89.5(1.9)	2.1	360	92.8(1.4)	1.5
판매·서비스직	1,294	87.8(1.0)	1.2	423	92.0(1.4)	1.5	871	85.3(1.3)	1.6
농림어업	2,093	76.7(1.2)	1.5	1,200	80.2(1.4)	1.7	893	71.1(1.7)	2.3
기능단순노무직	2,409	86.8(0.9)	1.0	1,586	87.9(1.0)	1.2	823	83.9(1.5)	1.8
기타[3)]	4,001	83.2(0.7)	0.9	1,169	85.5(1.1)	1.3	2,832	82.1(0.9)	1.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,287	75.4(1.3)	1.7	862	79.7(1.7)	2.1	1,425	72.4(1.4)	2.0
101-200만원	1,951	83.4(1.1)	1.3	897	84.4(1.6)	1.9	1,054	82.5(1.3)	1.5
201-300만원	1,926	85.1(1.0)	1.2	938	86.6(1.3)	1.5	988	83.4(1.4)	1.7
301-400만원	1,695	86.0(1.1)	1.3	829	86.5(1.6)	1.8	866	85.5(1.3)	1.5
401만원 이상	3,082	90.3(0.7)	0.7	1,503	90.8(0.9)	1.0	1,579	89.7(0.9)	1.0
거주유형									
동	3,229	90.1(0.5)	0.6	1,466	90.7(0.8)	0.9	1,763	89.4(0.7)	0.8
읍·면	8,350	79.2(0.6)	0.8	3,840	82.2(0.7)	0.9	4,510	76.0(0.8)	1.0

주 : 1) 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 88〉 금연캠페인 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,556	84.7(0.5)	0.6	5,300	86.8(0.7)	0.8	6,256	82.6(0.6)	0.8
연령									
19-29	1,036	85.2(1.4)	1.6	471	85.8(2.2)	2.6	565	84.6(1.6)	1.9
30-39	1,601	88.4(1.0)	1.2	758	87.6(1.3)	1.5	843	89.2(1.4)	1.5
40-49	1,955	89.4(0.9)	1.1	964	91.0(1.2)	1.3	991	87.7(1.5)	1.7
50-59	2,475	86.4(0.9)	1.1	1,175	87.3(1.2)	1.4	1,300	85.5(1.3)	1.5
60-69	1,930	85.2(1.1)	1.3	895	88.1(1.3)	1.5	1,035	82.7(1.5)	1.8
70 이상	2,559	67.5(1.4)	2.0	1,037	76.1(1.9)	2.5	1,522	61.5(1.7)	2.7
생애주기별									
19-64	8,047	87.4(0.6)	0.7	3,841	88.1(0.8)	0.9	4,206	86.6(0.7)	0.8
65 이상	3,509	72.0(1.1)	1.5	1,459	78.9(1.5)	2.0	2,050	67.1(1.3)	2.0
교육수준[2]									
무학	1,684	62.4(1.7)	2.8	326	67.0(4.0)	6.0	1,358	61.2(1.9)	3.1
초등학교	2,297	80.2(1.3)	1.6	968	79.3(1.8)	2.3	1,329	80.9(1.5)	1.8
중학교	1,382	85.0(1.2)	1.4	681	85.8(1.6)	1.8	701	84.2(1.8)	2.1
고등학교	3,726	86.7(0.8)	0.9	1,922	87.0(1.1)	1.3	1,804	86.3(1.0)	1.1
대학교 이상	2,457	90.0(0.8)	0.9	1,400	90.8(1.0)	1.1	1,057	88.7(1.4)	1.5
직업									
전문행정관리	1,035	90.2(1.2)	1.4	545	90.8(1.6)	1.7	490	89.5(1.7)	1.9
사무직	742	89.9(1.3)	1.5	382	90.6(1.9)	2.1	360	88.9(2.1)	2.4
판매·서비스직	1,292	86.9(1.3)	1.5	423	90.5(1.6)	1.8	869	84.7(1.6)	1.9
농림어업	2,095	81.0(1.2)	1.4	1,202	83.5(1.4)	1.7	893	76.9(1.6)	2.1
기능단순노무직	2,407	86.4(0.9)	1.1	1,583	86.7(1.1)	1.3	824	85.4(1.5)	1.8
기타[3]	3,983	80.3(0.9)	1.1	1,164	82.7(1.6)	2.0	2,819	79.1(1.0)	1.2
월 가구소득									
100만원 이하	2,275	72.3(1.4)	1.9	857	79.3(2.2)	2.8	1,418	67.6(1.6)	2.3
101-200만원	1,950	83.5(1.3)	1.6	897	85.6(1.6)	1.9	1,053	81.6(1.6)	2.0
201-300만원	1,922	85.6(1.1)	1.3	936	85.4(1.3)	1.6	986	85.8(1.4)	1.6
301-400만원	1,691	86.9(1.1)	1.3	830	87.8(1.5)	1.7	861	86.0(1.5)	1.7
401만원 이상	3,082	88.4(0.9)	1.0	1,504	90.1(1.2)	1.3	1,578	86.6(1.1)	1.3
거주유형									
동	3,223	85.2(0.8)	0.9	1,464	87.1(1.1)	1.3	1,759	83.5(0.9)	1.1
읍·면	8,333	84.0(0.6)	0.7	3,836	86.4(0.8)	0.9	4,497	81.4(0.7)	0.9

주 : 1) 금연캠페인 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 89〉 금연교육 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	5.4(0.3)	5.6	5,312	8.2(0.5)	6.0	6,285	2.7(0.3)	10.9
연령									
19-29	1,036	9.4(1.1)	11.7	471	11.8(1.7)	14.2	565	6.6(1.3)	20.1
30-39	1,603	8.6(0.8)	9.7	758	13.8(1.4)	10.2	845	3.2(0.8)	26.1
40-49	1,957	5.3(0.7)	12.4	965	8.0(1.1)	14.3	992	2.3(0.6)	24.3
50-59	2,481	3.4(0.5)	13.8	1,179	5.0(0.8)	16.6	1,302	1.7(0.4)	21.1
60-69	1,933	2.3(0.6)	25.5	895	3.3(0.9)	26.2	1,038	1.5(0.6)	39.0
70 이상	2,587	1.6(0.4)	26.0	1,044	3.2(1.0)	30.6	1,543	0.5(0.1)	27.5
생애주기별									
19-64	8,060	6.3(0.4)	5.9	3,846	9.1(0.6)	6.5	4,214	3.2(0.4)	11.4
65 이상	3,537	1.6(0.3)	21.2	1,466	2.9(0.8)	25.9	2,071	0.6(0.1)	24.6
교육수준[2]									
무학	1,703	1.2(0.3)	26.5	328	2.0(0.6)	30.6	1,375	1.0(0.4)	37.4
초등학교	2,307	1.4(0.3)	24.4	973	2.0(0.7)	32.7	1,334	1.0(0.3)	36.2
중학교	1,389	1.6(0.3)	19.6	683	2.7(0.6)	22.8	706	0.7(0.3)	36.4
고등학교	3,730	5.6(0.5)	9.2	1,925	8.2(0.8)	9.9	1,805	2.8(0.5)	18.0
대학교 이상	2,458	9.3(0.8)	8.4	1,400	12.1(1.1)	8.8	1,058	5.2(0.9)	17.0
직업									
전문행정관리	1,038	10.6(1.3)	12.6	545	13.2(1.8)	14.0	493	7.5(1.6)	21.5
사무직	742	9.8(1.3)	13.1	382	13.7(2.1)	15.2	360	4.6(1.1)	23.7
판매·서비스직	1,294	3.4(0.6)	17.5	423	6.4(1.3)	20.2	871	1.6(0.5)	32.4
농림어업	2,098	2.2(0.3)	15.0	1,203	3.0(0.4)	14.9	895	1.0(0.4)	37.2
기능단순노무직	2,411	6.5(0.7)	10.6	1,586	7.9(0.9)	11.5	825	3.1(0.8)	25.6
기타[3]	4,012	3.2(0.4)	13.9	1,172	6.6(1.1)	17.3	2,840	1.5(0.3)	21.2
월 가구소득									
100만원 이하	2,294	2.4(0.5)	22.1	863	4.0(1.0)	25.9	1,431	1.3(0.5)	40.6
101-200만원	1,953	3.6(0.7)	20.2	898	5.1(1.3)	25.0	1,055	2.2(0.7)	32.2
201-300만원	1,927	4.9(0.6)	13.2	939	8.1(1.1)	14.0	988	1.4(0.5)	35.3
301-400만원	1,698	4.7(0.6)	13.2	831	7.0(1.1)	15.4	867	2.2(0.5)	24.5
401만원 이상	3,086	7.9(0.6)	7.9	1,504	11.4(1.0)	9.0	1,582	4.0(0.6)	14.2
거주유형									
동	3,229	6.1(0.5)	7.7	1,467	9.1(0.8)	8.4	1,762	3.1(0.4)	14.1
읍·면	8,368	4.5(0.3)	6.5	3,845	7.0(0.5)	7.3	4,523	1.9(0.3)	14.1

주 : 1) 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 90〉 현재 흡연자의 금연교육 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,489	10.2(0.8)	7.3	2,272	10.6(0.8)	7.5	217	4.7(1.5)	32.4
연령									
19-29	230	10.7(2.3)	21.3	215	10.8(2.4)	22.4	15	-(-)	-
30-39	483	16.1(1.7)	10.8	456	16.6(1.8)	10.9	27	3.8(3.8)	98.8
40-49	574	8.7(1.5)	17.5	530	9.3(1.6)	17.6	44	1.8(1.7)	98.4
50-59	565	6.0(1.3)	21.9	523	6.3(1.4)	22.3	42	2.3(2.3)	99.8
60-69	312	7.4(2.0)	27.1	284	6.5(1.8)	28.6	28	13.0(8.3)	64.4
70 이상	325	8.8(3.2)	36.5	264	10.4(3.8)	36.5	61	0.8(0.8)	100.2
생애주기별									
19-64	2,021	10.5(0.8)	7.7	1,880	10.9(0.9)	7.9	141	4.9(1.8)	36.3
65 이상	468	7.2(2.2)	30.9	392	7.8(2.6)	33.1	76	4.0(2.8)	69.8
교육수준[2]									
무학	181	6.1(2.5)	40.9	117	4.9(1.7)	33.8	64	7.9(6.2)	77.7
초등학교	362	4.9(1.7)	35.0	325	4.6(1.8)	39.7	37	7.3(5.1)	69.9
중학교	310	3.4(1.1)	30.9	277	4.0(1.2)	31.0	33	0.0(0.0)	.
고등학교	997	10.3(1.2)	11.8	928	10.6(1.3)	12.2	69	6.1(2.0)	33.5
대학교 이상	638	13.7(1.5)	11.1	624	14.1(1.6)	11.1	14	-(-)	-
직업									
전문행정관리	250	12.5(2.4)	19.6	243	12.9(2.5)	19.5	7	-(-)	-
사무직	193	14.9(2.8)	18.9	184	15.6(2.9)	18.9	9	-(-)	-
판매·서비스직	275	7.5(1.7)	22.2	222	8.4(1.9)	23.0	53	2.3(1.8)	75.3
농림어업	465	5.1(0.9)	16.7	450	5.3(0.9)	16.7	15	-(-)	-
기능단순노무직	841	10.6(1.3)	12.2	811	10.6(1.3)	12.5	30	12.6(4.5)	35.3
기타[3]	463	9.6(2.1)	22.1	361	10.4(2.4)	23.4	102	5.4(3.2)	58.9
월 가구소득									
100만원 이하	364	6.8(1.9)	27.9	294	7.7(2.3)	29.6	70	3.2(2.3)	70.9
101-200만원	402	8.4(2.3)	27.3	357	8.2(2.5)	29.8	45	9.5(5.3)	55.8
201-300만원	461	9.8(1.7)	17.3	420	10.4(1.8)	17.5	41	2.3(2.3)	100.1
301-400만원	433	9.2(1.5)	16.8	409	9.3(1.6)	17.6	24	8.2(1.8)	22.0
401만원 이상	696	12.9(1.5)	11.3	673	13.3(1.5)	11.2	23	0.0(0.0)	.
거주유형									
동	728	11.2(1.2)	10.3	663	11.6(1.2)	10.6	65	5.4(2.2)	41.5
읍·면	1,761	8.8(0.8)	8.7	1,609	9.2(0.8)	9.0	152	3.7(1.9)	50.7

주 : 1) 현재 흡연자의 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 91〉 금연구역 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,576	93.7(0.3)	0.3	5,307	97.1(0.3)	0.3	6,269	90.3(0.4)	0.5
연령									
19-29	1,036	98.0(0.5)	0.5	471	98.5(0.7)	0.7	565	97.5(0.7)	0.7
30-39	1,603	99.4(0.2)	0.2	758	99.5(0.3)	0.3	845	99.3(0.3)	0.3
40-49	1,957	99.0(0.3)	0.3	965	99.7(0.3)	0.3	992	98.2(0.6)	0.6
50-59	2,480	98.0(0.3)	0.3	1,179	98.9(0.3)	0.3	1,301	97.1(0.5)	0.5
60-69	1,932	91.5(0.9)	1.0	895	97.0(0.6)	0.6	1,037	87.0(1.5)	1.7
70 이상	2,568	65.2(1.5)	2.3	1,039	80.9(1.8)	2.3	1,529	54.1(1.8)	3.4
생애주기별									
19-64	8,057	98.3(0.2)	0.2	3,845	99.1(0.2)	0.2	4,212	97.6(0.3)	0.3
65 이상	3,519	71.6(1.2)	1.7	1,462	85.2(1.4)	1.6	2,057	61.8(1.6)	2.5
교육수준[2]									
무학	1,687	57.4(1.8)	3.1	326	68.6(3.7)	5.4	1,361	54.6(1.9)	3.5
초등학교	2,304	86.7(0.9)	1.0	972	91.5(1.1)	1.2	1,332	83.3(1.3)	1.6
중학교	1,389	95.2(0.9)	1.0	683	97.5(0.5)	0.6	706	93.3(1.6)	1.7
고등학교	3,729	98.7(0.2)	0.2	1,924	98.4(0.4)	0.4	1,805	99.0(0.3)	0.3
대학교 이상	2,457	99.3(0.2)	0.3	1,399	99.5(0.2)	0.2	1,058	99.1(0.4)	0.4
직업									
전문행정관리	1,038	99.8(0.1)	0.1	545	99.6(0.3)	0.3	493	100.0(0.0)	0.0
사무직	742	99.6(0.3)	0.3	382	99.9(0.1)	0.1	360	99.1(0.7)	0.7
판매·서비스직	1,294	98.7(0.5)	0.5	423	99.0(0.7)	0.7	871	98.5(0.4)	0.4
농림어업	2,096	88.8(0.8)	0.9	1,203	94.0(0.7)	0.8	893	80.5(1.4)	1.8
기능단순노무직	2,410	96.9(0.4)	0.4	1,586	99.2(0.3)	0.3	824	90.9(1.2)	1.3
기타[3]	3,994	86.9(0.7)	0.8	1,167	91.7(1.0)	1.1	2,827	84.5(0.9)	1.0
월 가구소득									
100만원 이하	2,288	74.9(1.4)	1.9	862	86.7(1.7)	2.0	1,426	66.8(1.8)	2.7
101-200만원	1,951	90.7(0.9)	1.0	897	95.3(0.9)	0.9	1,054	86.4(1.4)	1.6
201-300만원	1,925	96.3(0.5)	0.5	939	97.9(0.6)	0.6	986	94.7(0.8)	0.9
301-400만원	1,696	97.2(0.5)	0.5	830	99.1(0.3)	0.3	866	95.2(0.9)	0.9
401만원 이상	3,083	98.4(0.3)	0.3	1,503	99.0(0.3)	0.3	1,580	97.7(0.3)	0.3
거주유형									
동	3,229	95.7(0.4)	0.4	1,467	98.1(0.4)	0.4	1,762	93.4(0.6)	0.7
읍·면	8,347	90.7(0.4)	0.4	3,840	95.6(0.3)	0.4	4,507	85.5(0.6)	0.6

주 : 1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 "설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다" 또는 "설정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 92〉 금연구역 내 흡연 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,185	25.3(1.6)	6.3	1,108	25.7(1.6)	6.2	77	18.3(6.4)	34.7
연령									
19-29	123	33.9(4.9)	14.4	115	34.4(5.0)	14.5	8	-(-)	-
30-39	246	27.8(3.6)	13.0	235	28.2(3.8)	13.3	11	-(-)	-
40-49	338	25.1(3.1)	12.2	307	25.1(3.2)	12.7	31	25.2(11.7)	46.5
50-59	281	17.9(2.7)	14.9	268	18.6(2.8)	14.8	13	-(-)	-
60-69	135	21.9(3.8)	17.2	129	22.7(3.9)	17.2	6	-(-)	-
70 이상	62	10.6(3.9)	36.4	54	11.5(4.2)	36.6	8	-(-)	-
생애주기별									
19-64	1,062	25.6(1.7)	6.5	994	26.0(1.7)	6.4	68	18.5(6.6)	35.8
65 이상	123	19.3(4.0)	21.0	114	19.5(4.2)	21.7	9	-(-)	-
교육수준[2]									
무학	23	28.2(11.6)	41.1	17	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	118	19.8(4.1)	20.7	107	20.9(4.4)	21.3	11	-(-)	-
중학교	140	20.3(3.9)	19.4	128	22.3(4.2)	18.8	12	-(-)	-
고등학교	514	23.5(2.0)	8.7	474	23.7(2.1)	8.9	40	21.6(9.0)	41.7
대학교 이상	390	29.1(2.8)	9.6	382	29.1(2.8)	9.7	8	-(-)	-
직업									
전문행정관리	157	28.8(4.9)	17.0	154	29.5(5.0)	16.9	3	-(-)	-
사무직	124	25.1(5.2)	20.7	119	23.6(4.8)	20.3	5	-(-)	-
판매·서비스직	138	24.9(4.9)	19.6	111	26.0(5.3)	20.4	27	19.0(10.0)	52.6
농림어업	186	21.3(3.3)	15.3	184	21.4(3.3)	15.4	2	-(-)	-
기능단순노무직	406	24.2(2.8)	11.4	394	24.8(2.8)	11.5	12	-(-)	-
기타[3]	173	26.7(4.2)	15.8	146	27.6(4.5)	16.3	27	19.0(11.5)	60.4
월 가구소득									
100만원 이하	90	27.1(6.3)	23.3	76	26.8(7.0)	26.0	14	-(-)	-
101-200만원	187	25.7(4.0)	15.4	166	24.6(4.2)	16.9	21	32.8(14.4)	44.0
201-300만원	216	35.8(3.6)	10.0	201	38.2(3.6)	9.5	15	-(-)	-
301-400만원	223	14.9(2.9)	19.2	212	15.1(3.0)	19.6	11	-(-)	-
401만원 이상	409	26.0(2.6)	10.1	395	26.4(2.6)	10.0	14	-(-)	-
거주유형									
동	377	28.6(2.4)	8.3	350	28.7(2.4)	8.2	27	26.6(10.0)	37.5
읍·면	808	20.2(1.6)	7.9	758	21.0(1.7)	8.1	50	5.1(3.8)	74.4

주 : 1) 금연구역 내 흡연 경험률 : (금연구역 내에서 "항상" 또는 "가끔" 흡연하는 사람의 수 / 금연구역이 설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 93〉 평생음주율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	84.8(0.5)	0.6	5,313	92.9(0.5)	0.5	6,287	76.8(0.7)	0.9
연령									
19-29	1,036	93.2(1.0)	1.0	471	94.3(1.4)	1.5	565	91.8(1.1)	1.2
30-39	1,603	93.7(0.7)	0.7	758	95.3(0.9)	0.9	845	92.0(1.1)	1.2
40-49	1,957	88.5(1.0)	1.2	965	93.7(1.0)	1.1	992	82.9(1.6)	1.9
50-59	2,481	83.3(1.0)	1.3	1,179	91.8(0.9)	1.0	1,302	74.4(1.8)	2.4
60-69	1,934	74.8(1.4)	1.9	896	91.7(1.2)	1.3	1,038	60.8(2.1)	3.5
70 이상	2,589	65.7(1.3)	1.9	1,044	87.7(1.3)	1.5	1,545	50.4(1.7)	3.4
생애주기별									
19-64	8,060	88.6(0.5)	0.6	3,846	93.6(0.5)	0.6	4,214	83.2(0.7)	0.9
65 이상	3,540	67.4(1.1)	1.6	1,467	88.9(1.0)	1.1	2,073	52.1(1.5)	2.9
교육수준[2]									
무학	1,705	64.0(1.6)	2.6	328	88.8(2.3)	2.5	1,377	58.0(1.9)	3.3
초등학교	2,307	73.5(1.4)	1.9	973	89.0(1.4)	1.6	1,334	62.7(1.8)	2.9
중학교	1,390	80.4(1.3)	1.6	684	89.8(1.5)	1.7	706	72.5(1.9)	2.6
고등학교	3,730	88.8(0.7)	0.8	1,925	93.5(0.7)	0.8	1,805	83.4(1.2)	1.5
대학교 이상	2,458	91.6(0.8)	0.9	1,400	94.5(1.0)	1.0	1,058	87.4(1.3)	1.5
직업									
전문행정관리	1,038	90.6(1.2)	1.3	545	94.4(1.1)	1.2	493	86.2(1.9)	2.2
사무직	742	92.7(1.5)	1.6	382	95.5(1.5)	1.6	360	88.8(2.1)	2.4
판매·서비스직	1,294	86.7(1.4)	1.6	423	94.2(1.3)	1.4	871	82.3(1.8)	2.2
농림어업	2,099	82.4(1.0)	1.3	1,204	91.5(1.1)	1.2	895	67.7(2.0)	3.0
기능단순노무직	2,411	89.3(0.8)	0.9	1,586	93.1(0.8)	0.8	825	79.3(1.9)	2.4
기타[3]	4,014	77.5(0.9)	1.2	1,172	90.6(1.1)	1.2	2,842	71.0(1.2)	1.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	70.8(1.3)	1.9	864	88.7(1.3)	1.5	1,434	58.6(1.8)	3.0
101-200만원	1,953	80.1(1.2)	1.5	898	90.1(1.4)	1.6	1,055	70.8(1.8)	2.6
201-300만원	1,927	87.2(0.9)	1.1	939	94.4(0.9)	0.9	988	79.2(1.6)	2.1
301-400만원	1,697	88.4(0.9)	1.0	831	93.3(0.9)	1.0	866	83.2(1.6)	1.9
401만원 이상	3,086	88.9(1.0)	1.2	1,504	94.1(1.0)	1.1	1,582	83.2(1.4)	1.7
거주유형									
동	3,231	86.4(0.7)	0.9	1,467	93.3(0.8)	0.8	1,764	79.6(1.0)	1.3
읍·면	8,369	82.6(0.5)	0.6	3,846	92.3(0.5)	0.5	4,523	72.6(0.8)	1.1

주 : 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 94〉 연간음주율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	73.1(0.6)	0.8	5,312	82.9(0.6)	0.8	6,287	63.4(0.8)	1.3
연령									
19-29	1,036	86.9(1.1)	1.3	471	91.1(1.6)	1.7	565	81.9(1.6)	2.0
30-39	1,603	85.7(1.0)	1.1	758	91.6(0.9)	1.0	845	79.4(1.6)	2.0
40-49	1,957	80.5(1.2)	1.5	965	88.5(1.2)	1.4	992	71.9(1.8)	2.6
50-59	2,480	70.8(1.2)	1.7	1,178	80.2(1.5)	1.8	1,302	61.0(1.9)	3.2
60-69	1,934	55.8(1.6)	3.0	896	70.4(2.2)	3.2	1,038	43.6(2.1)	4.8
70 이상	2,589	42.7(1.3)	3.1	1,044	57.5(2.1)	3.7	1,545	32.4(1.5)	4.7
생애주기별									
19-64	8,059	79.0(0.6)	0.8	3,845	86.8(0.7)	0.8	4,214	70.7(0.9)	1.3
65 이상	3,540	45.5(1.1)	2.4	1,467	59.8(1.6)	2.7	2,073	35.3(1.4)	4.0
교육수준[2]									
무학	1,705	43.4(1.7)	3.9	328	63.1(3.6)	5.7	1,377	38.6(1.8)	4.7
초등학교	2,307	53.9(1.4)	2.5	973	66.4(2.0)	3.0	1,334	45.1(1.8)	3.9
중학교	1,389	65.9(1.6)	2.4	683	74.1(2.2)	3.0	706	59.0(2.3)	3.9
고등학교	3,730	80.2(0.9)	1.1	1,925	85.9(1.0)	1.1	1,805	73.8(1.4)	1.9
대학교 이상	2,458	82.5(1.0)	1.2	1,400	88.1(1.1)	1.2	1,058	74.4(1.5)	2.1
직업									
전문행정관리	1,038	82.9(1.5)	1.7	545	87.7(1.6)	1.8	493	77.4(2.1)	2.8
사무직	742	89.0(1.7)	1.9	382	91.8(1.8)	2.0	360	85.3(2.3)	2.7
판매·서비스직	1,294	78.0(1.5)	1.9	423	89.0(1.7)	1.9	871	71.6(2.0)	2.8
농림어업	2,098	65.9(1.3)	2.0	1,203	72.8(1.6)	2.1	895	54.7(2.1)	3.9
기능단순노무직	2,411	81.8(1.0)	1.2	1,586	86.7(1.0)	1.1	825	69.1(2.3)	3.3
기타[3]	4,014	59.4(1.1)	1.9	1,172	72.4(1.6)	2.2	2,842	53.0(1.3)	2.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	51.0(1.4)	2.8	864	65.9(2.1)	3.2	1,434	41.0(1.8)	4.4
101-200만원	1,952	65.1(1.4)	2.2	897	74.7(1.8)	2.4	1,055	56.3(2.0)	3.6
201-300만원	1,927	72.8(1.4)	1.9	939	81.9(1.5)	1.8	988	62.8(2.0)	3.3
301-400만원	1,697	79.8(1.2)	1.5	831	87.5(1.3)	1.5	866	71.5(2.1)	2.9
401만원 이상	3,086	80.9(1.1)	1.3	1,504	88.4(1.1)	1.3	1,582	72.8(1.5)	2.0
거주유형									
동	3,231	75.9(0.9)	1.2	1,467	85.5(1.0)	1.1	1,764	66.6(1.2)	1.9
읍·면	8,368	69.1(0.6)	0.9	3,845	79.1(0.8)	1.0	4,523	58.7(0.9)	1.5

주 : 1) 연간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 95〉 월간음주율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	58.6(0.6)	1.0	5,310	74.3(0.7)	1.0	6,287	42.8(0.9)	2.1
연령									
19-29	1,035	74.0(1.4)	1.9	470	83.4(1.8)	2.1	565	62.9(2.3)	3.6
30-39	1,603	71.0(1.3)	1.8	758	80.9(1.5)	1.8	845	60.5(1.9)	3.2
40-49	1,957	68.3(1.3)	2.0	965	81.9(1.5)	1.8	992	53.7(2.0)	3.7
50-59	2,480	54.6(1.3)	2.4	1,178	72.8(1.7)	2.3	1,302	35.6(1.9)	5.4
60-69	1,934	37.2(1.5)	3.9	896	59.3(2.3)	3.9	1,038	18.9(1.7)	8.7
70 이상	2,588	28.0(1.2)	4.2	1,043	47.7(2.2)	4.6	1,545	14.2(1.1)	7.7
생애주기별									
19-64	8,058	64.7(0.7)	1.0	3,844	78.7(0.8)	1.0	4,214	49.8(1.0)	2.1
65 이상	3,539	29.6(1.0)	3.3	1,466	48.8(1.7)	3.6	2,073	15.9(1.1)	6.7
교육수준[2]									
무학	1,704	25.3(1.4)	5.6	327	54.8(3.8)	7.0	1,377	18.3(1.4)	7.7
초등학교	2,307	37.6(1.4)	3.7	973	57.6(2.2)	3.7	1,334	23.6(1.6)	6.9
중학교	1,389	50.9(1.6)	3.2	683	64.8(2.4)	3.8	706	39.1(2.4)	6.2
고등학교	3,729	65.9(1.1)	1.6	1,924	77.3(1.3)	1.7	1,805	53.0(1.7)	3.1
대학교 이상	2,458	69.4(1.2)	1.7	1,400	80.0(1.3)	1.7	1,058	54.1(1.8)	3.3
직업									
전문행정관리	1,038	69.5(1.8)	2.5	545	80.5(1.9)	2.4	493	56.7(2.7)	4.7
사무직	742	78.2(1.9)	2.5	382	88.7(2.1)	2.3	360	63.8(3.0)	4.7
판매·서비스직	1,293	63.6(1.7)	2.7	422	80.4(2.4)	3.0	871	53.8(2.2)	4.0
농림어업	2,098	50.4(1.3)	2.5	1,203	64.4(1.6)	2.4	895	27.6(1.8)	6.7
기능단순노무직	2,411	69.0(1.2)	1.7	1,586	77.2(1.2)	1.6	825	48.0(2.5)	5.2
기타[3]	4,013	42.4(1.0)	2.5	1,171	62.2(1.9)	3.0	2,842	32.5(1.2)	3.8
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	34.4(1.4)	4.1	863	55.1(2.2)	4.1	1,434	20.5(1.5)	7.6
101-200만원	1,952	48.3(1.6)	3.3	897	65.1(2.1)	3.2	1,055	32.7(2.2)	6.7
201-300만원	1,927	58.8(1.5)	2.5	939	72.9(1.8)	2.5	988	43.4(2.0)	4.5
301-400만원	1,696	66.3(1.5)	2.2	830	79.5(1.7)	2.1	866	52.1(2.3)	4.5
401만원 이상	3,086	67.5(1.1)	1.6	1,504	81.4(1.3)	1.6	1,582	52.4(1.6)	3.1
거주유형									
동	3,230	62.0(0.9)	1.4	1,466	77.7(1.1)	1.4	1,764	46.8(1.3)	2.8
읍·면	8,367	53.5(0.7)	1.3	3,844	69.6(0.9)	1.3	4,523	36.8(0.9)	2.5

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 96〉 음주시작연령[1]

(단위 : 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	9,277	22.0(0.1)	0.5	4,845	19.4(0.1)	0.4	4,432	25.2(0.2)	0.7
연령									
19-29	954	18.3(0.1)	0.5	441	18.1(0.1)	0.7	513	18.6(0.1)	0.5
30-39	1,484	18.9(0.1)	0.5	715	18.2(0.1)	0.7	769	19.6(0.1)	0.6
40-49	1,717	20.8(0.2)	0.8	906	19.0(0.1)	0.7	811	23.0(0.3)	1.2
50-59	2,024	23.8(0.2)	1.0	1,076	20.1(0.2)	1.0	948	28.7(0.4)	1.4
60-69	1,427	27.5(0.4)	1.4	814	21.7(0.3)	1.6	613	34.9(0.6)	1.9
70 이상	1,671	29.6(0.4)	1.4	893	21.5(0.2)	1.1	778	39.8(0.7)	1.7
생애주기별									
19-64	6,929	20.9(0.1)	0.5	3,571	19.0(0.1)	0.4	3,358	23.1(0.2)	0.7
65 이상	2,348	29.2(0.3)	1.1	1,274	21.5(0.2)	1.0	1,074	38.8(0.6)	1.4
교육수준[2]									
무학	1,043	33.3(0.6)	1.8	282	21.1(0.5)	2.5	761	37.9(0.7)	1.8
초등학교	1,662	27.1(0.4)	1.4	855	21.0(0.3)	1.4	807	33.4(0.6)	1.7
중학교	1,098	24.7(0.4)	1.6	615	20.4(0.3)	1.4	483	29.2(0.6)	2.1
고등학교	3,245	20.5(0.1)	0.6	1,775	19.1(0.1)	0.6	1,470	22.3(0.2)	1.1
대학교 이상	2,223	19.4(0.1)	0.5	1,315	18.9(0.1)	0.6	908	20.1(0.1)	0.7
직업									
전문행정관리	925	19.3(0.1)	0.5	507	18.7(0.2)	0.8	418	19.9(0.2)	0.8
사무직	687	19.4(0.1)	0.8	363	18.8(0.2)	1.0	324	20.3(0.2)	1.2
판매·서비스직	1,077	22.2(0.3)	1.3	388	18.7(0.2)	1.0	689	24.6(0.4)	1.6
농림어업	1,656	24.5(0.3)	1.3	1,081	20.7(0.2)	1.1	575	33.1(0.8)	2.3
기능단순노무직	2,092	21.3(0.2)	0.9	1,469	19.4(0.1)	0.8	623	27.0(0.5)	2.0
기타[3]	2,838	23.9(0.2)	0.8	1,036	19.8(0.2)	0.9	1,802	26.5(0.3)	1.2
월 가구소득									
100만원 이하	1,560	27.9(0.4)	1.4	763	20.7(0.2)	1.1	797	35.6(0.6)	1.7
101-200만원	1,485	23.8(0.3)	1.3	794	20.2(0.3)	1.3	691	28.1(0.5)	2.0
201-300만원	1,602	21.7(0.2)	1.1	865	19.5(0.2)	1.2	737	24.5(0.4)	1.8
301-400만원	1,447	21.0(0.2)	1.1	760	19.0(0.2)	1.0	687	23.4(0.4)	1.8
401만원 이상	2,695	20.5(0.1)	0.6	1,414	19.0(0.1)	0.6	1,281	22.4(0.2)	1.0
거주유형									
동	2,749	21.5(0.1)	0.7	1,368	19.2(0.1)	0.6	1,381	24.0(0.3)	1.1
읍·면	6,528	22.9(0.1)	0.5	3,477	19.6(0.1)	0.5	3,051	27.2(0.2)	0.8

주 : 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 97〉 고위험음주율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,704	19.6(0.6)	3.2	4,109	29.4(0.9)	3.1	3,595	6.9(0.6)	8.9
연령									
19-29	878	16.3(1.6)	9.9	420	22.0(2.4)	10.9	458	8.9(1.4)	15.9
30-39	1,348	22.5(1.4)	6.2	681	33.0(2.1)	6.4	667	9.7(1.3)	13.0
40-49	1,547	22.5(1.4)	6.2	845	34.2(2.0)	5.8	702	7.1(1.3)	18.0
50-59	1,716	22.7(1.4)	6.1	946	34.9(2.0)	5.7	770	6.0(1.3)	22.2
60-69	1,077	14.7(1.3)	9.2	624	24.2(2.2)	8.9	453	1.9(1.0)	53.1
70 이상	1,138	9.0(1.3)	14.3	593	15.5(2.2)	14.3	545	1.0(0.5)	46.8
생애주기별									
19-64	6,069	20.8(0.7)	3.3	3,237	30.8(1.0)	3.2	2,832	7.7(0.7)	9.0
65 이상	1,635	10.0(1.0)	10.0	872	17.7(1.8)	10.0	763	0.7(0.3)	43.1
교육수준[2]									
무학	731	8.0(1.4)	18.1	191	23.1(4.2)	18.1	540	2.1(1.1)	52.0
초등학교	1,257	15.1(1.3)	8.9	644	27.6(2.3)	8.5	613	2.2(0.7)	31.3
중학교	890	20.9(1.8)	8.9	497	30.4(2.8)	9.1	393	10.7(2.6)	24.6
고등학교	2,854	21.0(1.0)	4.8	1,575	30.0(1.5)	5.0	1,279	9.0(1.0)	10.7
대학교 이상	1,965	20.6(1.2)	5.6	1,199	29.3(1.6)	5.6	766	5.7(1.0)	16.8
직업									
전문행정관리	826	21.9(1.8)	8.2	458	34.2(2.6)	7.6	368	5.5(1.3)	24.1
사무직	650	22.3(1.9)	8.4	348	31.0(2.8)	9.1	302	9.6(1.7)	18.0
판매·서비스직	963	22.2(1.7)	7.8	359	35.9(3.2)	8.8	604	12.3(1.9)	15.7
농림어업	1,337	21.4(1.2)	5.7	876	29.8(1.7)	5.6	461	3.2(1.1)	34.2
기능단순노무직	1,873	26.3(1.3)	5.1	1,334	31.7(1.6)	5.1	539	8.7(1.7)	19.4
기타[3]	2,053	9.3(0.8)	9.0	733	17.1(1.7)	10.2	1,320	4.1(0.7)	16.4
월 가구소득									
100만원 이하	1,122	13.0(1.5)	11.4	542	21.4(2.6)	12.0	580	3.9(1.1)	29.1
101-200만원	1,163	17.5(1.4)	7.9	621	25.5(2.3)	8.9	542	7.6(1.5)	19.3
201-300만원	1,318	20.2(1.5)	7.3	728	30.9(2.2)	7.2	590	4.9(1.2)	23.7
301-400만원	1,282	21.8(1.4)	6.4	694	31.4(2.1)	6.6	588	9.1(1.5)	16.0
401만원 이상	2,407	20.6(1.0)	5.0	1,301	30.5(1.5)	4.9	1,106	7.6(1.0)	13.8
거주유형									
동	2,355	19.9(0.9)	4.7	1,221	29.9(1.4)	4.6	1,134	7.4(0.9)	12.4
읍·면	5,349	19.2(0.6)	3.2	2,888	28.6(0.9)	3.2	2,461	6.1(0.6)	9.1

주 : 1) 고위험음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 98〉 음주문제로 인한 상담경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,705	0.5(0.1)	23.2	4,111	0.8(0.2)	24.4	3,594	0.1(0.1)	85.2
연령									
19-29	879	0.7(0.4)	59.6	421	1.0(0.7)	69.0	458	0.3(0.3)	99.9
30-39	1,348	0.3(0.2)	53.0	681	0.6(0.3)	53.0	667	0.0(0.0)	.
40-49	1,547	0.6(0.2)	41.0	845	1.0(0.4)	42.2	702	0.0(0.0)	100.1
50-59	1,716	0.4(0.2)	41.0	946	0.7(0.3)	41.0	770	0.0(0.0)	.
60-69	1,077	0.7(0.3)	38.7	624	1.2(0.5)	38.9	453	0.0(0.0)	.
70 이상	1,138	0.2(0.1)	65.1	594	0.3(0.2)	65.2	544	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	6,070	0.5(0.1)	24.6	3,238	0.9(0.2)	26.1	2,832	0.1(0.1)	85.2
65 이상	1,635	0.3(0.1)	28.2	873	0.5(0.1)	28.3	762	0.0(0.0)	.
교육수준[2]									
무학	731	0.2(0.1)	58.0	192	0.6(0.3)	58.2	539	0.0(0.0)	.
초등학교	1,257	1.0(0.5)	50.8	644	1.9(1.0)	51.0	613	0.0(0.0)	.
중학교	890	0.2(0.2)	100.0	497	0.3(0.3)	100.1	393	0.0(0.0)	.
고등학교	2,855	0.6(0.2)	38.0	1,576	1.0(0.4)	38.6	1,279	0.0(0.0)	100.0
대학교 이상	1,965	0.4(0.1)	35.6	1,199	0.5(0.2)	37.4	766	0.2(0.2)	100.0
직업									
전문행정관리	826	0.6(0.3)	44.9	458	1.1(0.5)	44.9	368	0.0(0.0)	.
사무직	650	0.4(0.3)	61.3	348	0.7(0.5)	61.5	302	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	964	0.2(0.2)	79.6	360	0.5(0.4)	79.4	604	0.0(0.0)	.
농림어업	1,337	0.5(0.2)	49.8	876	0.7(0.4)	50.0	461	0.0(0.0)	.
기능단순노무직	1,873	0.2(0.1)	45.2	1,334	0.3(0.1)	48.4	539	0.1(0.1)	100.1
기타[3]	2,053	0.9(0.4)	41.3	734	1.9(0.8)	44.5	1,319	0.2(0.2)	99.9
월 가구소득									
100만원 이하	1,123	0.6(0.3)	49.3	543	1.1(0.5)	49.4	580	0.0(0.0)	.
101-200만원	1,163	0.8(0.4)	48.6	621	1.5(0.7)	48.5	542	0.0(0.0)	.
201-300만원	1,318	0.1(0.1)	72.5	728	0.2(0.2)	72.5	590	0.0(0.0)	.
301-400만원	1,283	0.4(0.2)	46.9	695	0.4(0.2)	51.4	588	0.4(0.3)	85.2
401만원 이상	2,407	0.4(0.1)	32.9	1,301	0.7(0.2)	32.8	1,106	0.0(0.0)	.
거주유형									
동	2,356	0.5(0.2)	34.9	1,222	0.8(0.3)	37.7	1,134	0.1(0.1)	100.0
읍·면	5,349	0.5(0.1)	23.3	2,889	0.8(0.2)	23.5	2,460	0.0(0.0)	100.1

주 : 1) 음주문제로 인한 상담경험률:(최근 1년(365일) 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 사람의 수/최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수)×100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 99〉 음주시작동기[1]

(단위 : %)

구분	N	주위 사람 권유		호기심으로		친목도모를 위해		축하를 위해		스트레스 해소		매스컴에 멋있게 보여서		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	9,402	55.1(0.7)	1.3	18.1(0.6)	3.2	20.7(0.6)	2.9	2.7(0.2)	7.7	2.2(0.2)	7.7	0.0(0.0)	68.7	1.0(0.1)	9.7
성															
남자	4,880	55.7(1.0)	1.8	24.3(0.9)	3.6	16.1(0.7)	4.4	1.8(0.3)	14.3	1.2(0.2)	15.1	0.1(0.0)	68.7	0.9(0.1)	15.1
여자	4,522	54.4(1.0)	1.9	10.6(0.6)	6.1	26.3(0.9)	3.6	3.9(0.3)	8.7	3.6(0.3)	9.1	0.0(0.0)	.	1.2(0.2)	14.0
연령															
19-29	956	51.8(2.2)	4.1	18.5(1.5)	8.2	26.4(1.9)	7.4	2.1(0.4)	21.4	0.9(0.4)	39.3	0.1(0.1)	100.1	0.2(0.2)	80.9
30-39	1,491	52.1(1.5)	2.9	19.1(1.2)	6.4	23.6(1.3)	5.6	4.2(0.7)	15.7	0.7(0.3)	37.6	0.0(0.0)	.	0.3(0.1)	47.7
40-49	1,727	57.2(1.6)	2.8	18.5(1.1)	6.2	20.0(1.4)	6.9	2.9(0.5)	16.1	1.0(0.3)	27.1	0.1(0.1)	71.7	0.3(0.1)	37.4
50-59	2,049	53.6(1.5)	2.8	20.1(1.3)	6.4	18.7(1.2)	6.7	2.7(0.4)	14.9	3.6(0.5)	14.2	0.0(0.0)	.	1.1(0.3)	26.3
60-69	1,448	60.7(1.6)	2.7	14.3(1.1)	8.0	15.8(1.4)	8.7	2.3(0.5)	21.1	4.6(0.6)	13.9	0.0(0.0)	.	2.2(0.5)	22.5
70 이상	1,731	60.5(1.7)	2.8	14.1(1.2)	8.3	14.4(1.1)	7.8	1.0(0.3)	33.7	5.8(0.9)	15.6	0.0(0.0)	100.0	4.1(0.6)	14.5
생애주기별															
19-64	6,982	54.1(0.8)	1.5	18.8(0.7)	3.5	21.7(0.7)	3.1	3.0(0.2)	8.1	1.8(0.2)	9.7	0.0(0.0)	72.1	0.6(0.1)	16.1
65 이상	2,420	61.1(1.4)	2.3	13.8(0.9)	6.6	14.7(1.0)	7.0	1.4(0.4)	26.7	5.3(0.7)	12.8	0.0(0.0)	100.0	3.6(0.5)	13.1
교육수준[2]															
무학	1,096	58.0(2.0)	3.5	11.0(1.4)	12.9	15.4(1.5)	9.6	1.4(0.6)	45.0	10.2(1.3)	12.2	0.0(0.0)	.	4.0(0.7)	16.9
초등학교	1,691	58.5(1.6)	2.8	15.9(1.5)	9.4	15.3(1.1)	7.2	1.7(0.4)	22.5	5.5(0.9)	15.9	0.0(0.0)	.	2.9(0.5)	16.6
중학교	1,113	55.4(1.9)	3.5	18.1(1.5)	8.5	18.9(1.7)	9.2	3.2(0.5)	17.2	3.5(0.6)	16.6	0.0(0.0)	100.0	0.9(0.4)	43.5
고등학교	3,266	55.2(1.2)	2.2	20.6(0.9)	4.4	19.5(1.0)	5.0	2.9(0.3)	11.8	1.2(0.2)	18.2	0.0(0.0)	100.1	0.5(0.1)	26.7
대학교 이상	2,229	53.1(1.3)	2.5	17.1(1.0)	5.9	25.6(1.1)	4.5	3.0(0.4)	14.7	0.6(0.2)	31.8	0.1(0.1)	100.0	0.4(0.1)	33.5
직업															
전문행정관리	928	51.7(1.9)	3.6	17.1(1.4)	8.4	26.7(1.9)	7.0	3.3(0.6)	18.0	1.0(0.4)	36.2	0.0(0.0)	.	0.2(0.1)	61.7
사무직	689	50.0(2.4)	4.9	19.4(2.1)	10.7	26.1(2.1)	8.1	3.2(0.8)	24.8	0.9(0.5)	58.8	0.1(0.1)	100.0	0.3(0.2)	83.9
판매·서비스직	1,086	54.4(2.0)	3.7	20.5(1.6)	7.8	18.6(1.7)	9.0	4.6(0.8)	17.1	1.5(0.4)	24.5	0.0(0.0)	.	0.5(0.3)	62.3
농림어업	1,689	59.2(1.4)	2.4	18.4(1.2)	6.6	14.7(1.0)	6.6	1.3(0.3)	25.6	3.6(0.5)	14.4	0.0(0.0)	99.8	2.8(0.4)	15.0
기능단순노무직	2,115	54.7(1.5)	2.7	22.0(1.2)	5.5	17.3(1.3)	7.3	1.8(0.3)	17.2	2.9(0.5)	15.9	0.1(0.1)	71.4	1.0(0.2)	23.8
기타[3]	2,893	57.6(1.3)	2.2	13.9(0.9)	6.4	21.7(1.1)	5.0	2.7(0.4)	14.0	2.7(0.3)	12.6	0.0(0.0)	.	1.3(0.2)	15.7
월 가구소득															
100만원 이하	1,613	59.0(1.7)	2.8	14.1(1.3)	9.0	16.7(1.5)	9.0	1.4(0.4)	28.9	6.5(0.9)	13.8	0.0(0.0)	.	2.3(0.4)	17.1
101-200만원	1,506	56.4(1.8)	3.2	18.1(1.4)	7.5	18.0(1.4)	8.0	2.4(0.4)	17.9	3.7(0.6)	16.2	0.0(0.0)	100.0	1.3(0.4)	27.7
201-300만원	1,614	54.0(1.7)	3.1	19.6(1.2)	6.3	19.5(1.4)	7.1	3.9(0.6)	14.1	1.9(0.3)	16.5	0.0(0.0)	.	1.2(0.3)	23.4
301-400만원	1,452	56.0(1.7)	3.0	17.3(1.3)	7.2	21.5(1.4)	6.7	2.1(0.4)	19.6	1.7(0.5)	30.4	0.0(0.0)	.	1.3(0.3)	25.7
401만원 이상	2,708	53.9(1.4)	2.6	18.5(1.0)	5.2	23.1(1.1)	5.0	3.0(0.4)	13.5	1.2(0.2)	18.2	0.1(0.1)	100.0	0.3(0.1)	27.9
거주유형															
동	2,759	56.6(1.1)	1.9	17.1(0.9)	5.0	20.8(0.9)	4.3	2.7(0.3)	11.7	1.9(0.3)	13.1	0.0(0.0)	.	0.8(0.1)	17.2
읍·면	6,643	52.8(0.9)	1.7	19.7(0.7)	3.5	20.5(0.7)	3.6	2.8(0.2)	7.9	2.7(0.2)	7.7	0.1(0.1)	68.7	1.4(0.1)	10.1

주 : 1) 음주시작동기 : (응답보기별 응답자 수 / 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 100〉 연간 음주자의 금주권고 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,705	21.7(0.6)	2.9	4,110	32.9(1.0)	3.0	3,595	7.1(0.6)	8.6
연령									
19-29	879	17.2(1.5)	8.9	421	22.3(2.3)	10.2	458	10.5(1.6)	14.9
30-39	1,348	20.7(1.1)	5.3	681	31.5(1.8)	5.9	667	7.4(1.1)	14.8
40-49	1,546	24.4(1.4)	5.7	844	37.4(2.1)	5.5	702	7.3(1.3)	17.9
50-59	1,716	26.1(1.4)	5.5	946	39.9(2.1)	5.3	770	7.1(1.2)	16.7
60-69	1,077	20.5(1.5)	7.2	624	34.3(2.2)	6.5	453	2.0(0.9)	44.4
70 이상	1,139	18.8(1.6)	8.7	594	32.2(2.7)	8.4	545	2.4(0.7)	31.3
생애주기별									
19-64	6,069	22.1(0.7)	3.2	3,237	33.0(1.1)	3.4	2,832	7.8(0.7)	8.8
65 이상	1,636	18.4(1.3)	6.9	873	32.1(2.1)	6.6	763	1.9(0.5)	27.3
교육수준[2]									
무학	732	13.8(1.6)	11.7	192	37.1(4.4)	11.8	540	4.6(1.4)	30.7
초등학교	1,257	21.9(1.5)	6.8	644	38.1(2.6)	6.9	613	5.2(1.2)	23.6
중학교	890	22.9(1.9)	8.1	497	34.0(2.9)	8.4	393	11.0(2.3)	21.1
고등학교	2,855	22.9(1.0)	4.5	1,576	34.0(1.6)	4.7	1,279	8.2(1.1)	12.8
대학교 이상	1,964	21.1(1.1)	5.1	1,198	30.2(1.5)	5.1	766	5.6(0.8)	14.8
직업									
전문행정관리	826	24.3(1.7)	7.1	458	37.3(2.5)	6.8	368	7.1(1.4)	19.8
사무직	650	21.1(1.9)	8.8	348	30.8(2.9)	9.4	302	6.8(1.4)	20.1
판매·서비스직	964	19.8(1.6)	8.1	360	33.1(3.1)	9.4	604	10.1(1.9)	18.6
농림어업	1,337	26.8(1.4)	5.4	876	37.4(1.9)	5.1	461	3.8(1.0)	27.0
기능단순노무직	1,872	28.6(1.3)	4.4	1,333	35.2(1.6)	4.6	539	7.2(1.4)	19.7
기타[3]	2,054	13.6(1.0)	7.7	734	24.5(2.1)	8.6	1,320	6.2(0.9)	14.4
월 가구소득									
100만원 이하	1,123	18.4(1.6)	8.6	543	30.3(2.7)	9.0	580	5.5(1.6)	29.2
101-200만원	1,163	22.0(1.6)	7.4	621	33.9(2.6)	7.5	542	7.4(1.4)	19.4
201-300만원	1,318	22.9(1.6)	6.8	728	34.8(2.4)	6.9	590	5.8(1.0)	17.5
301-400만원	1,282	22.0(1.4)	6.4	694	32.7(2.1)	6.6	588	7.9(1.3)	15.9
401만원 이상	2,407	22.0(1.1)	5.0	1,301	32.7(1.6)	4.9	1,106	8.0(1.3)	15.7
거주유형									
동	2,356	22.0(0.9)	4.3	1,222	33.7(1.5)	4.5	1,134	7.6(0.9)	12.0
읍·면	5,349	21.2(0.7)	3.1	2,888	31.8(1.0)	3.1	2,461	6.4(0.6)	9.2

주 : 1) 연간 음주자의 금주권고 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 101〉 운전 시 안전벨트 착용률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	5,862	76.0(0.8)	1.0	3,830	70.9(0.9)	1.3	2,032	86.1(0.9)	1.0
연령									
19-29	508	67.9(2.6)	3.8	300	61.1(3.5)	5.7	208	82.0(3.2)	4.0
30-39	1,270	77.1(1.4)	1.8	712	71.3(1.8)	2.5	558	86.1(1.7)	2.0
40-49	1,513	77.6(1.3)	1.7	896	71.7(1.7)	2.4	617	87.0(1.7)	1.9
50-59	1,559	74.4(1.5)	2.0	1,037	69.6(1.8)	2.5	522	85.5(1.9)	2.2
60-69	733	83.9(1.6)	1.9	617	81.7(1.8)	2.2	116	95.1(1.3)	1.3
70 이상	279	83.5(2.5)	3.0	268	83.0(2.6)	3.2	11	-(-)	-
생애주기별									
19-64	5,293	75.7(0.8)	1.1	3,302	70.1(1.0)	1.4	1,991	86.0(0.9)	1.1
65 이상	569	82.6(1.8)	2.2	528	81.7(1.9)	2.3	41	95.7(2.3)	2.4
교육수준[2]									
무학	58	72.5(7.9)	10.9	45	67.2(9.2)	13.6	13	-(-)	-
초등학교	580	70.9(2.2)	3.1	445	66.4(2.6)	4.0	135	86.4(3.5)	4.0
중학교	690	68.9(2.3)	3.4	484	63.1(2.9)	4.6	206	82.0(3.1)	3.8
고등학교	2,509	73.4(1.2)	1.6	1,564	67.5(1.4)	2.1	945	84.1(1.5)	1.7
대학교 이상	2,018	80.8(1.2)	1.4	1,289	76.8(1.4)	1.9	729	88.7(1.4)	1.5
직업									
전문행정관리	858	81.8(1.6)	1.9	519	76.5(2.2)	2.8	339	90.6(1.8)	2.0
사무직	642	80.9(1.7)	2.0	370	77.7(2.3)	3.0	272	86.5(2.1)	2.4
판매·서비스직	837	71.6(2.1)	2.9	379	64.1(3.4)	5.4	458	79.2(2.2)	2.7
농림어업	887	63.2(2.0)	3.2	750	61.1(2.2)	3.6	137	75.3(4.0)	5.3
기능단순노무직	1,576	70.1(1.4)	2.0	1,342	68.3(1.5)	2.2	234	83.9(3.7)	4.4
기타[3]	1,060	84.3(1.5)	1.8	469	78.0(2.7)	3.5	591	89.4(1.5)	1.7
월 가구소득									
100만원 이하	322	69.8(3.6)	5.2	250	67.4(4.2)	6.2	72	76.8(5.8)	7.6
101-200만원	782	74.8(2.1)	2.8	553	69.9(2.6)	3.7	229	87.1(2.5)	2.9
201-300만원	1,135	72.1(1.7)	2.4	778	67.0(2.1)	3.1	357	83.9(2.2)	2.6
301-400만원	1,082	74.4(1.7)	2.3	707	69.2(2.1)	3.1	375	85.6(2.3)	2.7
401만원 이상	2,230	78.9(1.3)	1.7	1,342	73.8(1.6)	2.2	888	87.6(1.3)	1.5
거주유형									
동	1,840	78.7(1.1)	1.4	1,169	74.3(1.3)	1.8	671	87.0(1.3)	1.5
읍·면	4,022	71.9(1.0)	1.3	2,661	66.0(1.2)	1.8	1,361	84.4(1.1)	1.3

주 : 1) 운전 시 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 102〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	6,800	76.5(0.7)	0.9	3,518	71.0(0.9)	1.3	3,282	83.3(0.9)	1.1
연령									
19-29	666	67.9(2.2)	3.2	324	65.1(3.1)	4.7	342	71.6(3.1)	4.4
30-39	1,144	72.9(1.6)	2.2	593	67.0(2.2)	3.2	551	80.5(1.9)	2.3
40-49	1,428	76.6(1.3)	1.7	740	69.4(2.0)	2.8	688	84.7(1.5)	1.8
50-59	1,671	78.3(1.4)	1.8	857	70.0(1.9)	2.7	814	88.6(1.4)	1.6
60-69	1,038	87.3(1.2)	1.4	558	84.6(1.8)	2.1	480	90.6(1.7)	1.9
70 이상	853	87.9(1.3)	1.5	446	88.1(1.6)	1.9	407	87.6(2.1)	2.4
생애주기별									
19-64	5,486	75.2(0.8)	1.0	2,814	69.1(1.0)	1.4	2,672	82.7(0.9)	1.1
65 이상	1,314	88.0(1.1)	1.3	704	87.8(1.4)	1.6	610	88.3(1.9)	2.1
교육수준[2]									
무학	508	82.1(2.2)	2.7	140	75.3(5.1)	6.8	368	84.9(2.5)	3.0
초등학교	1,120	82.7(1.3)	1.5	508	74.5(2.3)	3.1	612	89.4(1.4)	1.5
중학교	836	76.6(2.0)	2.7	425	66.8(3.1)	4.7	411	86.1(2.0)	2.4
고등학교	2,592	73.8(1.1)	1.5	1,397	67.9(1.5)	2.2	1,195	81.4(1.4)	1.7
대학교 이상	1,738	77.4(1.2)	1.5	1,046	74.5(1.4)	1.9	692	82.0(1.7)	2.1
직업									
전문행정관리	755	74.4(1.7)	2.4	432	73.0(2.2)	3.1	323	76.4(2.9)	3.7
사무직	545	79.7(1.9)	2.3	295	76.1(2.8)	3.7	250	84.7(2.2)	2.7
판매·서비스직	877	72.7(2.0)	2.7	308	59.9(3.7)	6.1	569	81.3(1.9)	2.3
농림어업	1,140	73.3(1.7)	2.4	732	70.5(2.2)	3.1	408	79.2(2.3)	2.9
기능단순노무직	1,583	72.7(1.4)	1.9	1,146	69.1(1.6)	2.2	437	85.0(2.3)	2.7
기타[3]	1,899	83.1(1.2)	1.5	604	76.8(2.3)	3.0	1,295	86.5(1.2)	1.3
월 가구소득									
100만원 이하	869	82.6(1.5)	1.8	411	81.3(2.4)	3.0	458	83.9(2.3)	2.7
101-200만원	1,058	80.2(1.6)	2.0	567	76.8(2.3)	3.0	491	84.9(1.9)	2.3
201-300만원	1,233	74.6(1.6)	2.2	650	68.5(2.1)	3.1	583	82.5(2.1)	2.6
301-400만원	1,129	73.6(1.6)	2.1	581	64.6(2.3)	3.6	548	84.0(1.7)	2.1
401만원 이상	2,146	77.0(1.2)	1.6	1,131	71.8(1.7)	2.3	1,015	83.5(1.4)	1.7
거주유형									
동	1,891	78.0(1.0)	1.3	954	72.5(1.4)	1.9	937	84.3(1.3)	1.6
읍·면	4,909	74.6(0.9)	1.2	2,564	69.2(1.1)	1.6	2,345	81.9(1.0)	1.2

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 103〉 연간 자동차 음주운전차량 동승률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,580	10.1(0.4)	4.2	5,303	13.4(0.6)	4.6	6,277	6.8(0.5)	6.7
연령									
19-29	1,036	14.2(1.3)	9.2	471	16.6(2.0)	12.2	565	11.4(1.4)	12.5
30-39	1,602	13.2(1.0)	7.6	758	16.1(1.4)	8.8	844	10.0(1.2)	11.6
40-49	1,956	12.1(1.0)	8.1	964	15.5(1.4)	9.0	992	8.5(1.2)	14.2
50-59	2,477	9.1(0.8)	8.7	1,177	13.0(1.3)	10.3	1,300	5.1(0.7)	14.1
60-69	1,930	5.1(0.6)	11.8	893	7.7(1.0)	13.2	1,037	3.0(0.6)	21.5
70 이상	2,579	2.6(0.4)	16.0	1,040	4.3(0.9)	20.3	1,539	1.4(0.3)	23.0
생애주기별									
19-64	8,052	11.6(0.5)	4.3	3,841	14.8(0.7)	4.7	4,211	8.1(0.6)	6.9
65 이상	3,528	3.1(0.4)	11.5	1,462	4.8(0.7)	14.1	2,066	1.8(0.3)	18.1
교육수준[2]									
무학	1,697	2.4(0.4)	18.0	327	6.1(1.8)	29.8	1,370	1.5(0.3)	19.4
초등학교	2,301	6.2(0.7)	10.7	969	9.6(1.4)	14.1	1,332	3.8(0.5)	14.2
중학교	1,386	9.5(1.0)	10.1	680	13.7(1.8)	13.1	706	6.0(1.1)	18.1
고등학교	3,729	11.8(0.8)	6.5	1,924	13.9(1.0)	7.6	1,805	9.4(0.9)	9.8
대학교 이상	2,457	11.9(0.8)	7.0	1,400	14.4(1.2)	8.3	1,057	8.2(0.9)	11.5
직업									
전문행정관리	1,038	13.0(1.3)	10.3	545	16.9(2.2)	12.9	493	8.5(1.4)	17.1
사무직	742	13.8(1.4)	10.4	382	16.1(2.1)	13.3	360	10.8(1.8)	16.8
판매·서비스직	1,294	10.4(1.1)	10.3	423	15.9(2.3)	14.6	871	7.3(1.0)	14.0
농림어업	2,093	9.9(0.8)	7.8	1,202	12.7(1.1)	8.4	891	5.3(0.7)	13.9
기능단순노무직	2,406	13.1(0.9)	6.8	1,583	15.0(1.2)	7.8	823	8.1(1.2)	14.5
기타[3]	4,005	5.9(0.6)	9.3	1,167	6.8(1.1)	16.3	2,838	5.5(0.6)	10.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,290	4.1(0.6)	13.9	860	6.2(1.1)	17.7	1,430	2.6(0.4)	17.2
101-200만원	1,952	7.3(0.8)	11.3	897	10.7(1.6)	14.6	1,055	4.2(0.7)	16.7
201-300만원	1,924	12.0(1.1)	8.9	938	15.1(1.6)	10.6	986	8.6(1.2)	13.5
301-400만원	1,696	11.3(1.1)	9.5	830	14.6(1.5)	10.5	866	7.8(1.1)	14.1
401만원 이상	3,085	11.8(0.8)	7.0	1,504	14.8(1.1)	7.8	1,581	8.7(0.9)	10.4
거주유형									
동	3,230	10.0(0.6)	6.3	1,466	13.2(0.9)	7.1	1,764	6.9(0.7)	9.7
읍·면	8,350	10.3(0.5)	4.8	3,837	13.7(0.7)	4.9	4,513	6.7(0.5)	7.9

주 : 1) 연간 자동차 음주운전차량 동승률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 104〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) 및 연간 자동차 음주운전 경험횟수

(단위 : %, 회)

구분	연간 음주운전 경험률[1](자동차 또는 오토바이)									연간 자동차 음주운전 경험횟수[2]		
	전체			남자			여자					
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수
전체	6,428	12.6(0.5)	4.1	4,251	16.1(0.7)	4.2	2,177	5.7(0.6)	10.8	727	5.0(0.3)	5.3
연령												
19-29	524	11.6(1.6)	13.5	311	14.4(2.1)	14.5	213	5.7(1.8)	32.5	66	4.1(0.5)	13.4
30-39	1,277	11.8(1.0)	8.8	717	16.2(1.4)	8.9	560	5.1(1.0)	20.4	138	4.1(0.3)	7.2
40-49	1,550	13.8(1.1)	7.8	911	17.3(1.5)	8.5	639	8.3(1.3)	16.2	213	4.5(0.5)	11.6
50-59	1,653	13.1(1.1)	8.4	1,088	17.6(1.5)	8.4	565	3.0(0.9)	29.6	199	6.6(0.6)	9.6
60-69	890	10.4(1.2)	11.6	725	11.7(1.4)	11.9	165	4.6(1.3)	28.0	82	6.7(1.4)	20.4
70 이상	534	14.8(1.9)	12.8	499	15.6(2.0)	12.8	35	0.0(0.0)	.	29	5.7(1.0)	18.3
생애주기별												
19-64	5,512	12.6(0.6)	4.4	3,428	16.3(0.7)	4.6	2,084	5.8(0.6)	10.9	671	5.0(0.3)	5.4
65 이상	916	12.9(1.3)	10.3	823	13.9(1.4)	10.3	93	2.8(1.4)	50.8	56	5.8(1.4)	24.2
교육수준[3]												
무학	160	17.8(2.7)	15.2	121	22.1(3.3)	15.1	39	0.0(0.0)	.	5	-(-)	-
초등학교	849	14.7(1.6)	11.2	645	18.5(2.0)	11.1	204	1.7(0.5)	30.8	67	7.0(1.6)	22.7
중학교	790	15.1(1.8)	11.7	559	18.4(2.3)	12.5	231	7.5(2.1)	28.6	100	7.3(1.1)	14.7
고등학교	2,598	12.3(0.8)	6.2	1,628	15.9(1.0)	6.5	970	5.6(0.9)	15.3	314	5.1(0.4)	8.0
대학교 이상	2,023	11.9(0.9)	7.5	1,295	14.9(1.2)	7.8	728	6.1(1.0)	17.2	241	4.0(0.3)	8.6
직업												
전문행정관리	863	14.4(1.5)	10.3	523	18.9(2.0)	10.4	340	6.9(1.6)	23.2	114	3.9(0.5)	12.9
사무직	642	11.5(1.4)	12.3	369	14.8(2.1)	14.0	273	5.8(1.6)	27.3	78	4.2(0.8)	18.1
판매·서비스직	869	13.4(1.4)	10.6	388	18.7(2.3)	12.5	481	8.2(1.5)	18.6	89	5.3(0.4)	8.4
농림어업	1,171	20.1(1.4)	6.9	970	23.3(1.6)	6.9	201	4.3(1.8)	42.7	155	8.5(1.2)	14.6
기능단순노무직	1,673	14.2(1.0)	6.8	1,410	15.0(1.1)	7.1	263	8.2(2.1)	25.9	226	4.7(0.4)	8.9
기타[4]	1,208	5.6(0.8)	13.6	590	8.9(1.5)	16.4	618	2.6(0.7)	26.1	65	4.6(0.8)	18.1
월 가구소득												
100만원 이하	556	14.9(1.7)	11.1	435	17.6(2.2)	12.3	121	5.5(2.9)	51.7	43	5.4(1.4)	25.4
101-200만원	928	9.0(1.1)	11.9	670	11.5(1.5)	12.6	258	2.4(0.6)	23.2	87	8.7(1.1)	12.4
201-300만원	1,199	14.6(1.4)	9.4	823	18.7(1.8)	9.5	376	5.2(1.4)	26.0	156	5.2(0.7)	13.7
301-400만원	1,133	12.2(1.1)	9.1	743	15.7(1.4)	9.1	390	4.8(1.2)	24.1	130	4.7(0.7)	14.2
401만원 이상	2,270	12.8(0.9)	7.4	1,361	16.1(1.2)	7.6	909	7.2(1.0)	14.4	276	4.4(0.3)	7.1
거주유형												
동	1,872	10.7(0.8)	7.1	1,195	13.2(1.0)	7.5	677	5.8(0.9)	15.7	199	4.0(0.2)	5.6
읍·면	4,556	15.4(0.6)	4.1	3,056	19.9(0.9)	4.4	1,500	5.6(0.7)	12.4	528	6.1(0.5)	8.1

주 : 1) 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 연간 자동차 음주운전 경험횟수 : 자동차 음주운전 횟수의 총 합 / 자동차 음주운전자 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 105〉 오토바이 및 자전거 헬멧 착용률

(단위 : %)

구분	오토바이 헬멧 착용률[1]			자전거 헬멧 착용률[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,143	59.0(1.6)	2.6	2,556	6.5(0.7)	10.4
성						
남자	907	60.2(1.6)	2.7	1,668	8.5(0.9)	10.6
여자	236	52.8(3.2)	6.0	888	2.1(0.7)	32.2
연령						
19-29	59	47.2(8.3)	17.6	291	2.7(1.1)	40.6
30-39	73	55.6(4.7)	8.5	372	6.7(1.6)	24.5
40-49	139	55.6(4.8)	8.6	510	8.0(1.5)	18.2
50-59	296	54.6(3.0)	5.5	602	9.7(1.9)	19.1
60-69	269	64.4(3.2)	4.9	457	5.5(2.0)	35.7
70 이상	307	71.4(2.8)	4.0	324	5.4(2.0)	36.9
생애주기별						
19-64	701	54.5(2.0)	3.7	2,024	6.8(0.7)	10.6
65 이상	442	70.3(2.1)	3.1	532	4.3(1.3)	30.8
교육수준[3]						
무학	116	65.6(5.4)	8.3	114	5.6(3.9)	68.8
초등학교	394	63.1(2.6)	4.1	492	3.4(1.4)	40.3
중학교	221	56.7(3.8)	6.6	374	4.6(1.5)	31.7
고등학교	316	55.2(2.9)	5.3	956	5.9(1.0)	17.1
대학교 이상	94	59.4(5.5)	9.2	617	8.9(1.4)	15.7
직업						
전문행정관리	40	47.9(4.9)	10.3	258	10.3(2.1)	20.8
사무직	17	-(-)	-	198	8.0(2.7)	33.4
판매·서비스직	105	70.9(5.7)	8.1	280	7.8(2.2)	28.6
농림어업	543	45.5(2.2)	4.8	576	1.0(0.4)	37.1
기능단순노무직	237	67.8(3.3)	4.9	605	8.6(1.5)	17.5
기타[4]	200	70.1(3.5)	5.0	638	3.7(1.1)	29.8
월 가구소득						
100만원 이하	291	71.1(3.1)	4.3	351	2.0(0.8)	41.5
101-200만원	254	60.2(2.7)	4.5	447	4.5(1.4)	31.0
201-300만원	186	51.9(4.4)	8.4	482	8.2(1.7)	21.3
301-400만원	145	53.0(4.1)	7.6	376	6.0(1.7)	28.0
401만원 이상	195	58.4(4.0)	6.9	732	7.9(1.2)	15.1
거주유형						
동	92	74.3(3.1)	4.2	657	7.4(1.0)	14.2
읍·면	1,051	53.8(1.8)	3.3	1,899	5.2(0.7)	13.0

주 : 1) 오토바이 헬멧 착용률 : (오토바이를 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 오토바이 운전자 수) × 100
2) 자전거 헬멧 착용률 : (자전거를 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 자전거를 타는 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 106〉 격렬한 신체활동 실천율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	14.3(0.5)	3.5	5,313	19.2(0.7)	3.9	6,287	9.5(0.5)	5.6
연령									
19-29	1,036	18.8(1.6)	8.6	471	25.4(2.3)	9.2	565	10.9(1.7)	15.7
30-39	1,603	14.7(1.0)	6.8	758	18.9(1.5)	8.1	845	10.2(1.2)	11.9
40-49	1,957	14.7(0.9)	6.4	965	18.9(1.5)	7.9	992	10.2(1.0)	10.1
50-59	2,481	16.2(1.0)	5.9	1,179	20.7(1.5)	7.4	1,302	11.5(1.1)	9.6
60-69	1,934	11.2(1.0)	9.1	896	16.2(1.6)	9.8	1,038	7.0(1.0)	13.9
70 이상	2,589	7.0(0.6)	7.9	1,044	9.3(1.0)	11.0	1,545	5.4(0.6)	11.6
생애주기별									
19-64	8,060	15.7(0.6)	3.8	3,846	20.6(0.9)	4.2	4,214	10.5(0.6)	6.2
65 이상	3,540	7.9(0.6)	7.1	1,467	10.9(1.0)	9.5	2,073	5.7(0.5)	9.3
교육수준[2]									
무학	1,705	6.6(0.7)	10.8	328	9.8(2.1)	21.1	1,377	5.9(0.7)	12.0
초등학교	2,307	11.6(0.9)	7.7	973	18.0(1.6)	8.9	1,334	7.0(0.9)	13.4
중학교	1,390	14.5(1.2)	8.2	684	20.1(1.9)	9.6	706	9.7(1.2)	12.5
고등학교	3,730	15.9(0.8)	5.0	1,925	20.5(1.2)	5.7	1,805	10.6(0.9)	8.7
대학교 이상	2,458	15.6(1.1)	6.9	1,400	18.8(1.5)	7.8	1,058	11.1(1.1)	10.3
직업									
전문행정관리	1,038	17.2(1.7)	9.6	545	20.1(2.5)	12.6	493	13.8(1.9)	13.8
사무직	742	13.0(1.5)	11.5	382	16.2(2.1)	13.1	360	8.5(1.7)	20.1
판매·서비스직	1,294	13.1(1.1)	8.6	423	17.6(2.1)	12.0	871	10.4(1.2)	11.3
농림어업	2,098	22.6(1.3)	5.6	1,204	24.9(1.5)	5.8	894	19.0(1.6)	8.6
기능단순노무직	2,411	17.8(1.0)	5.8	1,586	21.3(1.3)	6.3	825	8.7(1.1)	12.6
기타[3]	4,015	9.6(0.7)	7.7	1,172	14.8(1.5)	10.0	2,843	7.0(0.7)	10.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	10.0(0.9)	8.8	864	14.9(1.7)	11.7	1,433	6.6(0.7)	11.2
101-200만원	1,953	12.7(1.0)	8.1	898	16.4(1.5)	9.1	1,055	9.2(1.2)	13.4
201-300만원	1,927	16.2(1.1)	6.7	939	24.2(1.8)	7.6	988	7.3(0.9)	11.9
301-400만원	1,698	14.0(1.1)	8.1	831	16.0(1.6)	9.7	867	11.7(1.7)	14.2
401만원 이상	3,086	15.9(1.0)	6.5	1,504	20.7(1.5)	7.4	1,582	10.8(1.0)	9.1
거주유형									
동	3,231	13.9(0.8)	5.5	1,467	18.7(1.2)	6.1	1,764	9.2(0.8)	8.7
읍·면	8,369	15.0(0.5)	3.5	3,846	19.9(0.8)	3.9	4,523	9.9(0.6)	5.6

주 : 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 107〉 중등도 신체활동 실천율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	10.9(0.4)	3.8	5,310	12.9(0.6)	4.5	6,287	8.9(0.5)	5.7
연령									
19-29	1,036	10.5(1.1)	10.3	471	13.8(1.8)	13.2	565	6.6(1.2)	18.7
30-39	1,603	8.9(0.8)	8.8	758	10.7(1.1)	9.9	845	7.0(0.9)	13.3
40-49	1,957	9.9(0.9)	9.4	965	11.1(1.3)	11.7	992	8.6(1.1)	12.6
50-59	2,479	14.3(1.0)	7.1	1,177	16.5(1.4)	8.6	1,302	11.9(1.3)	10.6
60-69	1,933	12.5(0.9)	7.4	896	12.5(1.4)	11.2	1,037	12.5(1.2)	9.7
70 이상	2,589	9.5(0.8)	8.8	1,043	12.5(1.5)	11.7	1,546	7.4(1.0)	12.9
생애주기별									
19-64	8,057	11.0(0.5)	4.4	3,844	13.0(0.7)	5.0	4,213	9.0(0.6)	6.7
65 이상	3,540	10.4(0.7)	6.5	1,466	12.6(1.1)	9.1	2,074	8.9(0.8)	9.2
교육수준[2]									
무학	1,706	9.8(1.0)	10.2	328	15.2(3.5)	22.7	1,378	8.5(0.8)	9.9
초등학교	2,304	14.5(1.0)	7.0	971	15.4(1.4)	8.9	1,333	13.8(1.4)	10.3
중학교	1,390	12.9(1.2)	9.0	684	15.5(1.8)	11.4	706	10.7(1.4)	13.2
고등학교	3,729	10.9(0.7)	6.2	1,924	13.5(1.0)	7.6	1,805	7.9(0.7)	9.3
대학교 이상	2,458	9.2(0.7)	7.7	1,400	10.7(0.9)	8.6	1,058	7.0(1.1)	15.1
직업									
전문행정관리	1,038	6.3(0.8)	13.4	545	8.2(1.2)	14.7	493	4.2(1.0)	24.6
사무직	742	5.2(0.9)	17.5	382	6.9(1.5)	21.2	360	2.8(0.8)	26.5
판매·서비스직	1,293	13.0(1.5)	11.5	422	13.0(1.9)	14.3	871	13.0(1.8)	13.8
농림어업	2,097	23.0(1.1)	4.9	1,203	24.1(1.4)	5.8	894	21.2(1.4)	6.7
기능단순노무직	2,411	14.5(0.8)	5.8	1,586	15.5(1.0)	6.7	825	11.9(1.4)	11.8
기타[3]	4,014	7.8(0.6)	7.2	1,171	9.2(1.3)	14.2	2,843	7.1(0.6)	8.0
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	9.2(0.8)	8.9	863	10.9(1.5)	13.5	1,434	8.1(0.8)	10.3
101-200만원	1,953	12.2(1.1)	9.0	898	13.7(1.6)	11.9	1,055	10.8(1.3)	12.5
201-300만원	1,926	12.4(0.9)	7.2	938	15.6(1.4)	9.0	988	8.9(1.0)	11.6
301-400만원	1,698	8.2(0.8)	9.3	831	10.9(1.2)	11.1	867	5.4(0.8)	15.3
401만원 이상	3,086	11.7(0.8)	7.0	1,504	13.1(1.0)	8.0	1,582	10.1(1.0)	10.1
거주유형									
동	3,231	9.3(0.6)	6.7	1,467	11.2(0.9)	7.8	1,764	7.4(0.8)	10.4
읍·면	8,366	13.3(0.5)	3.6	3,843	15.4(0.7)	4.5	4,523	11.2(0.6)	4.9

주 : 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 108〉 중등도 이상 신체활동 실천율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	21.5(0.6)	2.7	5,310	26.6(0.8)	3.1	6,287	16.5(0.7)	4.2
연령									
19-29	1,036	23.9(1.7)	6.9	471	31.3(2.5)	7.9	565	15.2(1.9)	12.4
30-39	1,603	20.0(1.2)	5.8	758	24.2(1.7)	7.1	845	15.4(1.4)	9.4
40-49	1,957	21.4(1.2)	5.6	965	25.3(1.7)	6.7	992	17.3(1.4)	8.0
50-59	2,479	25.7(1.2)	4.7	1,177	30.2(1.8)	6.0	1,302	21.0(1.5)	7.4
60-69	1,933	21.3(1.2)	5.6	896	25.7(1.8)	7.2	1,037	17.7(1.3)	7.5
70 이상	2,589	14.3(0.9)	6.3	1,043	18.7(1.6)	8.8	1,546	11.2(1.0)	9.2
생애주기별									
19-64	8,057	22.7(0.7)	3.1	3,844	27.6(1.0)	3.5	4,213	17.5(0.8)	4.7
65 이상	3,540	16.0(0.8)	5.1	1,466	20.3(1.4)	6.8	2,074	12.9(0.9)	7.1
교육수준[2]									
무학	1,706	14.2(1.1)	7.8	328	21.2(3.5)	16.5	1,378	12.5(1.0)	7.9
초등학교	2,304	22.2(1.1)	5.0	971	27.8(1.8)	6.5	1,333	18.4(1.4)	7.8
중학교	1,390	23.7(1.5)	6.5	684	29.1(2.2)	7.7	706	19.1(1.7)	9.1
고등학교	3,729	22.7(1.0)	4.3	1,924	27.8(1.4)	4.9	1,805	17.0(1.1)	6.7
대학교 이상	2,458	21.0(1.2)	5.7	1,400	24.6(1.6)	6.3	1,058	15.8(1.5)	9.2
직업									
전문행정관리	1,038	20.8(1.8)	8.5	545	25.0(2.6)	10.5	493	16.0(2.0)	12.4
사무직	742	16.3(1.6)	9.8	382	20.1(2.3)	11.5	360	11.2(1.9)	16.6
판매·서비스직	1,293	22.4(1.7)	7.4	422	26.0(2.6)	9.8	871	20.2(2.0)	9.9
농림어업	2,097	37.3(1.4)	3.6	1,203	39.3(1.6)	3.9	894	34.0(1.7)	5.1
기능단순노무직	2,411	26.0(1.2)	4.4	1,586	29.3(1.4)	4.8	825	17.6(1.6)	9.0
기타[3]	4,014	15.6(0.8)	5.3	1,171	20.3(1.8)	8.7	2,843	13.3(0.8)	6.3
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	16.7(1.1)	6.7	863	22.0(2.0)	9.1	1,434	13.2(1.1)	8.0
101-200만원	1,953	21.5(1.3)	6.0	898	25.9(1.9)	7.5	1,055	17.4(1.6)	9.3
201-300만원	1,926	23.4(1.3)	5.5	938	31.6(2.0)	6.3	988	14.3(1.3)	8.9
301-400만원	1,698	20.3(1.3)	6.2	831	23.7(1.8)	7.4	867	16.5(1.8)	10.9
401만원 이상	3,086	22.9(1.2)	5.0	1,504	27.1(1.6)	6.0	1,582	18.4(1.3)	6.8
거주유형									
동	3,231	19.6(0.9)	4.6	1,467	24.5(1.2)	5.1	1,764	14.9(1.0)	7.0
읍·면	8,366	24.3(0.6)	2.6	3,843	29.4(0.9)	3.2	4,523	19.0(0.7)	3.7

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 109〉 걷기 실천율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,594	34.9(0.6)	1.8	5,310	37.1(0.9)	2.5	6,284	32.7(0.8)	2.5
연령									
19-29	1,035	40.3(1.7)	4.1	471	42.5(2.5)	5.9	564	37.7(2.3)	6.0
30-39	1,603	29.5(1.4)	4.9	758	34.4(2.2)	6.3	845	24.3(1.8)	7.3
40-49	1,956	32.8(1.4)	4.3	965	36.6(2.1)	5.7	991	28.7(2.0)	6.8
50-59	2,481	35.7(1.2)	3.4	1,179	33.4(1.7)	5.1	1,302	38.2(1.7)	4.5
60-69	1,932	40.0(1.7)	4.3	894	40.7(2.4)	5.8	1,038	39.5(2.1)	5.3
70 이상	2,587	33.4(1.3)	4.0	1,043	37.7(2.1)	5.6	1,544	30.5(1.6)	5.2
생애주기별									
19-64	8,057	34.7(0.7)	2.1	3,845	36.8(1.0)	2.8	4,212	32.3(0.9)	2.9
65 이상	3,537	36.2(1.1)	3.1	1,465	38.9(1.8)	4.5	2,072	34.2(1.4)	3.9
교육수준[2]									
무학	1,705	32.1(1.7)	5.2	328	36.2(3.7)	10.1	1,377	31.1(1.7)	5.6
초등학교	2,303	36.9(1.5)	4.0	970	37.5(2.5)	6.6	1,333	36.5(1.7)	4.5
중학교	1,390	37.7(1.9)	5.0	684	37.0(2.3)	6.3	706	38.3(2.6)	6.7
고등학교	3,728	35.9(1.1)	3.0	1,925	37.8(1.4)	3.8	1,803	33.7(1.5)	4.4
대학교 이상	2,458	32.7(1.2)	3.7	1,400	36.4(1.7)	4.6	1,058	27.4(1.7)	6.2
직업									
전문행정관리	1,037	33.8(1.8)	5.3	545	38.9(2.5)	6.5	492	27.9(2.5)	9.0
사무직	742	28.1(2.1)	7.5	382	30.2(3.0)	10.0	360	25.1(2.8)	11.2
판매·서비스직	1,293	35.8(1.8)	5.1	423	33.2(3.0)	8.9	870	37.4(2.2)	5.8
농림어업	2,097	40.4(1.4)	3.4	1,202	41.7(1.6)	3.9	895	38.3(1.9)	4.9
기능단순노무직	2,410	35.3(1.2)	3.4	1,585	36.2(1.5)	4.1	825	32.8(2.0)	6.1
기타[3]	4,013	35.1(1.2)	3.3	1,172	39.9(2.1)	5.2	2,841	32.7(1.3)	3.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,296	36.9(1.5)	4.2	863	38.8(2.3)	6.1	1,433	35.6(1.7)	4.8
101-200만원	1,951	34.9(1.6)	4.5	896	36.9(2.4)	6.6	1,055	33.2(2.0)	6.0
201-300만원	1,927	36.3(1.5)	4.1	939	39.5(2.1)	5.4	988	32.8(2.1)	6.3
301-400만원	1,697	33.9(1.5)	4.5	831	35.3(2.2)	6.2	866	32.3(2.0)	6.2
401만원 이상	3,085	34.3(1.2)	3.5	1,504	36.0(1.6)	4.4	1,581	32.5(1.6)	4.8
거주유형									
동	3,230	37.3(0.9)	2.5	1,467	39.0(1.4)	3.5	1,763	35.7(1.2)	3.5
읍·면	8,364	31.5(0.8)	2.6	3,843	34.6(1.1)	3.3	4,521	28.3(0.9)	3.1

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 110〉 근력운동 실천율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	17.9(0.5)	3.0	5,313	25.1(0.9)	3.6	6,287	10.7(0.5)	5.1
연령									
19-29	1,036	27.8(1.8)	6.5	471	40.3(2.7)	6.6	565	13.1(1.6)	12.5
30-39	1,603	16.9(1.0)	6.2	758	22.7(1.7)	7.4	845	10.7(1.3)	12.2
40-49	1,957	19.2(1.1)	5.6	965	23.5(1.7)	7.3	992	14.7(1.4)	9.3
50-59	2,481	17.6(1.0)	5.7	1,179	22.6(1.5)	6.7	1,302	12.3(1.2)	9.6
60-69	1,934	15.5(1.3)	8.1	896	23.5(2.0)	8.6	1,038	8.9(1.4)	15.9
70 이상	2,589	6.1(0.7)	11.2	1,044	11.7(1.4)	12.3	1,545	2.2(0.5)	24.1
생애주기별									
19-64	8,060	20.0(0.6)	3.2	3,846	27.0(1.0)	3.8	4,214	12.4(0.7)	5.4
65 이상	3,540	8.2(0.6)	7.9	1,467	13.9(1.3)	9.0	2,073	4.1(0.6)	14.3
교육수준[2]									
무학	1,705	2.2(0.4)	19.2	328	4.7(1.6)	34.2	1,377	1.6(0.4)	22.8
초등학교	2,307	10.1(1.0)	9.8	973	13.6(1.6)	11.7	1,334	7.7(1.2)	15.5
중학교	1,390	14.7(1.4)	9.2	684	20.1(2.2)	10.7	706	10.0(1.4)	13.6
고등학교	3,730	21.0(0.9)	4.3	1,925	27.9(1.3)	4.8	1,805	13.2(1.0)	7.4
대학교 이상	2,458	22.4(1.0)	4.5	1,400	28.2(1.5)	5.5	1,058	14.0(1.3)	9.1
직업									
전문행정관리	1,038	22.0(1.6)	7.2	545	28.2(2.3)	8.2	493	14.7(1.9)	12.8
사무직	742	17.8(1.6)	9.1	382	22.7(2.5)	10.8	360	10.9(2.0)	18.3
판매·서비스직	1,294	17.3(1.3)	7.5	423	24.6(2.6)	10.6	871	13.1(1.5)	11.1
농림어업	2,099	8.0(0.7)	8.8	1,204	10.9(1.1)	9.7	895	3.3(0.6)	17.9
기능단순노무직	2,411	21.1(1.3)	6.0	1,586	26.3(1.6)	6.2	825	7.9(1.5)	18.8
기타[3]	4,014	16.9(0.9)	5.2	1,172	29.3(1.9)	6.5	2,842	10.7(0.8)	7.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	8.3(0.9)	11.3	864	13.6(1.8)	13.5	1,433	4.7(0.9)	19.3
101-200만원	1,953	15.6(1.2)	7.8	898	23.4(2.1)	9.2	1,055	8.4(1.2)	14.4
201-300만원	1,927	17.8(1.1)	6.4	939	25.7(1.8)	7.1	988	9.2(1.1)	11.8
301-400만원	1,698	18.1(1.3)	7.0	831	23.2(1.9)	8.2	867	12.6(1.5)	11.8
401만원 이상	3,086	22.0(1.1)	4.8	1,504	29.5(1.7)	5.7	1,582	13.9(1.1)	7.6
거주유형									
동	3,231	20.4(0.8)	4.1	1,467	28.2(1.4)	5.0	1,764	12.8(0.9)	6.7
읍·면	8,369	14.3(0.5)	3.7	3,846	20.6(0.9)	4.5	4,523	7.6(0.5)	6.1

주 : 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 111〉 유연성운동 실천빈도[1]

(단위 : %)

구분	N	전혀 하지 않음		1일		2일		3일		4일		5일 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	11,599	52.0(0.7)	1.4	5.2(0.3)	6.4	7.9(0.4)	4.7	9.5(0.5)	4.8	3.4(0.2)	6.3	21.9(0.6)	2.7
성													
남자	5,313	53.1(0.9)	1.7	5.5(0.5)	9.2	7.0(0.5)	7.0	8.1(0.6)	6.9	3.3(0.3)	10.0	23.1(0.8)	3.3
여자	6,286	51.0(1.0)	2.0	5.0(0.4)	8.0	8.8(0.5)	5.8	10.9(0.7)	6.3	3.6(0.3)	8.4	20.7(0.8)	3.9
연령													
19-29	1,036	46.7(1.9)	4.1	8.6(1.0)	11.5	10.7(1.1)	9.9	10.3(1.2)	11.3	3.3(0.6)	18.1	20.3(1.5)	7.2
30-39	1,603	48.5(1.5)	3.1	7.6(0.8)	10.9	9.1(0.8)	9.0	10.6(0.9)	8.7	3.9(0.5)	12.2	20.2(1.2)	5.9
40-49	1,957	42.6(1.4)	3.4	6.2(0.7)	11.8	9.6(0.9)	8.9	11.9(1.0)	8.1	5.1(0.6)	12.6	24.6(1.4)	5.5
50-59	2,481	52.4(1.5)	2.8	2.8(0.4)	12.9	6.7(0.7)	10.0	10.6(1.0)	9.2	3.0(0.4)	13.5	24.5(1.2)	4.8
60-69	1,934	56.6(1.7)	3.0	2.6(0.5)	17.5	5.7(0.8)	14.0	6.5(1.0)	14.9	2.6(0.5)	19.7	25.9(1.6)	6.0
70 이상	2,588	75.5(1.4)	1.9	1.7(0.4)	21.9	3.5(0.5)	13.6	3.5(0.5)	14.9	1.3(0.4)	31.0	14.5(1.2)	8.2
생애주기별													
19-64	8,060	47.9(0.8)	1.7	6.0(0.4)	6.7	8.8(0.4)	4.9	10.6(0.5)	5.0	3.8(0.3)	6.7	22.9(0.6)	2.8
65 이상	3,539	71.2(1.3)	1.8	1.9(0.3)	16.0	4.0(0.5)	12.7	4.4(0.6)	13.4	1.6(0.4)	22.1	16.9(1.0)	6.1
교육수준[2]													
무학	1,705	81.6(1.3)	1.7	2.1(0.5)	23.3	3.3(0.6)	17.8	2.4(0.5)	20.4	1.0(0.3)	27.6	9.6(1.1)	11.2
초등학교	2,306	68.7(1.4)	2.0	1.6(0.3)	17.9	4.3(0.5)	12.4	6.0(0.7)	11.8	2.0(0.4)	20.4	17.4(1.1)	6.6
중학교	1,390	53.7(2.1)	3.9	2.1(0.4)	17.7	6.0(0.8)	12.8	8.2(1.1)	13.9	1.5(0.4)	26.6	28.6(1.9)	6.7
고등학교	3,730	46.6(1.1)	2.4	6.4(0.7)	10.7	8.8(0.6)	7.1	10.6(0.7)	6.9	4.0(0.4)	10.6	23.7(0.9)	4.0
대학교 이상	2,458	43.5(1.2)	2.7	7.2(0.6)	9.0	10.2(0.8)	7.8	11.9(0.9)	7.7	4.6(0.5)	9.9	22.7(1.0)	4.6
직업													
전문행정관리	1,038	40.7(1.9)	4.6	7.4(1.1)	14.5	10.0(1.1)	11.4	13.2(1.5)	11.3	4.7(0.7)	15.7	23.9(1.7)	7.0
사무직	742	44.5(2.3)	5.2	9.2(1.3)	14.5	11.1(1.5)	13.7	13.1(1.7)	12.7	5.1(0.9)	18.2	17.1(1.6)	9.5
판매·서비스직	1,294	44.6(1.6)	3.7	5.4(0.8)	15.5	8.6(1.0)	11.8	10.6(1.2)	11.0	4.0(0.6)	15.8	26.9(1.5)	5.6
농림어업	2,099	74.6(1.4)	1.8	2.7(0.5)	17.5	4.6(0.6)	12.7	3.3(0.4)	13.3	2.2(0.4)	17.6	12.7(1.1)	8.7
기능단순노무직	2,411	50.9(1.3)	2.5	4.7(0.6)	12.8	6.4(0.6)	9.9	8.4(0.7)	8.6	3.1(0.4)	13.9	26.4(1.2)	4.6
기타[3]	4,013	56.1(1.4)	2.4	4.5(0.5)	10.1	8.0(0.6)	7.8	9.1(0.8)	8.8	2.8(0.4)	13.2	19.7(1.0)	5.1
월 가구소득													
100만원 이하	2,296	71.5(1.3)	1.9	1.5(0.2)	16.0	5.2(0.6)	12.3	4.9(0.8)	16.4	1.5(0.4)	24.9	15.4(1.0)	6.6
101-200만원	1,953	57.8(1.7)	3.0	5.5(0.7)	13.3	6.0(0.8)	13.0	8.2(1.1)	13.6	2.8(0.5)	18.9	19.9(1.4)	7.1
201-300만원	1,927	51.6(1.6)	3.1	5.8(0.7)	11.8	9.0(1.0)	10.6	8.7(0.9)	10.1	3.4(0.6)	16.5	21.6(1.4)	6.4
301-400만원	1,698	47.0(1.8)	3.7	5.9(0.7)	11.6	8.5(0.9)	10.3	11.6(1.0)	8.9	3.8(0.5)	14.3	23.2(1.4)	6.0
401만원 이상	3,086	45.1(1.2)	2.7	5.8(0.7)	12.1	8.7(0.6)	7.2	11.2(0.8)	7.2	4.2(0.4)	9.0	24.8(1.0)	4.1
거주유형													
동	3,231	46.8(1.1)	2.3	5.7(0.5)	9.1	8.8(0.6)	6.5	10.9(0.7)	6.8	3.7(0.3)	9.0	24.1(0.9)	3.8
읍·면	8,368	59.7(0.8)	1.3	4.6(0.3)	6.9	6.6(0.4)	5.4	7.5(0.4)	4.9	3.0(0.2)	7.0	18.6(0.6)	3.3

주 : 1) 유연성운동 실천빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 112〉 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간[1]

(단위 : %)

구분	N	하루 1시간 미만		하루 1시간 - 2시간미만		하루 2시간 - 3시간미만		하루 3시간 - 4시간미만		하루 4시간 이상	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	19.0(0.5)	2.7	31.0(0.6)	1.9	24.0(0.5)	2.3	11.2(0.4)	3.7	14.7(0.5)	3.6
성											
남자	5,310	18.2(0.7)	4.1	30.6(0.9)	3.0	25.7(0.8)	3.3	11.5(0.6)	5.1	14.0(0.7)	4.9
여자	6,288	19.8(0.7)	3.5	31.4(0.8)	2.4	22.3(0.7)	3.0	10.9(0.5)	4.8	15.5(0.7)	4.2
연령											
19-29	1,036	18.9(1.3)	7.1	30.2(1.8)	5.8	23.4(1.7)	7.4	11.5(1.3)	11.6	16.1(1.4)	8.8
30-39	1,603	21.6(1.4)	6.6	35.7(1.4)	3.8	23.6(1.4)	5.8	9.3(0.8)	9.0	9.9(0.8)	8.2
40-49	1,957	22.6(1.3)	5.7	32.3(1.4)	4.3	26.7(1.3)	4.9	9.5(0.8)	8.7	8.9(0.8)	8.9
50-59	2,480	20.1(1.1)	5.4	33.2(1.2)	3.5	25.1(1.2)	4.7	11.5(0.8)	7.2	10.1(0.9)	9.1
60-69	1,934	12.2(1.0)	8.2	27.7(1.3)	4.6	24.7(1.4)	5.6	15.3(1.1)	7.1	20.1(1.6)	7.7
70 이상	2,588	13.8(1.0)	7.1	22.5(1.2)	5.2	18.9(1.0)	5.1	12.6(0.9)	7.0	32.2(1.4)	4.5
생애주기별											
19-64	8,059	20.3(0.6)	2.9	32.6(0.7)	2.1	24.8(0.6)	2.6	10.8(0.5)	4.4	11.5(0.5)	4.4
65 이상	3,539	13.0(0.8)	6.2	23.6(1.0)	4.1	20.5(0.8)	4.1	13.2(0.8)	6.1	29.6(1.2)	4.1
교육수준[2]											
무학	1,704	15.6(1.4)	9.0	24.9(1.4)	5.6	20.0(1.3)	6.5	12.0(1.0)	8.2	27.5(1.7)	6.2
초등학교	2,306	16.2(1.1)	7.0	27.0(1.1)	4.3	21.9(1.1)	5.2	13.0(1.0)	7.5	21.9(1.2)	5.7
중학교	1,390	15.7(1.3)	8.0	28.6(1.7)	5.8	26.5(1.6)	6.2	14.8(1.5)	10.0	14.4(1.3)	8.7
고등학교	3,730	19.7(0.9)	4.6	32.1(0.9)	2.9	24.6(0.9)	3.7	11.4(0.7)	6.1	12.3(0.8)	6.3
대학교 이상	2,458	21.3(1.0)	4.7	33.8(1.2)	3.5	24.6(1.1)	4.3	9.0(0.7)	8.1	11.4(0.7)	6.3
직업											
전문행정관리	1,038	23.7(1.6)	6.8	35.6(1.8)	5.0	23.6(1.7)	7.4	8.6(1.1)	12.4	8.5(1.1)	12.8
사무직	742	22.8(2.1)	9.1	36.5(2.3)	6.3	21.4(1.7)	8.0	9.4(1.4)	14.8	9.9(1.2)	12.3
판매·서비스직	1,294	23.0(1.5)	6.6	35.7(1.7)	4.7	22.4(1.4)	6.4	11.0(1.1)	10.1	7.8(0.9)	11.9
농림어업	2,098	16.4(1.1)	6.6	32.1(1.3)	4.2	26.3(1.1)	4.4	14.7(0.9)	6.3	10.6(0.7)	6.9
기능단순노무직	2,411	21.9(1.1)	5.0	33.5(1.3)	3.8	26.8(1.2)	4.4	10.4(0.7)	6.7	7.4(0.8)	10.9
기타[3]	4,013	13.4(0.7)	5.5	24.1(0.9)	3.8	23.0(1.0)	4.2	12.5(0.8)	6.2	27.0(1.1)	4.1
월 가구소득											
100만원 이하	2,296	14.9(1.1)	7.7	24.4(1.2)	5.0	19.9(1.1)	5.5	13.2(1.0)	7.7	27.6(1.5)	5.6
101-200만원	1,953	16.8(1.1)	6.8	29.3(1.5)	5.2	22.2(1.3)	5.9	13.0(1.1)	8.3	18.7(1.5)	7.9
201-300만원	1,927	17.7(1.2)	7.0	28.6(1.3)	4.7	26.6(1.4)	5.2	11.1(0.8)	7.6	16.1(1.2)	7.6
301-400만원	1,698	18.3(1.2)	6.3	34.6(1.6)	4.5	24.6(1.5)	6.1	11.9(0.9)	7.9	10.6(0.9)	8.9
401만원 이상	3,086	22.6(1.0)	4.6	33.0(1.0)	3.1	24.8(0.9)	3.7	9.5(0.7)	7.4	10.0(0.8)	8.0
거주유형											
동	3,231	19.9(0.8)	4.0	30.3(0.9)	3.0	24.6(0.8)	3.4	10.9(0.6)	5.9	14.4(0.8)	5.7
읍·면	8,367	17.7(0.5)	3.0	32.1(0.7)	2.1	23.3(0.5)	2.3	11.8(0.4)	3.4	15.2(0.5)	3.2

주 : 1) 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 113〉 주말(토, 일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간[1)]

(단위 : %)

구분	N	하루 1시간 미만		하루 1시간 - 2시간미만		하루 2시간 - 3시간미만		하루 3시간 - 4시간미만		하루 4시간 이상	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	19.0(0.5)	2.8	24.4(0.6)	2.4	22.2(0.5)	2.3	14.7(0.5)	3.1	19.8(0.6)	3.0
성											
남자	5,312	18.5(0.7)	3.6	23.6(0.8)	3.2	22.6(0.7)	3.2	15.3(0.7)	4.4	20.0(0.8)	4.1
여자	6,288	19.6(0.7)	3.4	25.2(0.7)	2.9	21.7(0.7)	3.1	14.0(0.6)	4.4	19.5(0.7)	3.5
연령											
19-29	1,036	20.1(1.4)	7.1	19.3(1.6)	8.1	23.3(1.7)	7.2	17.8(1.5)	8.4	19.5(1.7)	8.5
30-39	1,603	21.6(1.3)	6.0	25.4(1.2)	4.9	23.4(1.3)	5.7	12.5(0.9)	7.5	17.2(1.2)	6.9
40-49	1,957	20.8(1.2)	5.9	24.9(1.3)	5.3	22.9(1.3)	5.6	15.2(1.0)	6.8	16.2(1.1)	6.6
50-59	2,481	18.9(1.1)	5.6	29.0(1.1)	3.9	22.0(1.1)	4.8	14.3(1.0)	6.6	15.8(1.1)	7.0
60-69	1,934	15.0(1.2)	7.8	24.9(1.4)	5.5	22.3(1.3)	5.7	15.1(1.1)	7.2	22.7(1.5)	6.4
70 이상	2,589	14.8(1.1)	7.4	21.2(1.1)	5.0	17.8(1.0)	5.5	12.8(0.9)	6.9	33.4(1.4)	4.1
생애주기별											
19-64	8,060	20.1(0.6)	3.1	24.9(0.7)	2.7	22.8(0.6)	2.6	14.9(0.5)	3.5	17.3(0.6)	3.5
65 이상	3,540	14.3(0.9)	6.5	21.7(0.9)	4.2	19.1(0.8)	4.3	13.7(0.8)	6.0	31.1(1.2)	3.8
교육수준[2)]											
무학	1,705	15.0(1.3)	8.6	24.9(1.4)	5.5	19.8(1.2)	6.3	10.3(0.9)	9.2	30.0(1.7)	5.8
초등학교	2,307	16.1(1.2)	7.5	26.1(1.3)	4.8	18.3(1.0)	5.6	15.1(1.1)	7.1	24.4(1.2)	5.1
중학교	1,390	17.8(1.4)	8.0	23.8(1.6)	6.9	24.4(1.6)	6.4	15.6(1.3)	8.5	18.5(1.3)	7.1
고등학교	3,730	19.8(0.8)	4.1	23.7(0.9)	3.9	23.3(1.0)	4.1	14.7(0.8)	5.3	18.4(0.8)	4.6
대학교 이상	2,458	20.7(1.0)	4.9	24.6(1.2)	4.7	22.2(1.0)	4.7	15.3(0.9)	5.9	17.2(1.0)	5.7
직업											
전문행정관리	1,038	20.1(1.5)	7.7	26.0(1.8)	6.9	23.4(1.7)	7.2	16.2(1.6)	10.0	14.4(1.3)	8.9
사무직	742	19.1(1.8)	9.3	22.8(2.0)	8.8	25.4(2.1)	8.2	15.7(1.6)	10.1	17.0(1.7)	9.8
판매·서비스직	1,294	23.8(1.5)	6.2	28.9(1.6)	5.6	19.5(1.4)	7.1	12.5(1.2)	9.9	15.3(1.4)	9.3
농림어업	2,099	17.0(1.1)	6.3	32.2(1.2)	3.6	23.9(1.2)	4.9	15.1(1.0)	6.3	11.8(0.8)	6.5
기능단순노무직	2,411	20.9(1.2)	5.6	25.9(1.2)	4.4	22.5(1.0)	4.3	14.6(1.0)	6.6	16.1(1.0)	6.1
기타[3)]	4,014	16.0(0.8)	5.2	19.4(0.9)	4.7	21.2(1.0)	4.6	14.6(0.8)	5.4	28.8(1.1)	3.9
월 가구소득											
100만원 이하	2,297	15.6(1.2)	7.7	21.7(1.1)	5.3	19.0(1.1)	5.8	13.3(1.0)	7.4	30.4(1.6)	5.3
101-200만원	1,953	17.6(1.2)	6.7	23.4(1.6)	6.6	20.5(1.3)	6.4	14.9(1.1)	7.1	23.5(1.5)	6.5
201-300만원	1,927	18.5(1.3)	6.8	22.8(1.4)	6.0	24.0(1.4)	5.6	14.5(1.1)	7.3	20.3(1.4)	6.9
301-400만원	1,698	18.2(1.2)	6.9	25.8(1.3)	5.1	22.5(1.3)	5.9	16.5(1.2)	7.5	17.1(1.2)	7.0
401만원 이상	3,086	21.6(1.0)	4.8	25.1(1.0)	4.2	23.4(0.9)	4.0	14.3(0.8)	5.6	15.7(1.0)	6.2
거주유형											
동	3,231	19.5(0.8)	4.2	23.3(0.9)	3.9	22.3(0.8)	3.5	15.0(0.7)	4.6	19.9(0.9)	4.6
읍·면	8,369	18.4(0.5)	2.9	25.9(0.6)	2.3	21.9(0.6)	2.6	14.2(0.5)	3.5	19.5(0.6)	3.0

주 : 1) 주말(토, 일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 114〉 아침식사 섭취빈도 및 아침결식예방 인구비율[1]

(단위 : %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	13.8(0.5)	3.9	6.0(0.3)	5.5	7.8(0.4)	4.6	72.4(0.7)	1.0
성									
남자	5,312	14.6(0.7)	5.1	6.1(0.5)	8.0	7.4(0.5)	7.1	71.9(1.0)	1.3
여자	6,287	13.0(0.7)	5.2	6.0(0.5)	7.6	8.1(0.5)	5.9	73.0(0.8)	1.1
연령									
19-29	1,036	29.6(1.7)	5.8	11.8(1.1)	9.1	14.5(1.4)	9.6	44.2(1.8)	4.0
30-39	1,603	21.8(1.5)	6.7	9.6(0.8)	8.9	11.7(0.9)	8.0	56.9(1.7)	2.9
40-49	1,957	13.6(1.1)	8.1	7.0(0.8)	11.3	8.2(0.8)	9.6	71.2(1.4)	1.9
50-59	2,480	7.1(0.7)	10.5	3.2(0.5)	15.8	4.7(0.6)	11.8	85.0(1.0)	1.1
60-69	1,934	3.0(0.6)	19.5	0.8(0.3)	33.3	2.1(0.4)	17.7	94.1(0.8)	0.8
70 이상	2,589	0.8(0.2)	22.9	0.5(0.2)	40.3	1.8(0.4)	19.5	96.8(0.4)	0.5
생애주기별									
19-64	8,059	16.5(0.6)	3.9	7.2(0.4)	5.5	9.0(0.4)	4.7	67.4(0.8)	1.2
65 이상	3,540	1.1(0.2)	20.1	0.6(0.2)	28.2	2.0(0.3)	14.9	96.3(0.4)	0.4
교육수준[3]									
무학	1,706	2.1(0.5)	26.5	0.7(0.3)	43.2	2.9(0.6)	19.0	94.3(0.8)	0.9
초등학교	2,306	3.1(0.6)	19.8	1.3(0.3)	21.9	2.5(0.4)	17.9	93.1(0.8)	0.9
중학교	1,389	8.6(1.2)	13.6	3.2(0.7)	21.9	5.0(0.7)	15.0	83.3(1.5)	1.8
고등학교	3,730	18.0(1.0)	5.4	7.5(0.6)	7.9	9.7(0.6)	6.6	64.9(1.2)	1.9
대학교 이상	2,458	17.7(1.1)	6.1	8.5(0.7)	8.2	9.7(0.7)	7.5	64.1(1.3)	2.1
직업									
전문행정관리	1,038	20.2(1.7)	8.2	7.4(1.1)	15.6	9.4(1.1)	11.8	63.0(2.0)	3.2
사무직	742	17.9(1.7)	9.7	8.5(1.2)	14.0	9.1(1.3)	14.6	64.5(2.2)	3.5
판매·서비스직	1,294	18.8(1.7)	8.9	8.6(1.0)	11.4	8.8(1.0)	10.8	63.8(1.9)	2.9
농림어업	2,098	1.9(0.4)	21.8	1.3(0.3)	25.6	1.8(0.4)	21.9	95.0(0.7)	0.7
기능단순노무직	2,411	15.0(1.1)	7.2	5.3(0.6)	12.0	8.2(0.7)	8.8	71.5(1.4)	1.9
기타[4]	4,014	10.6(0.8)	7.1	5.6(0.6)	10.6	7.6(0.7)	8.7	76.2(1.1)	1.4
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	5.8(0.9)	15.2	2.4(0.5)	21.9	4.9(0.9)	18.2	86.8(1.3)	1.5
101-200만원	1,952	11.1(1.0)	9.2	4.1(0.7)	17.1	5.9(0.9)	14.4	79.0(1.4)	1.8
201-300만원	1,927	15.1(1.3)	8.3	6.9(0.8)	11.8	8.1(0.8)	10.2	69.9(1.6)	2.3
301-400만원	1,698	15.1(1.2)	8.3	7.5(1.0)	13.1	7.9(0.9)	11.2	69.4(1.7)	2.5
401만원 이상	3,086	16.1(1.1)	6.5	7.0(0.6)	8.4	9.4(0.6)	6.4	67.4(1.3)	1.9
거주유형									
동	3,231	16.1(0.8)	5.2	7.1(0.5)	7.3	8.5(0.5)	6.2	68.3(1.1)	1.6
읍·면	8,368	10.4(0.5)	5.1	4.5(0.3)	6.4	6.6(0.4)	6.2	78.4(0.7)	0.9

주 : 1) 아침결식예방 인구비율 : (최근 1주일(7일) 동안 5회 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 115〉 저염선호율[1]

(단위 : %)

구분	N	Type Ⅰ		Type Ⅱ		Type Ⅲ	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,587	40.8(0.7)	1.6	25.7(0.6)	2.2	11.7(0.5)	4.0
성							
남자	5,304	42.7(1.0)	2.3	22.3(0.8)	3.6	8.8(0.6)	6.4
여자	6,283	38.9(0.8)	2.1	29.1(0.8)	2.6	14.7(0.7)	4.6
연령							
19-29	1,035	45.8(1.9)	4.2	20.4(1.5)	7.3	6.4(1.0)	15.1
30-39	1,603	45.1(1.5)	3.3	24.3(1.4)	5.8	10.6(1.0)	9.5
40-49	1,956	42.3(1.5)	3.5	27.3(1.2)	4.4	11.3(1.0)	8.7
50-59	2,476	37.9(1.3)	3.5	30.3(1.1)	3.6	14.7(1.1)	7.6
60-69	1,930	35.1(1.6)	4.5	26.7(1.3)	4.9	16.7(1.4)	8.3
70 이상	2,587	34.6(1.3)	3.8	24.0(1.1)	4.7	12.1(1.0)	8.3
생애주기별							
19-64	8,051	42.2(0.7)	1.7	25.9(0.6)	2.5	11.4(0.5)	4.5
65 이상	3,536	34.0(1.1)	3.3	24.8(0.9)	3.8	13.1(1.0)	7.3
교육수준[2]							
무학	1,704	35.3(1.7)	4.8	23.3(1.4)	5.8	11.9(1.2)	10.1
초등학교	2,302	34.8(1.4)	4.0	28.0(1.3)	4.6	13.0(1.1)	8.4
중학교	1,390	41.1(1.7)	4.2	28.2(1.4)	5.1	12.5(1.3)	10.3
고등학교	3,724	42.7(1.1)	2.5	24.9(0.9)	3.7	11.4(0.7)	5.9
대학교 이상	2,457	42.3(1.3)	3.0	25.5(1.2)	4.8	11.3(0.9)	8.3
직업							
전문행정관리	1,036	41.6(2.1)	5.0	24.9(1.9)	7.5	11.7(1.2)	10.6
사무직	742	41.9(2.4)	5.7	27.7(2.1)	7.6	11.7(1.6)	13.5
판매·서비스직	1,294	41.5(1.7)	4.1	27.9(1.4)	5.2	12.1(1.2)	9.7
농림어업	2,096	38.3(1.3)	3.3	24.2(1.1)	4.6	8.5(0.7)	8.1
기능단순노무직	2,407	44.2(1.5)	3.3	23.7(1.2)	5.2	9.3(0.8)	8.3
기타[3]	4,010	38.2(1.1)	2.9	26.5(1.0)	3.7	14.1(0.9)	6.1
월 가구소득							
100만원 이하	2,295	36.4(1.6)	4.3	23.3(1.1)	4.7	13.2(1.2)	8.7
101-200만원	1,951	36.8(1.5)	4.1	25.9(1.4)	5.6	12.8(1.2)	9.2
201-300만원	1,924	44.1(1.6)	3.5	24.3(1.3)	5.5	11.4(1.1)	10.0
301-400만원	1,697	40.9(1.5)	3.6	28.0(1.4)	5.2	10.5(1.1)	10.6
401만원 이상	3,084	42.0(1.2)	2.9	26.0(1.0)	3.9	11.7(0.9)	7.8
거주유형							
동	3,229	40.4(1.0)	2.5	26.0(0.8)	3.3	13.2(0.7)	5.5
읍·면	8,358	41.3(0.7)	1.6	25.2(0.6)	2.3	9.6(0.4)	4.4

주 : 1) 저염선호율 : 3문항 중 「한 가지만 선택한 경우 Type Ⅰ, 두 가지를 선택한 경우 Type Ⅱ, 세 가지 모두 선택 시 Type Ⅲ」

① 평소 음식을 먹을 때 "약간 싱겁게 먹는다" 또는 "아주 싱겁게 먹는다"에 응답한 사람의 수 또는,
② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 "전혀 더 넣지 않는다"에 응답한 사람의 수 또는,
③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 "찍어 먹지 않는다"에 응답한 사람의 수

/ 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 116〉 가공식품 선택 시 영양표시 이용률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,595	29.1(0.7)	2.3	5,307	19.6(0.8)	3.8	6,288	38.6(1.0)	2.5
연령									
19-29	1,036	38.4(1.8)	4.8	471	30.0(2.5)	8.4	565	48.4(2.7)	5.6
30-39	1,602	44.4(1.5)	3.3	757	26.2(1.8)	7.0	845	63.9(1.9)	2.9
40-49	1,955	36.9(1.4)	3.7	963	22.0(1.7)	7.6	992	52.9(2.0)	3.8
50-59	2,480	23.7(1.2)	4.9	1,178	14.7(1.3)	8.8	1,302	33.1(1.8)	5.4
60-69	1,933	11.5(0.9)	8.0	895	6.7(0.9)	13.1	1,038	15.6(1.5)	9.8
70 이상	2,589	4.7(0.6)	12.6	1,043	5.4(0.9)	17.5	1,546	4.1(0.6)	14.5
생애주기별									
19-64	8,056	34.0(0.8)	2.2	3,842	22.0(0.9)	3.9	4,214	47.0(1.1)	2.4
65 이상	3,539	5.7(0.5)	9.6	1,465	5.1(0.7)	14.2	2,074	6.1(0.7)	11.8
교육수준[2]									
무학	1,706	2.7(0.5)	18.8	328	4.6(1.4)	31.0	1,378	2.2(0.5)	21.3
초등학교	2,304	10.6(0.8)	7.3	970	4.8(0.8)	17.6	1,334	14.6(1.2)	8.0
중학교	1,390	24.5(1.6)	6.3	684	13.0(1.7)	12.8	706	34.4(2.4)	7.1
고등학교	3,728	33.1(1.0)	3.2	1,923	20.8(1.2)	5.9	1,805	47.3(1.6)	3.3
대학교 이상	2,457	40.2(1.4)	3.5	1,399	25.4(1.4)	5.6	1,058	61.4(2.0)	3.3
직업									
전문행정관리	1,038	40.7(2.0)	5.0	545	26.5(2.2)	8.4	493	57.3(2.9)	5.0
사무직	739	38.1(2.3)	6.1	379	26.8(2.8)	10.4	360	53.5(3.5)	6.6
판매·서비스직	1,294	37.4(1.7)	4.6	423	22.3(2.5)	11.2	871	46.2(2.3)	4.9
농림어업	2,097	11.9(0.9)	7.9	1,202	9.5(1.1)	11.2	895	15.8(1.6)	9.8
기능단순노무직	2,410	21.5(1.2)	5.5	1,585	18.1(1.3)	7.4	825	30.0(2.1)	6.9
기타[3]	4,015	28.8(1.1)	3.8	1,172	17.8(1.7)	9.8	2,843	34.3(1.4)	4.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	10.3(0.9)	8.7	864	10.4(1.5)	14.6	1,434	10.2(1.0)	10.0
101-200만원	1,950	20.9(1.3)	6.4	895	12.3(1.5)	12.4	1,055	28.9(2.0)	7.0
201-300만원	1,927	33.2(1.3)	3.9	939	23.2(1.7)	7.2	988	44.2(2.0)	4.4
301-400만원	1,698	30.1(1.4)	4.7	831	18.1(1.8)	9.7	867	43.1(2.0)	4.6
401만원 이상	3,083	35.8(1.4)	3.8	1,501	23.6(1.6)	6.6	1,582	48.9(1.8)	3.7
거주유형									
동	3,231	31.7(1.0)	3.3	1,467	21.0(1.2)	5.6	1,764	42.1(1.5)	3.6
읍·면	8,364	25.2(0.6)	2.5	3,840	17.5(0.7)	4.2	4,524	33.3(0.9)	2.7

주 : 1) 가공식품 선택 시 영양표시 이용률 : (영양표시를 "항상 읽는다" 또는 "가끔 읽는다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 117〉 영양교육 및 상담수혜율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	3.9(0.3)	7.2	5,312	2.9(0.4)	12.3	6,285	4.9(0.4)	7.2
연령									
19-29	1,036	5.3(1.1)	20.1	471	5.1(1.4)	28.5	565	5.6(1.2)	22.1
30-39	1,602	3.8(0.6)	14.5	758	2.7(0.6)	23.2	844	4.9(0.9)	17.4
40-49	1,957	3.4(0.5)	14.2	965	2.5(0.7)	26.1	992	4.4(0.7)	16.8
50-59	2,481	3.3(0.4)	12.1	1,179	1.3(0.4)	29.5	1,302	5.4(0.7)	12.6
60-69	1,933	3.5(0.6)	16.8	895	2.3(0.7)	29.8	1,038	4.5(0.7)	15.5
70 이상	2,588	4.0(0.5)	12.7	1,044	3.6(0.8)	21.0	1,544	4.3(0.6)	15.0
생애주기별									
19-64	8,059	3.9(0.3)	8.4	3,846	2.8(0.4)	14.7	4,213	5.0(0.4)	8.4
65 이상	3,538	3.9(0.4)	10.7	1,466	3.4(0.6)	17.1	2,072	4.3(0.5)	12.6
교육수준[2]									
무학	1,704	3.1(0.6)	17.7	328	1.4(0.7)	46.7	1,376	3.5(0.6)	17.8
초등학교	2,307	4.1(0.5)	13.0	973	2.8(0.6)	21.4	1,334	5.0(0.7)	14.8
중학교	1,389	3.2(0.5)	16.4	683	1.1(0.4)	40.6	706	5.0(0.9)	17.6
고등학교	3,729	3.4(0.4)	11.6	1,925	3.0(0.6)	19.3	1,804	3.8(0.5)	13.5
대학교 이상	2,458	4.9(0.6)	11.7	1,400	3.4(0.7)	21.1	1,058	7.1(0.9)	12.9
직업									
전문행정관리	1,038	6.0(0.9)	15.4	545	3.3(1.0)	30.2	493	9.1(1.6)	17.2
사무직	742	3.8(0.8)	20.5	382	2.2(0.9)	42.6	360	6.0(1.3)	21.8
판매·서비스직	1,294	5.7(0.8)	13.8	423	3.8(1.2)	32.1	871	6.9(1.0)	15.0
농림어업	2,099	2.4(0.3)	13.1	1,204	2.1(0.4)	17.3	895	2.8(0.5)	17.6
기능단순노무직	2,411	2.7(0.4)	15.1	1,586	2.8(0.6)	19.9	825	2.6(0.5)	17.9
기타[3]	4,011	3.6(0.4)	11.1	1,171	3.2(0.8)	26.3	2,840	3.8(0.4)	10.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	3.5(0.6)	16.9	864	2.5(0.8)	31.7	1,433	4.2(0.8)	18.3
101-200만원	1,953	2.9(0.5)	16.2	898	1.9(0.6)	30.5	1,055	3.9(0.7)	17.8
201-300만원	1,926	2.8(0.4)	15.7	939	1.9(0.6)	31.1	987	3.8(0.7)	17.3
301-400만원	1,698	2.5(0.5)	19.0	831	2.1(0.6)	31.2	867	2.9(0.6)	20.5
401만원 이상	3,086	5.4(0.6)	10.4	1,504	4.1(0.8)	18.2	1,582	6.8(0.7)	10.9
거주유형									
동	3,231	4.1(0.4)	10.7	1,467	3.3(0.6)	17.1	1,764	4.8(0.5)	10.6
읍·면	8,366	3.6(0.3)	7.5	3,845	2.3(0.3)	13.8	4,521	5.0(0.4)	8.6

주 : 1) 영양교육 및 상담수혜율 : (최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 118〉 식품 안정성 확보율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,582	96.4(0.3)	0.3	5,307	97.1(0.3)	0.4	6,275	95.7(0.3)	0.4
연령									
19-29	1,034	98.3(0.5)	0.5	469	97.5(0.8)	0.8	565	99.2(0.4)	0.4
30-39	1,603	98.2(0.4)	0.4	758	98.3(0.5)	0.5	845	98.1(0.5)	0.5
40-49	1,957	98.2(0.4)	0.4	965	98.1(0.5)	0.5	992	98.3(0.5)	0.5
50-59	2,480	97.3(0.4)	0.4	1,178	98.2(0.4)	0.4	1,302	96.4(0.7)	0.8
60-69	1,932	94.6(0.9)	1.0	895	96.8(0.7)	0.7	1,037	92.6(1.3)	1.4
70 이상	2,576	88.4(1.1)	1.2	1,042	90.3(1.8)	2.0	1,534	87.0(1.1)	1.2
생애주기별									
19-64	8,056	97.8(0.2)	0.3	3,842	98.0(0.3)	0.3	4,214	97.6(0.3)	0.3
65 이상	3,526	89.9(0.9)	1.0	1,465	92.2(1.4)	1.5	2,061	88.2(0.9)	1.1
교육수준[2]									
무학	1,699	85.0(1.3)	1.6	328	85.1(3.5)	4.2	1,371	85.0(1.4)	1.6
초등학교	2,298	93.5(0.8)	0.9	970	94.2(1.0)	1.1	1,328	93.0(1.0)	1.1
중학교	1,390	94.6(0.9)	1.0	684	94.8(1.2)	1.3	706	94.5(1.4)	1.4
고등학교	3,728	97.9(0.3)	0.3	1,923	97.5(0.5)	0.5	1,805	98.4(0.4)	0.4
대학교 이상	2,457	99.4(0.2)	0.2	1,399	99.2(0.4)	0.4	1,058	99.6(0.2)	0.2
직업									
전문행정관리	1,037	99.0(0.4)	0.4	544	98.4(0.7)	0.7	493	99.6(0.4)	0.4
사무직	742	99.6(0.2)	0.2	382	99.8(0.2)	0.2	360	99.4(0.3)	0.3
판매·서비스직	1,294	98.2(0.5)	0.6	423	99.3(0.7)	0.7	871	97.5(0.8)	0.8
농림어업	2,098	96.1(0.5)	0.5	1,203	97.3(0.5)	0.5	895	94.2(1.0)	1.1
기능단순노무직	2,408	96.5(0.5)	0.5	1,585	97.4(0.5)	0.5	823	94.2(1.1)	1.2
기타[3]	4,001	93.9(0.6)	0.6	1,169	93.7(1.0)	1.1	2,832	94.1(0.6)	0.6
월 가구소득									
100만원 이하	2,293	84.2(1.3)	1.6	863	87.0(1.8)	2.1	1,430	82.3(1.4)	1.7
101-200만원	1,950	93.9(1.0)	1.0	895	93.9(1.3)	1.4	1,055	93.9(1.1)	1.2
201-300만원	1,927	98.3(0.6)	0.6	939	98.0(0.8)	0.8	988	98.7(0.5)	0.5
301-400만원	1,694	98.6(0.4)	0.4	831	98.8(0.6)	0.6	863	98.3(0.5)	0.5
401만원 이상	3,084	99.7(0.2)	0.2	1,503	99.8(0.1)	0.1	1,581	99.5(0.3)	0.3
거주유형									
동	3,228	96.8(0.4)	0.5	1,466	97.3(0.5)	0.6	1,762	96.3(0.5)	0.5
읍·면	8,354	95.9(0.3)	0.3	3,841	96.9(0.3)	0.3	4,513	94.8(0.4)	0.4

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : ("우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다" 또는 "우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 119〉 과일 섭취율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	40.4(0.7)	1.7	5,313	34.6(0.8)	2.4	6,288	46.2(0.9)	2.0
연령									
19-29	1,036	33.9(1.9)	5.5	471	29.3(2.7)	9.2	565	39.2(2.3)	6.0
30-39	1,603	42.9(1.4)	3.3	758	32.0(1.9)	5.8	845	54.5(2.0)	3.7
40-49	1,957	44.0(1.4)	3.2	965	35.1(2.0)	5.6	992	53.6(2.1)	4.0
50-59	2,481	47.4(1.5)	3.1	1,179	39.8(1.8)	4.5	1,302	55.5(1.9)	3.5
60-69	1,934	40.8(1.6)	4.0	896	40.0(2.1)	5.2	1,038	41.5(2.1)	5.0
70 이상	2,590	28.2(1.5)	5.3	1,044	32.0(2.0)	6.3	1,546	25.6(1.6)	6.2
생애주기별									
19-64	8,060	42.4(0.7)	1.8	3,846	34.6(0.9)	2.6	4,214	50.8(1.1)	2.1
65 이상	3,541	31.0(1.3)	4.2	1,467	34.5(1.8)	5.2	2,074	28.6(1.4)	4.8
교육수준[2]									
무학	1,706	19.4(1.4)	7.4	328	18.4(3.0)	16.1	1,378	19.7(1.4)	7.2
초등학교	2,307	35.7(1.4)	4.0	973	26.6(1.7)	6.3	1,334	42.1(1.9)	4.4
중학교	1,390	40.2(1.8)	4.5	684	33.4(2.3)	6.8	706	45.9(2.4)	5.3
고등학교	3,730	40.2(1.1)	2.7	1,925	32.2(1.4)	4.5	1,805	49.3(1.5)	3.0
대학교 이상	2,458	48.5(1.3)	2.6	1,400	41.4(1.4)	3.5	1,058	58.5(2.0)	3.4
직업									
전문행정관리	1,038	49.2(2.0)	4.1	545	42.2(2.4)	5.8	493	57.2(2.9)	5.1
사무직	742	42.4(2.1)	4.9	382	39.2(3.0)	7.7	360	46.8(3.0)	6.5
판매·서비스직	1,294	43.2(1.8)	4.2	423	34.1(3.0)	8.8	871	48.5(2.1)	4.3
농림어업	2,099	40.3(1.5)	3.8	1,204	41.1(1.8)	4.4	895	39.0(1.8)	4.7
기능단순노무직	2,411	32.0(1.2)	3.8	1,586	28.5(1.4)	5.0	825	40.8(2.3)	5.5
기타[3]	4,015	41.4(1.3)	3.3	1,172	33.9(2.1)	6.2	2,843	45.0(1.4)	3.2
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	25.2(1.3)	5.3	864	23.3(1.8)	7.5	1,434	26.6(1.7)	6.3
101-200만원	1,953	34.0(1.6)	4.6	898	30.9(1.8)	5.9	1,055	36.9(2.1)	5.8
201-300만원	1,927	38.8(1.6)	4.0	939	33.9(1.9)	5.6	988	44.2(2.0)	4.4
301-400만원	1,698	40.1(1.7)	4.1	831	30.9(2.0)	6.4	867	50.2(2.3)	4.6
401만원 이상	3,086	48.4(1.3)	2.6	1,504	40.4(1.6)	3.9	1,582	57.1(1.7)	2.9
거주유형									
동	3,231	42.9(1.1)	2.5	1,467	35.0(1.3)	3.6	1,764	50.5(1.4)	2.7
읍·면	8,370	36.8(0.8)	2.1	3,846	33.9(1.0)	2.9	4,524	39.8(0.9)	2.3

주 : 1) 과일 섭취율 : (최근 1달(30일) 동안 하루(매일) 1회 이상 과일(과일 주스 제외)을 먹은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 120〉 생채소 섭취율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	34.6(0.7)	1.9	5,311	33.9(0.8)	2.5	6,288	35.3(0.8)	2.3
연령									
19-29	1,036	29.2(1.9)	6.5	471	34.1(2.9)	8.6	565	23.4(2.1)	8.9
30-39	1,603	30.1(1.5)	4.9	758	25.7(1.8)	6.9	845	34.9(1.8)	5.2
40-49	1,957	35.7(1.4)	3.9	965	33.1(1.8)	5.4	992	38.5(1.9)	4.9
50-59	2,480	40.6(1.4)	3.4	1,178	37.8(1.7)	4.4	1,302	43.4(2.0)	4.5
60-69	1,933	41.5(1.6)	4.0	895	43.5(2.2)	5.1	1,038	39.8(2.1)	5.2
70 이상	2,590	31.5(1.4)	4.3	1,044	33.7(2.0)	5.9	1,546	29.9(1.5)	5.1
생애주기별									
19-64	8,059	34.8(0.7)	2.1	3,845	33.6(0.9)	2.7	4,214	36.0(0.9)	2.6
65 이상	3,540	34.1(1.2)	3.5	1,466	36.2(1.7)	4.6	2,074	32.6(1.4)	4.3
교육수준[2]									
무학	1,706	26.3(1.4)	5.3	328	24.1(2.8)	11.7	1,378	26.8(1.6)	5.8
초등학교	2,306	37.6(1.4)	3.8	972	36.8(2.1)	5.8	1,334	38.1(1.7)	4.3
중학교	1,390	38.9(1.6)	4.2	684	36.4(2.3)	6.4	706	41.0(2.3)	5.7
고등학교	3,730	34.8(1.1)	3.2	1,925	34.2(1.4)	4.1	1,805	35.4(1.5)	4.1
대학교 이상	2,457	34.0(1.2)	3.4	1,399	33.0(1.4)	4.2	1,058	35.5(1.8)	5.0
직업									
전문행정관리	1,038	33.0(1.7)	5.2	545	32.9(2.3)	7.1	493	33.2(2.5)	7.4
사무직	742	27.8(2.1)	7.6	382	29.0(2.7)	9.3	360	26.1(2.8)	10.7
판매·서비스직	1,294	40.4(1.8)	4.5	423	36.8(3.0)	8.3	871	42.6(2.1)	5.0
농림어업	2,098	43.6(1.5)	3.4	1,203	44.2(1.7)	3.8	895	42.7(2.0)	4.6
기능단순노무직	2,411	30.9(1.3)	4.1	1,586	30.8(1.5)	4.8	825	31.2(2.1)	6.8
기타[3]	4,014	35.0(1.2)	3.3	1,171	35.3(2.2)	6.1	2,843	34.9(1.2)	3.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	31.1(1.6)	5.0	864	32.7(2.4)	7.3	1,434	30.0(1.7)	5.5
101-200만원	1,953	34.3(1.8)	5.1	898	32.3(2.1)	6.6	1,055	36.2(2.1)	5.8
201-300만원	1,926	34.3(1.7)	5.0	938	33.2(2.2)	6.6	988	35.5(2.1)	5.8
301-400만원	1,698	32.8(1.5)	4.6	831	30.2(1.9)	6.3	867	35.7(2.0)	5.7
401만원 이상	3,086	36.3(1.2)	3.3	1,504	36.1(1.5)	4.1	1,582	36.5(1.5)	4.1
거주유형									
동	3,231	34.3(1.0)	2.9	1,467	33.3(1.3)	3.8	1,764	35.3(1.2)	3.5
읍·면	8,368	35.1(0.7)	2.1	3,844	34.8(0.9)	2.7	4,524	35.4(0.9)	2.4

주 : 1) 생채소 섭취율:(최근 1달(30일) 동안 하루(매일) 1회 이상 생으로 먹는 채소(쌈, 셀러드, 생채소 무침)를 먹은 사람의 수/조사대상 응답자 수)×100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 121〉 비만도 분포 및 비만율

(단위 : %, 평균)

구분	N	비만도 분포[1]						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)[2]			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	평균(표준오차)	변동계수
전체	10,337	5.3(0.3)	5.6	69.8(0.7)	0.9	24.9(0.6)	2.4	23.1(0.0)	0.2
성									
남자	5,067	3.2(0.3)	9.7	67.0(0.9)	1.3	29.8(0.8)	2.7	23.6(0.1)	0.2
여자	5,270	7.6(0.5)	6.7	72.7(0.9)	1.2	19.7(0.7)	3.8	22.6(0.1)	0.2
연령									
19-29	1,013	10.3(1.2)	11.3	70.1(1.7)	2.5	19.5(1.5)	7.8	22.4(0.1)	0.6
30-39	1,546	5.2(0.6)	11.8	68.2(1.4)	2.1	26.6(1.3)	4.9	23.2(0.1)	0.4
40-49	1,918	3.6(0.5)	15.4	70.7(1.4)	1.9	25.7(1.3)	5.1	23.3(0.1)	0.3
50-59	2,400	2.4(0.4)	16.7	69.0(1.3)	1.9	28.6(1.3)	4.6	23.6(0.1)	0.3
60-69	1,748	3.4(0.5)	15.0	70.0(1.4)	2.1	26.6(1.3)	5.0	23.5(0.1)	0.4
70 이상	1,712	8.5(0.7)	8.7	71.3(1.4)	2.0	20.2(1.4)	6.7	22.6(0.1)	0.4
생애주기별									
19-64	7,796	5.0(0.3)	6.6	69.6(0.7)	1.0	25.4(0.7)	2.6	23.2(0.0)	0.2
65 이상	2,541	7.5(0.6)	8.2	70.6(1.2)	1.7	21.9(1.1)	4.9	22.8(0.1)	0.3
교육수준[3]									
무학	908	8.1(1.0)	11.9	67.0(2.0)	3.0	25.0(1.9)	7.6	23.1(0.2)	0.7
초등학교	2,024	5.3(0.6)	10.7	66.7(1.5)	2.3	28.1(1.4)	5.1	23.4(0.1)	0.4
중학교	1,341	4.0(0.7)	16.8	68.6(1.9)	2.8	27.4(1.8)	6.4	23.4(0.1)	0.4
고등학교	3,637	5.1(0.5)	10.4	70.9(1.1)	1.6	24.0(0.9)	3.9	23.0(0.1)	0.3
대학교 이상	2,418	5.5(0.6)	10.1	70.4(1.0)	1.5	24.1(0.9)	3.9	23.1(0.1)	0.3
직업									
전문행정관리	1,021	4.3(0.7)	16.7	70.6(1.6)	2.3	25.1(1.5)	6.0	23.1(0.1)	0.5
사무직	727	5.5(1.1)	19.2	69.6(2.0)	2.8	24.9(1.7)	7.0	23.1(0.1)	0.6
판매·서비스직	1,251	3.8(0.7)	17.4	69.2(1.6)	2.3	27.0(1.6)	5.8	23.5(0.1)	0.5
농림어업	1,793	5.3(0.6)	10.5	70.1(1.3)	1.8	24.6(1.2)	5.0	23.1(0.1)	0.4
기능단순노무직	2,284	4.2(0.6)	14.4	66.1(1.3)	1.9	29.7(1.2)	4.0	23.5(0.1)	0.3
기타[4]	3,259	7.2(0.6)	8.6	72.3(1.1)	1.6	20.5(1.0)	4.8	22.7(0.1)	0.3
월 가구소득									
100만원 이하	1,642	8.7(0.8)	8.8	69.1(1.5)	2.1	22.2(1.2)	5.5	22.7(0.1)	0.4
101-200만원	1,755	6.6(0.9)	13.5	67.4(1.5)	2.2	26.0(1.4)	5.5	23.1(0.1)	0.5
201-300만원	1,829	4.8(0.6)	11.8	66.9(1.6)	2.4	28.3(1.5)	5.4	23.3(0.1)	0.4
301-400만원	1,624	3.9(0.6)	15.2	71.4(1.4)	2.0	24.7(1.3)	5.4	23.2(0.1)	0.4
401만원 이상	2,990	4.8(0.5)	11.5	71.2(1.1)	1.6	24.0(1.0)	4.2	23.1(0.1)	0.3
거주유형									
동	3,147	5.1(0.5)	8.8	71.7(1.0)	1.3	23.2(0.9)	3.7	23.0(0.1)	0.2
읍·면	7,190	5.7(0.3)	5.4	66.7(0.7)	1.1	27.6(0.7)	2.5	23.3(0.0)	0.2

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 비만율 : (체질량지수(kg/㎡) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 122〉 주관적 비만인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,593	37.8(0.7)	1.7	5,311	33.7(0.9)	2.7	6,282	41.8(0.8)	2.0
연령									
19-29	1,035	37.6(1.7)	4.6	471	35.3(2.4)	6.9	564	40.2(2.2)	5.3
30-39	1,600	45.8(1.4)	3.1	757	43.8(2.0)	4.6	843	48.0(1.9)	4.1
40-49	1,957	41.0(1.5)	3.5	965	35.6(2.1)	5.8	992	46.9(1.9)	4.1
50-59	2,481	40.3(1.3)	3.3	1,179	34.1(1.7)	5.0	1,302	46.8(1.9)	4.1
60-69	1,933	33.3(1.6)	4.8	896	25.9(2.0)	7.8	1,037	39.4(2.1)	5.3
70 이상	2,587	20.9(1.1)	5.4	1,043	15.6(1.5)	9.3	1,544	24.6(1.5)	6.2
생애주기별									
19-64	8,055	40.8(0.8)	1.8	3,845	36.4(1.0)	2.8	4,210	45.5(1.0)	2.1
65 이상	3,538	23.5(1.0)	4.4	1,466	18.0(1.4)	7.5	2,072	27.4(1.3)	4.8
교육수준[2]									
무학	1,704	24.8(1.5)	6.0	328	11.4(2.1)	18.7	1,376	28.0(1.7)	6.2
초등학교	2,306	33.5(1.3)	4.0	972	23.4(1.8)	7.8	1,334	40.6(1.8)	4.4
중학교	1,388	38.8(1.8)	4.5	684	29.4(2.2)	7.4	704	46.8(2.6)	5.6
고등학교	3,729	39.7(1.1)	2.8	1,925	34.0(1.5)	4.4	1,804	46.2(1.4)	3.0
대학교 이상	2,456	40.4(1.1)	2.8	1,399	39.6(1.5)	3.7	1,057	41.5(1.7)	4.0
직업									
전문행정관리	1,038	43.4(1.9)	4.3	545	43.3(2.6)	6.0	493	43.5(2.6)	6.1
사무직	741	43.8(2.2)	4.9	382	44.6(3.0)	6.7	359	42.7(3.3)	7.6
판매·서비스직	1,293	45.7(2.0)	4.4	423	41.7(3.0)	7.2	870	48.1(2.5)	5.2
농림어업	2,098	26.2(1.1)	4.1	1,203	19.4(1.3)	6.5	895	37.3(2.0)	5.4
기능단순노무직	2,411	37.2(1.4)	3.8	1,586	36.4(1.7)	4.8	825	39.4(2.3)	5.9
기타[3]	4,010	34.4(1.0)	2.8	1,171	22.6(1.7)	7.6	2,839	40.3(1.2)	3.0
월 가구소득									
100만원 이하	2,296	25.0(1.2)	4.9	864	16.4(1.7)	10.1	1,432	30.8(1.6)	5.3
101-200만원	1,951	34.2(1.5)	4.5	897	29.3(2.2)	7.5	1,054	38.7(2.0)	5.2
201-300만원	1,926	41.7(1.5)	3.6	939	35.9(2.1)	5.7	987	48.1(2.0)	4.1
301-400만원	1,697	40.8(1.6)	3.9	830	34.9(2.1)	5.9	867	47.1(2.1)	4.5
401만원 이상	3,084	40.9(1.2)	3.0	1,504	38.8(1.7)	4.3	1,580	43.1(1.6)	3.6
거주유형									
동	3,230	38.8(1.0)	2.6	1,467	34.5(1.4)	4.0	1,763	42.9(1.3)	2.9
읍·면	8,363	36.3(0.7)	1.9	3,844	32.7(1.0)	3.1	4,519	40.1(0.8)	2.0

주 : 1) 주관적 비만인지율 : ("약간 비만" 또는 "매우 비만"이라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 123〉 체중조절 시도율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	55.6(0.7)	1.3	5,312	48.7(1.0)	2.0	6,286	62.5(0.9)	1.4
연령									
19-29	1,036	66.4(1.8)	2.8	471	58.4(2.7)	4.6	565	75.7(2.2)	2.9
30-39	1,601	67.8(1.5)	2.1	758	59.1(2.2)	3.7	843	77.1(1.6)	2.1
40-49	1,956	60.3(1.4)	2.3	964	50.2(1.9)	3.9	992	71.2(1.9)	2.7
50-59	2,481	55.5(1.4)	2.5	1,179	46.0(1.8)	4.0	1,302	65.6(1.7)	2.7
60-69	1,934	45.2(1.6)	3.5	896	38.0(2.4)	6.4	1,038	51.1(2.1)	4.1
70 이상	2,590	24.4(1.3)	5.4	1,044	24.9(2.0)	7.9	1,546	24.1(1.6)	6.6
생애주기별									
19-64	8,057	61.2(0.8)	1.3	3,845	52.3(1.1)	2.1	4,212	70.8(0.9)	1.3
65 이상	3,541	29.3(1.2)	4.1	1,467	27.7(1.7)	6.2	2,074	30.5(1.4)	4.7
교육수준[2]									
무학	1,706	23.0(1.4)	6.3	328	17.3(2.8)	16.4	1,378	24.4(1.6)	6.6
초등학교	2,307	40.0(1.5)	3.7	973	27.6(2.2)	7.8	1,334	48.8(1.8)	3.7
중학교	1,390	52.2(2.0)	3.8	684	39.6(2.5)	6.4	706	62.9(2.5)	4.0
고등학교	3,727	60.0(1.1)	1.8	1,924	48.8(1.4)	2.9	1,803	72.9(1.4)	1.9
대학교 이상	2,458	66.3(1.2)	1.8	1,400	59.9(1.6)	2.7	1,058	75.5(1.7)	2.2
직업									
전문행정관리	1,038	72.1(1.7)	2.4	545	67.6(2.7)	3.9	493	77.3(2.2)	2.8
사무직	742	68.5(2.1)	3.1	382	64.4(3.1)	4.8	360	74.0(2.8)	3.8
판매·서비스직	1,294	66.4(1.7)	2.6	423	57.9(2.9)	5.0	871	71.4(1.9)	2.7
농림어업	2,099	28.2(1.3)	4.5	1,204	22.4(1.4)	6.4	895	37.6(1.9)	5.1
기능단순노무직	2,410	49.7(1.3)	2.7	1,585	46.0(1.5)	3.4	825	59.3(2.2)	3.8
기타[3]	4,013	53.0(1.2)	2.2	1,172	43.0(2.1)	4.8	2,841	58.0(1.4)	2.3
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	31.3(1.5)	4.8	864	27.2(2.4)	8.9	1,434	34.1(1.8)	5.2
101-200만원	1,953	48.3(1.9)	4.0	898	40.5(2.6)	6.3	1,055	55.5(2.2)	4.0
201-300만원	1,925	54.7(1.6)	2.9	938	47.9(2.3)	4.9	987	62.2(2.0)	3.2
301-400만원	1,697	59.5(1.6)	2.7	831	48.9(2.2)	4.5	866	71.0(2.1)	2.9
401만원 이상	3,086	66.2(1.2)	1.8	1,504	58.8(1.7)	2.9	1,582	74.2(1.4)	1.9
거주유형									
동	3,230	61.3(1.1)	1.7	1,466	53.3(1.5)	2.8	1,764	69.0(1.3)	1.9
읍·면	8,368	47.4(0.8)	1.6	3,846	42.3(1.1)	2.5	4,522	52.7(1.0)	1.8

주 : 1) 체중조절 시도율 : (최근 1년(365일) 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 124〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	34.8(0.6)	1.8	5,313	34.1(0.8)	2.5	6,287	35.5(0.8)	2.2
연령									
19-29	1,036	18.2(1.4)	7.8	471	17.9(2.0)	11.4	565	18.5(1.8)	9.9
30-39	1,603	21.0(1.2)	5.9	758	21.8(1.8)	8.0	845	20.2(1.5)	7.7
40-49	1,957	28.5(1.2)	4.4	965	31.0(1.8)	5.9	992	25.9(1.7)	6.7
50-59	2,481	39.5(1.5)	3.9	1,179	41.5(2.1)	5.0	1,302	37.4(1.9)	5.1
60-69	1,934	50.5(1.7)	3.4	896	48.0(2.3)	4.8	1,038	52.5(2.2)	4.2
70 이상	2,589	66.9(1.3)	2.0	1,044	63.9(2.1)	3.4	1,545	69.0(1.6)	2.3
생애주기별									
19-64	8,060	28.9(0.7)	2.3	3,846	29.7(0.9)	3.0	4,214	28.0(0.9)	3.1
65 이상	3,540	62.6(1.3)	2.1	1,467	59.6(1.8)	3.0	2,073	64.8(1.5)	2.3
교육수준[2]									
무학	1,705	68.3(1.6)	2.3	328	64.4(3.6)	5.6	1,377	69.3(1.7)	2.4
초등학교	2,307	55.7(1.4)	2.5	973	58.4(1.9)	3.3	1,334	53.9(1.9)	3.5
중학교	1,390	43.3(1.7)	4.0	684	49.6(2.5)	5.1	706	38.0(2.5)	6.5
고등학교	3,730	28.8(1.0)	3.4	1,925	31.8(1.3)	4.1	1,805	25.4(1.3)	5.2
대학교 이상	2,458	21.9(1.0)	4.8	1,400	23.0(1.4)	6.1	1,058	20.4(1.5)	7.4
직업									
전문행정관리	1,038	21.1(1.6)	7.4	545	22.9(2.2)	9.6	493	18.9(2.0)	10.6
사무직	742	21.2(1.6)	7.3	382	21.2(2.3)	11.0	360	21.2(2.5)	12.0
판매·서비스직	1,294	30.4(1.7)	5.6	423	29.7(3.0)	10.2	871	30.9(2.0)	6.5
농림어업	2,099	49.6(1.3)	2.7	1,204	47.9(1.6)	3.4	895	52.3(1.9)	3.6
기능단순노무직	2,411	37.0(1.2)	3.2	1,586	34.9(1.4)	3.9	825	42.4(2.2)	5.3
기타[3]	4,014	39.8(1.1)	2.9	1,172	40.7(1.9)	4.7	2,842	39.4(1.3)	3.3
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	62.1(1.4)	2.2	864	57.1(2.2)	3.9	1,434	65.5(1.7)	2.5
101-200만원	1,953	41.9(1.6)	3.9	898	41.9(2.3)	5.5	1,055	41.9(2.0)	4.9
201-300만원	1,927	33.1(1.4)	4.1	939	35.4(1.8)	5.2	988	30.5(1.9)	6.3
301-400만원	1,698	32.9(1.5)	4.5	831	32.1(2.1)	6.4	867	33.8(2.1)	6.2
401만원 이상	3,085	24.4(1.1)	4.6	1,504	25.3(1.4)	5.6	1,581	23.5(1.4)	6.0
거주유형									
동	3,231	31.2(0.9)	3.0	1,467	30.7(1.3)	4.1	1,764	31.7(1.2)	3.7
읍·면	8,369	40.1(0.7)	1.9	3,846	38.9(1.0)	2.6	4,523	41.3(0.9)	2.1

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : ("나쁨" 또는 "매우 나쁨"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 125〉 저작불편호소율(≥65)[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,540	51.6(1.3)	2.5	1,467	46.5(1.7)	3.7	2,073	55.2(1.6)	2.8
교육수준[2]									
무학	1,516	63.1(1.6)	2.6	277	65.6(3.7)	5.6	1,239	62.6(1.8)	2.8
초등학교	1,202	50.9(2.0)	3.8	579	51.2(2.6)	5.1	623	50.7(2.9)	5.6
중학교	331	36.2(3.5)	9.7	211	35.4(4.0)	11.2	120	37.1(6.0)	16.2
고등학교	343	40.4(3.4)	8.5	275	43.3(3.9)	9.0	68	29.3(7.6)	25.8
대학교 이상	148	25.5(4.7)	18.4	125	24.2(5.0)	20.7	23	35.6(13.4)	37.7
월 가구소득									
100만원 이하	1,761	57.9(1.6)	2.7	637	52.0(2.7)	5.1	1,124	61.4(1.9)	3.1
101-200만원	790	46.7(2.5)	5.4	385	47.4(3.0)	6.4	405	46.2(3.4)	7.4
201-300만원	333	43.0(3.5)	8.1	168	40.0(5.1)	12.7	165	46.0(5.0)	10.9
301-400만원	204	45.6(4.8)	10.6	99	35.0(5.2)	14.8	105	53.8(6.6)	12.4
401만원 이상	242	43.3(4.6)	10.6	107	36.3(5.9)	16.2	135	48.8(5.9)	12.2
거주유형									
동	570	49.2(2.6)	5.2	228	40.4(3.6)	8.8	342	55.1(3.1)	5.7
읍·면	2,970	53.4(1.1)	2.1	1,239	50.8(1.6)	3.1	1,731	55.4(1.4)	2.5

주 : 1) 저작불편호소율 : ("매우 불편" 또는 "불편"에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 126〉 발음불편호소율(≥65)[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,540	23.7(1.0)	4.4	1,467	22.9(1.5)	6.5	2,073	24.2(1.2)	4.9
교육수준[2]									
무학	1,516	30.3(1.6)	5.2	277	37.5(4.1)	11.0	1,239	28.8(1.6)	5.6
초등학교	1,202	24.8(1.6)	6.3	579	26.4(2.1)	8.0	623	23.4(2.1)	9.0
중학교	331	13.4(2.8)	20.7	211	18.2(4.0)	22.0	120	7.5(3.2)	42.8
고등학교	343	13.8(2.3)	16.6	275	16.5(2.8)	17.0	68	3.5(1.6)	45.3
대학교 이상	148	8.7(2.9)	33.4	125	8.9(3.2)	35.7	23	7.1(5.3)	75.1
월 가구소득									
100만원 이하	1,761	28.7(1.3)	4.6	637	29.7(2.3)	7.8	1,124	28.2(1.6)	5.5
101-200만원	790	17.7(1.9)	10.9	385	15.8(2.5)	15.7	405	19.3(2.6)	13.6
201-300만원	333	20.6(3.5)	16.9	168	20.5(5.1)	25.0	165	20.6(4.1)	19.9
301-400만원	204	20.3(3.3)	16.2	99	20.2(4.3)	21.2	105	20.4(4.5)	22.3
401만원 이상	242	17.1(3.2)	18.5	107	15.5(4.2)	27.0	135	18.3(3.7)	20.3
거주유형									
동	570	21.6(2.1)	9.8	228	22.7(3.1)	13.7	342	20.9(2.3)	10.8
읍·면	2,970	25.2(0.9)	3.6	1,239	23.1(1.3)	5.7	1,731	26.7(1.1)	4.2

주 : 1) 발음불편호소율 : ("매우 불편" 또는 "불편"에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 127〉 치아 결손 형태(≥65)[1]

(단위 : %)

구분	N	위아래 치아 모두 빠졌다		위쪽 치아만 빠졌다		아래쪽 치아만 빠졌다		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	3,541	23.8(0.9)	4.0	8.3(0.5)	6.4	3.9(0.5)	11.6	64.0(1.1)	1.8
성									
남자	1,467	23.3(1.6)	6.7	8.1(0.8)	10.0	4.2(0.7)	16.2	64.4(1.8)	2.8
여자	2,074	24.1(1.1)	4.6	8.5(0.7)	8.6	3.7(0.6)	15.9	63.7(1.3)	2.0
교육수준[2]									
무학	1,517	31.6(1.6)	4.9	10.1(0.9)	9.3	4.1(0.7)	16.3	54.2(1.7)	3.1
초등학교	1,202	22.4(1.5)	6.9	8.8(1.0)	10.9	5.0(0.9)	17.4	63.8(1.9)	3.1
중학교	331	11.6(2.4)	20.4	4.4(1.1)	25.4	2.6(1.0)	39.4	81.4(2.8)	3.5
고등학교	343	16.6(2.6)	15.5	7.2(1.5)	20.7	2.3(0.9)	40.8	73.8(3.4)	4.7
대학교 이상	148	12.9(4.3)	33.3	2.3(1.2)	52.5	1.9(1.9)	99.0	83.0(4.6)	5.6
월 가구소득									
100만원 이하	1,761	26.2(1.3)	5.1	9.8(0.8)	7.7	5.7(0.8)	13.6	58.3(1.4)	2.5
101-200만원	790	19.3(1.9)	9.7	6.3(1.1)	17.5	1.8(0.4)	22.9	72.6(2.2)	3.0
201-300만원	333	27.2(3.2)	11.9	7.7(1.6)	20.6	4.3(2.0)	47.3	60.8(3.7)	6.2
301-400만원	204	20.2(3.9)	19.1	7.9(2.5)	31.5	0.6(0.4)	71.0	71.4(4.3)	6.0
401만원 이상	242	21.5(3.2)	14.7	6.1(1.9)	31.1	2.7(1.3)	47.8	69.6(3.8)	5.4
거주유형									
동	570	20.6(1.8)	8.7	5.9(0.9)	15.4	4.2(0.9)	21.4	69.3(2.3)	3.3
읍·면	2,971	26.1(0.9)	3.6	10.2(0.6)	6.2	3.7(0.4)	11.5	60.0(1.0)	1.7

주 : 1) 치아 결손 형태 : (치아 결손 형태별 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 128〉 틀니 이용 행태(≥65)[1]

(단위 : %)

구분	N	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	3,541	39.8(1.1)	2.9	9.0(0.7)	8.2	5.3(0.5)	9.8	45.8(1.1)	2.4
성									
남자	1,467	38.6(1.7)	4.4	7.7(0.9)	11.7	2.9(0.5)	17.6	50.9(1.7)	3.4
여자	2,074	40.7(1.4)	3.4	10.0(1.0)	9.9	7.0(0.8)	11.6	42.2(1.4)	3.2
교육수준[2]									
무학	1,517	47.9(1.5)	3.2	9.1(1.0)	10.8	5.7(0.9)	15.7	37.4(1.6)	4.2
초등학교	1,202	40.2(2.1)	5.2	9.7(1.2)	12.7	5.4(0.8)	14.4	44.7(2.0)	4.5
중학교	331	27.0(3.3)	12.3	11.5(2.8)	24.4	4.8(1.6)	34.2	56.7(3.6)	6.3
고등학교	343	32.9(3.7)	11.3	6.5(2.0)	31.1	4.3(1.6)	36.6	56.3(3.5)	6.1
대학교 이상	148	18.4(3.4)	18.3	5.6(1.8)	32.6	4.4(1.9)	44.0	71.6(4.2)	5.9
월 가구소득									
100만원 이하	1,761	44.8(1.6)	3.5	8.8(0.8)	9.1	4.5(0.6)	13.3	41.9(1.5)	3.5
101-200만원	790	32.6(2.2)	6.9	11.1(2.1)	19.1	6.6(1.3)	19.6	49.7(2.5)	5.0
201-300만원	333	42.3(4.1)	9.6	8.0(1.7)	21.9	5.0(1.8)	35.9	44.7(3.6)	8.1
301-400만원	204	34.0(4.7)	13.7	6.8(2.3)	34.2	6.3(2.3)	36.8	52.8(4.9)	9.3
401만원 이상	242	34.9(4.2)	12.1	6.0(1.8)	29.9	5.5(1.8)	32.7	53.6(4.9)	9.2
거주유형									
동	570	36.6(2.2)	6.1	9.1(1.5)	16.7	5.8(1.1)	18.3	48.5(2.3)	4.7
읍·면	2,971	42.2(1.1)	2.6	9.0(0.6)	7.2	4.9(0.4)	8.9	43.9(1.0)	2.2

주 : 1) 틀니 이용 행태 : (틀니 이용 행태별 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 129〉 주관적 틀니 필요 인지율(≥65)[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,577	16.5(1.1)	6.5	728	15.4(1.7)	10.9	849	17.5(1.3)	7.4
교육수준[2]									
무학	539	26.3(2.0)	7.7	95	27.1(5.9)	21.9	444	26.1(2.1)	8.0
초등학교	540	15.4(1.8)	11.6	267	21.3(2.8)	13.3	273	10.0(2.1)	20.5
중학교	189	11.6(2.3)	20.1	123	13.6(3.6)	26.7	66	8.7(1.9)	22.3
고등학교	202	8.8(2.5)	28.5	151	10.9(3.4)	30.9	51	3.7(2.6)	70.3
대학교 이상	107	4.0(2.2)	56.0	92	4.0(2.4)	60.7	15	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 이하	706	23.4(1.7)	7.2	275	24.7(3.1)	12.4	431	22.6(2.1)	9.2
101-200만원	398	11.7(1.6)	13.8	203	11.0(2.1)	19.5	195	12.5(2.1)	16.9
201-300만원	160	9.7(3.4)	35.4	92	10.5(5.1)	48.2	68	8.7(4.0)	46.0
301~400만원	102	13.8(3.8)	27.3	54	10.1(5.2)	52.1	48	18.1(5.5)	30.5
401만원 이상	119	8.9(2.0)	22.5	66	7.0(3.1)	44.2	53	10.7(2.3)	21.4
거주유형									
동	278	13.4(1.8)	13.7	120	11.3(2.9)	25.3	158	15.1(2.2)	14.9
읍·면	1,299	19.0(1.2)	6.3	608	18.4(2.0)	10.8	691	19.6(1.4)	7.2

주 : 1) 주관적 틀니 필요 인지율 : (현재 틀니가 필요하다고 생각하는 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 중 틀니 미착용자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

〈표 130〉 점심식사 후 칫솔질 실천율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,497	62.7(0.7)	1.1	5,273	57.2(1.0)	1.7	6,224	68.2(0.8)	1.1
연령									
19-29	1,026	73.2(1.7)	2.3	466	63.4(2.6)	4.1	560	84.7(1.7)	2.0
30-39	1,585	71.6(1.4)	2.0	752	62.8(2.0)	3.2	833	81.1(1.6)	1.9
40-49	1,932	66.3(1.4)	2.1	956	58.6(1.9)	3.2	976	74.7(1.8)	2.5
50-59	2,458	60.3(1.4)	2.3	1,168	54.6(1.9)	3.5	1,290	66.3(1.7)	2.6
60-69	1,922	53.4(1.4)	2.6	891	53.0(2.0)	3.8	1,031	53.6(2.0)	3.7
70 이상	2,574	41.2(1.5)	3.6	1,040	42.0(2.3)	5.4	1,534	40.6(1.8)	4.3
생애주기별									
19-64	7,980	66.6(0.8)	1.1	3,813	59.3(1.1)	1.9	4,167	74.5(0.8)	1.1
65 이상	3,517	44.3(1.2)	2.8	1,460	45.1(1.8)	4.1	2,057	43.7(1.5)	3.5
교육수준[2]									
무학	1,693	38.5(1.8)	4.6	327	36.3(3.7)	10.3	1,366	39.1(1.9)	5.0
초등학교	2,296	48.8(1.5)	3.0	968	41.6(2.2)	5.3	1,328	53.9(1.7)	3.2
중학교	1,379	57.2(1.7)	3.0	678	50.9(2.4)	4.8	701	62.7(2.5)	4.0
고등학교	3,677	64.5(1.1)	1.7	1,903	54.8(1.5)	2.8	1,774	75.7(1.2)	1.6
대학교 이상	2,443	74.4(1.1)	1.5	1,394	68.0(1.6)	2.4	1,049	83.7(1.4)	1.6
직업									
전문행정관리	1,033	80.3(1.6)	2.0	544	72.1(2.6)	3.6	489	89.9(1.6)	1.8
사무직	735	81.0(2.0)	2.5	379	75.2(3.1)	4.1	356	89.0(1.8)	2.0
판매·서비스직	1,281	65.0(1.8)	2.7	420	58.5(3.1)	5.2	861	68.8(2.0)	2.9
농림어업	2,090	42.3(1.4)	3.2	1,200	40.3(1.8)	4.4	890	45.5(1.8)	4.0
기능단순노무직	2,384	58.5(1.3)	2.2	1,568	53.0(1.5)	2.9	816	72.5(1.9)	2.7
기타[3]	3,972	58.5(1.2)	2.0	1,161	53.7(2.0)	3.7	2,811	60.9(1.3)	2.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,282	45.6(1.5)	3.3	857	43.6(2.3)	5.4	1,425	47.0(1.8)	3.8
101-200만원	1,939	60.4(1.6)	2.7	895	54.7(2.3)	4.2	1,044	65.7(2.1)	3.2
201-300만원	1,909	61.6(1.6)	2.6	933	55.6(2.2)	4.0	976	68.2(2.0)	2.9
301-400만원	1,680	64.0(1.8)	2.8	823	57.6(2.3)	4.0	857	71.1(2.2)	3.0
401만원 이상	3,063	69.3(1.1)	1.5	1,495	62.2(1.6)	2.5	1,568	76.9(1.2)	1.6
거주유형									
동	3,199	66.7(1.0)	1.6	1,454	60.5(1.5)	2.5	1,745	72.7(1.1)	1.5
읍·면	8,298	56.8(0.7)	1.3	3,819	52.6(1.0)	1.9	4,479	61.3(0.8)	1.4

주 : 1) 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 점심식사 한 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 131〉 구강검진 수진율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,593	34.3(0.7)	2.2	5,308	36.2(1.0)	2.8	6,285	32.4(0.9)	2.6
연령									
19-29	1,036	31.3(1.8)	5.7	471	31.7(2.6)	8.2	565	30.8(2.3)	7.5
30-39	1,601	39.9(1.6)	4.1	757	44.3(2.2)	5.0	844	35.2(2.0)	5.6
40-49	1,957	42.2(1.6)	3.9	965	43.4(2.1)	4.9	992	41.0(2.1)	5.1
50-59	2,477	38.1(1.5)	3.9	1,176	36.8(2.1)	5.7	1,301	39.4(1.9)	4.8
60-69	1,934	27.8(1.6)	5.6	896	29.6(2.3)	7.7	1,038	26.3(2.0)	7.8
70 이상	2,588	16.7(1.4)	8.2	1,043	19.7(2.0)	10.2	1,545	14.7(1.6)	10.9
생애주기별									
19-64	8,054	37.5(0.8)	2.2	3,842	38.5(1.1)	3.0	4,212	36.4(1.0)	2.7
65 이상	3,539	19.3(1.2)	6.1	1,466	22.7(1.6)	7.1	2,073	17.0(1.4)	8.2
교육수준[2]									
무학	1,705	13.0(1.5)	11.4	327	15.2(4.0)	26.3	1,378	12.4(1.6)	12.6
초등학교	2,305	24.3(1.4)	6.0	972	22.6(1.9)	8.3	1,333	25.5(1.8)	7.2
중학교	1,388	30.1(1.6)	5.2	683	26.3(2.1)	7.9	705	33.3(2.1)	6.2
고등학교	3,730	34.0(1.0)	3.0	1,925	32.6(1.4)	4.3	1,805	35.6(1.5)	4.2
대학교 이상	2,455	46.0(1.4)	3.1	1,398	48.8(1.7)	3.5	1,057	41.9(1.9)	4.4
직업									
전문행정관리	1,036	49.0(1.9)	4.0	544	49.7(2.6)	5.3	492	48.2(2.7)	5.5
사무직	742	53.3(2.6)	4.8	382	58.6(3.1)	5.3	360	46.2(3.3)	7.1
판매·서비스직	1,291	34.3(1.9)	5.7	421	32.0(3.2)	10.1	870	35.7(2.2)	6.3
농림어업	2,099	18.7(1.2)	6.3	1,204	19.4(1.4)	7.2	895	17.6(1.6)	9.3
기능단순노무직	2,410	39.3(1.4)	3.6	1,585	38.5(1.6)	4.2	825	41.3(2.4)	5.7
기타[3]	4,013	24.5(1.0)	4.0	1,171	24.6(1.9)	7.7	2,842	24.4(1.1)	4.6
월 가구소득									
100만원 이하	2,296	17.9(1.3)	7.2	863	20.5(2.2)	10.7	1,433	16.1(1.5)	9.1
101-200만원	1,952	28.8(1.6)	5.6	897	28.2(2.1)	7.4	1,055	29.3(2.0)	6.9
201-300만원	1,924	31.0(1.5)	4.9	937	34.7(2.1)	6.0	987	27.0(1.9)	7.1
301-400만원	1,698	34.5(1.7)	4.8	831	35.6(2.2)	6.2	867	33.3(2.1)	6.4
401만원 이상	3,086	44.5(1.4)	3.2	1,504	46.2(1.8)	3.9	1,582	42.8(1.7)	4.0
거주유형									
동	3,228	38.7(1.1)	2.8	1,466	40.4(1.5)	3.8	1,762	37.0(1.3)	3.5
읍·면	8,365	27.9(0.9)	3.1	3,842	30.3(1.2)	3.8	4,523	25.4(0.9)	3.6

주 : 1) 구강검진 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 132〉 연간 스케일링 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,592	27.5(0.6)	2.3	5,309	27.8(0.8)	2.9	6,283	27.3(0.8)	3.0
연령									
19-29	1,034	25.8(1.5)	6.0	469	21.2(2.1)	9.9	565	31.2(2.2)	6.9
30-39	1,603	32.8(1.4)	4.2	758	34.2(1.8)	5.3	845	31.3(2.0)	6.5
40-49	1,955	34.9(1.7)	4.8	963	33.5(2.0)	5.9	992	36.3(2.2)	6.2
50-59	2,481	32.0(1.3)	4.1	1,179	32.4(1.8)	5.7	1,302	31.5(1.8)	5.6
60-69	1,933	22.8(1.6)	6.9	896	24.3(2.1)	8.6	1,037	21.6(2.0)	9.3
70 이상	2,586	7.0(0.7)	10.5	1,044	10.0(1.4)	13.9	1,542	4.9(0.8)	16.1
생애주기별									
19-64	8,056	31.1(0.7)	2.3	3,842	30.3(0.9)	3.0	4,214	32.0(1.0)	3.0
65 이상	3,536	10.6(0.9)	8.9	1,467	13.0(1.4)	10.4	2,069	8.9(1.0)	11.0
교육수준[2]									
무학	1,701	4.7(0.7)	14.4	328	6.6(2.0)	30.4	1,373	4.2(0.7)	15.6
초등학교	2,307	17.2(1.2)	7.1	973	17.8(1.9)	10.4	1,334	16.9(1.6)	9.4
중학교	1,390	26.2(1.7)	6.5	684	22.1(1.9)	8.8	706	29.8(2.4)	8.0
고등학교	3,728	28.6(1.0)	3.4	1,923	25.4(1.3)	5.0	1,805	32.3(1.4)	4.5
대학교 이상	2,456	37.0(1.3)	3.5	1,398	36.8(1.5)	4.2	1,058	37.4(1.8)	4.9
직업									
전문행정관리	1,038	40.6(2.1)	5.2	545	41.4(2.8)	6.7	493	39.7(2.8)	7.1
사무직	742	36.8(2.3)	6.2	382	37.4(3.2)	8.5	360	35.9(3.1)	8.5
판매·서비스직	1,293	31.6(1.6)	5.2	422	29.0(2.5)	8.7	871	33.1(2.1)	6.4
농림어업	2,099	19.6(1.1)	5.5	1,204	20.9(1.4)	6.6	895	17.5(1.4)	7.9
기능단순노무직	2,407	28.3(1.3)	4.5	1,583	27.9(1.5)	5.2	824	29.3(2.3)	7.7
기타[3]	4,011	20.1(0.9)	4.5	1,172	17.8(1.6)	9.0	2,839	21.3(1.1)	5.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,296	10.9(1.0)	9.1	864	11.2(1.6)	14.5	1,432	10.6(1.2)	11.1
101-200만원	1,952	21.4(1.3)	6.1	898	20.6(1.9)	9.1	1,054	22.1(1.6)	7.1
201-300만원	1,926	26.7(1.3)	4.7	938	25.2(1.7)	6.8	988	28.4(1.8)	6.5
301-400만원	1,696	31.0(1.6)	5.2	829	32.7(2.1)	6.4	867	29.3(2.0)	6.8
401만원 이상	3,085	34.3(1.2)	3.4	1,503	34.1(1.4)	4.1	1,582	34.4(1.6)	4.5
거주유형									
동	3,231	29.0(1.0)	3.4	1,467	28.6(1.3)	4.4	1,764	29.5(1.3)	4.3
읍·면	8,361	25.3(0.6)	2.5	3,842	26.6(0.8)	3.1	4,519	23.9(0.8)	3.3

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 133〉 치실 및 치간솔 이용률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,589	22.0(0.6)	2.7	5,313	17.3(0.6)	3.7	6,276	26.7(0.8)	3.1
연령									
19-29	1,036	18.5(1.6)	8.7	471	12.7(2.0)	15.5	565	25.2(2.4)	9.5
30-39	1,603	27.8(1.4)	5.1	758	20.6(1.7)	8.5	845	35.4(1.9)	5.5
40-49	1,957	30.6(1.4)	4.5	965	23.4(1.7)	7.3	992	38.4(2.1)	5.5
50-59	2,481	24.9(1.2)	4.9	1,179	18.4(1.4)	7.8	1,302	31.6(1.7)	5.5
60-69	1,933	15.7(1.2)	7.8	896	14.0(1.7)	12.3	1,037	17.1(1.8)	10.4
70 이상	2,579	5.0(0.8)	15.2	1,044	7.9(1.5)	18.8	1,535	3.0(0.7)	21.8
생애주기별									
19-64	8,060	25.2(0.7)	2.8	3,846	18.7(0.7)	3.9	4,214	32.1(1.0)	3.1
65 이상	3,529	7.1(0.7)	10.3	1,467	9.2(1.2)	13.3	2,062	5.6(0.8)	13.4
교육수준[2]									
무학	1,696	1.7(0.5)	29.1	328	0.8(0.6)	71.8	1,368	2.0(0.6)	31.2
초등학교	2,305	9.7(1.0)	10.2	973	6.3(1.1)	17.6	1,332	12.2(1.4)	11.9
중학교	1,390	19.0(1.6)	8.2	684	11.2(1.5)	13.5	706	25.7(2.4)	9.5
고등학교	3,730	24.6(1.0)	4.1	1,925	16.2(1.0)	5.9	1,805	34.3(1.4)	4.2
대학교 이상	2,458	30.1(1.2)	4.0	1,400	24.9(1.3)	5.3	1,058	37.7(1.8)	4.8
직업									
전문행정관리	1,038	32.2(1.8)	5.7	545	28.6(2.1)	7.4	493	36.5(2.8)	7.7
사무직	742	27.7(2.3)	8.2	382	24.8(2.9)	11.6	360	31.8(3.1)	9.9
판매·서비스직	1,294	26.1(1.6)	6.2	423	19.9(2.3)	11.7	871	29.7(2.0)	6.7
농림어업	2,098	11.7(0.8)	6.8	1,204	10.4(1.0)	10.0	894	13.7(1.2)	8.9
기능단순노무직	2,410	19.3(1.1)	5.6	1,586	16.7(1.2)	7.2	824	25.9(2.2)	8.3
기타[3]	4,005	19.6(0.9)	4.8	1,172	10.2(1.2)	11.4	2,833	24.3(1.2)	4.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,292	7.4(0.8)	11.1	864	6.0(1.0)	17.3	1,428	8.4(1.1)	12.8
101-200만원	1,951	17.5(1.3)	7.3	898	13.9(1.6)	11.3	1,053	20.7(1.8)	8.8
201-300만원	1,926	21.2(1.5)	6.9	939	16.1(1.6)	10.0	987	26.7(2.0)	7.4
301-400만원	1,697	25.5(1.5)	5.8	831	19.0(1.7)	9.1	866	32.7(2.0)	6.0
401만원 이상	3,086	27.7(1.1)	3.8	1,504	21.3(1.2)	5.5	1,582	34.6(1.5)	4.2
거주유형									
동	3,230	24.0(0.9)	3.9	1,467	17.9(0.9)	5.3	1,763	29.8(1.3)	4.3
읍·면	8,359	19.2(0.6)	3.0	3,846	16.5(0.8)	4.6	4,513	21.9(0.7)	3.4

주 : 1) 치실 및 치간솔 이용률 : (치실(floss) 혹은 치간솔을 사용하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 134〉 무자격자 치과시술률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	10.4(0.4)	3.5	5,311	8.2(0.4)	5.0	6,287	12.6(0.5)	4.0
연령									
19-29	1,035	0.4(0.1)	31.5	471	0.5(0.2)	32.6	564	0.3(0.2)	70.9
30-39	1,603	1.8(0.4)	23.0	758	1.9(0.6)	31.3	845	1.6(0.5)	31.4
40-49	1,957	4.0(0.5)	12.5	965	4.1(0.7)	17.6	992	3.9(0.7)	17.6
50-59	2,481	10.9(0.8)	7.1	1,179	9.4(1.0)	11.0	1,302	12.4(1.1)	9.0
60-69	1,934	23.9(1.5)	6.2	896	19.5(1.9)	9.8	1,038	27.6(1.9)	6.9
70 이상	2,588	34.9(1.3)	3.7	1,042	29.1(1.9)	6.4	1,546	39.0(1.6)	4.1
생애주기별									
19-64	8,059	5.5(0.3)	5.4	3,846	4.9(0.4)	7.6	4,213	6.2(0.4)	6.9
65 이상	3,539	33.4(1.1)	3.3	1,465	27.6(1.5)	5.4	2,074	37.5(1.4)	3.8
교육수준[2]									
무학	1,706	37.6(1.6)	4.2	328	34.1(3.4)	9.8	1,378	38.5(1.7)	4.5
초등학교	2,305	27.2(1.3)	4.6	971	25.8(1.8)	7.1	1,334	28.2(1.8)	6.3
중학교	1,390	14.8(1.1)	7.6	684	15.5(1.7)	11.2	706	14.2(1.6)	11.0
고등학교	3,729	4.8(0.4)	8.1	1,925	5.4(0.5)	9.6	1,804	4.2(0.5)	13.1
대학교 이상	2,458	1.8(0.3)	16.1	1,400	2.3(0.4)	19.5	1,058	1.2(0.3)	23.3
직업									
전문행정관리	1,038	1.9(0.4)	21.3	545	1.8(0.6)	31.5	493	2.1(0.6)	30.2
사무직	742	2.5(0.5)	21.7	382	2.8(0.8)	29.0	360	2.0(0.6)	31.4
판매·서비스직	1,294	8.3(0.9)	10.6	423	7.8(1.5)	19.7	871	8.5(1.1)	12.5
농림어업	2,098	22.8(1.1)	4.8	1,203	19.2(1.3)	7.0	895	28.6(1.7)	5.9
기능단순노무직	2,411	9.7(0.7)	7.0	1,586	7.0(0.7)	9.7	825	16.4(1.5)	9.0
기타[3]	4,013	13.9(0.7)	5.2	1,171	11.3(1.0)	9.2	2,842	15.1(0.9)	5.6
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	31.4(1.2)	3.8	863	24.4(1.7)	6.8	1,434	36.1(1.5)	4.2
101-200만원	1,953	15.3(1.1)	7.3	898	12.1(1.2)	10.2	1,055	18.3(1.6)	8.7
201-300만원	1,927	8.4(0.7)	8.4	939	7.9(0.9)	11.9	988	8.9(0.9)	10.5
301-400만원	1,697	6.4(0.7)	10.8	830	5.7(0.9)	15.1	867	7.2(1.1)	15.5
401만원 이상	3,086	4.7(0.4)	8.5	1,504	4.3(0.5)	12.4	1,582	5.2(0.5)	10.1
거주유형									
동	3,231	7.7(0.5)	6.9	1,467	5.7(0.6)	10.4	1,764	9.6(0.7)	7.7
읍·면	8,367	14.5(0.4)	2.9	3,844	11.8(0.5)	4.4	4,523	17.2(0.6)	3.4

주 : 1) 무자격자 치과시술률 : (치과가 아닌 곳에서 무자격자에 의한 치과시술(야매)을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 135〉 치과진료 미치료율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	23.5(0.6)	2.4	5,313	21.8(0.8)	3.6	6,287	25.2(0.7)	2.9
연령									
19-29	1,036	21.4(1.5)	7.0	471	19.1(2.0)	10.7	565	24.1(1.9)	7.9
30-39	1,603	26.4(1.4)	5.2	758	26.2(1.9)	7.2	845	26.7(1.8)	6.7
40-49	1,957	23.7(1.1)	4.7	965	22.3(1.6)	7.2	992	25.2(1.8)	7.3
50-59	2,481	23.0(1.1)	5.0	1,179	21.9(1.6)	7.5	1,302	24.3(1.6)	6.6
60-69	1,934	21.6(1.4)	6.6	896	17.7(1.7)	9.7	1,038	24.9(1.9)	7.5
70 이상	2,589	24.0(1.1)	4.7	1,044	20.9(1.6)	7.8	1,545	26.1(1.4)	5.5
생애주기별									
19-64	8,060	23.6(0.7)	2.8	3,846	22.2(0.9)	4.0	4,214	25.1(0.9)	3.4
65 이상	3,540	22.8(0.9)	4.1	1,467	19.1(1.2)	6.4	2,073	25.5(1.2)	4.8
교육수준[2]									
무학	1,705	30.6(1.5)	5.0	328	28.0(3.2)	11.3	1,377	31.3(1.6)	5.2
초등학교	2,307	26.1(1.4)	5.2	973	25.0(2.0)	7.9	1,334	26.8(1.7)	6.3
중학교	1,390	24.0(1.6)	6.6	684	25.2(2.1)	8.5	706	23.0(2.2)	9.7
고등학교	3,730	23.3(0.9)	4.0	1,925	21.4(1.2)	5.7	1,805	25.4(1.3)	5.1
대학교 이상	2,458	20.6(1.0)	4.7	1,400	19.8(1.2)	6.2	1,058	21.7(1.4)	6.6
직업									
전문행정관리	1,038	21.5(1.5)	6.8	545	19.7(2.1)	10.7	493	23.6(2.1)	9.1
사무직	742	20.0(1.8)	9.1	382	21.8(2.7)	12.2	360	17.5(2.1)	11.9
판매·서비스직	1,294	26.2(1.5)	5.9	423	24.9(2.8)	11.2	871	27.0(2.0)	7.3
농림어업	2,099	23.2(1.2)	5.2	1,204	22.0(1.5)	7.0	895	25.0(1.6)	6.3
기능단순노무직	2,411	25.9(1.2)	4.6	1,586	24.0(1.4)	5.8	825	30.8(2.2)	7.0
기타[3]	4,014	22.5(0.9)	3.8	1,172	18.2(1.3)	7.3	2,842	24.6(1.0)	4.2
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	31.0(1.3)	4.1	864	25.5(1.8)	7.1	1,434	34.8(1.7)	4.8
101-200만원	1,953	23.7(1.4)	5.7	898	22.3(1.9)	8.4	1,055	24.9(1.7)	6.8
201-300만원	1,927	26.5(1.3)	4.9	939	26.2(1.8)	6.9	988	26.8(1.7)	6.5
301-400만원	1,698	22.8(1.4)	6.2	831	21.2(1.9)	9.0	867	24.5(1.8)	7.4
401만원 이상	3,086	20.0(1.0)	4.8	1,504	18.6(1.2)	6.2	1,582	21.4(1.4)	6.7
거주유형									
동	3,231	22.5(0.8)	3.7	1,467	20.6(1.2)	5.8	1,764	24.4(1.1)	4.3
읍·면	8,369	24.9(0.7)	2.8	3,846	23.4(0.8)	3.5	4,523	26.5(0.9)	3.3

주 : 1) 치과진료 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 136〉 치과진료 미치료자의 미치료 이유[1]

(단위 : %)

구분	N	경제적인 이유로		치과병의원이 너무 멀어서		직장이나 학교를 비울 수 없어서		거동이 불편해서 혹은 건강문제 때문에		아이를 봐줄 사람이 없어서		다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서		치과진료를 받기가 무서워서		기 타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	2,703	28.5(1.2)	4.2	1.7(0.3)	15.1	30.7(1.2)	4.0	2.8(0.4)	13.2	3.0(0.5)	15.5	18.0(0.9)	5.3	10.7(0.8)	7.6	4.6(0.5)	9.8
성																	
남자	1,140	26.3(1.7)	6.5	1.4(0.4)	27.7	38.5(1.9)	5.0	1.5(0.4)	27.5	0.2(0.1)	45.4	21.4(1.5)	6.9	6.5(1.1)	16.4	4.1(0.7)	16.8
여자	1,563	30.3(1.6)	5.2	2.0(0.3)	15.8	24.0(1.6)	6.6	3.9(0.6)	14.9	5.4(0.9)	16.1	15.0(1.3)	8.6	14.4(1.2)	8.4	5.1(0.6)	12.4
연령																	
19-29	241	12.8(2.7)	21.5	0.4(0.2)	45.1	39.4(3.5)	8.9	1.2(0.9)	76.4	6.5(2.0)	30.2	20.4(3.1)	15.3	9.1(2.0)	21.5	10.2(2.1)	20.8
30-39	411	18.0(2.1)	11.5	0.4(0.2)	41.0	42.3(3.0)	7.2	1.5(0.8)	53.0	7.4(1.4)	19.4	14.3(2.1)	14.9	12.3(2.1)	16.7	3.8(0.9)	24.4
40-49	450	18.7(2.4)	12.8	0.5(0.2)	40.6	38.4(3.2)	8.2	0.5(0.3)	63.9	0.9(0.6)	70.6	19.7(2.5)	12.5	17.4(2.5)	14.6	3.9(0.7)	19.3
50-59	572	30.8(2.7)	8.6	3.2(1.1)	35.5	27.8(2.6)	9.4	1.4(0.3)	24.3	0.7(0.4)	52.3	24.3(2.3)	9.5	7.8(1.4)	17.8	4.0(0.8)	21.0
60-69	404	47.7(3.2)	6.7	2.7(0.6)	20.5	16.8(2.4)	14.3	3.2(1.2)	38.8	0.6(0.1)	19.6	15.7(2.0)	12.8	9.6(1.6)	17.1	3.7(0.7)	19.6
70 이상	625	61.5(2.5)	4.0	4.4(0.7)	17.1	4.3(0.8)	17.8	12.4(1.8)	14.9	0.2(0.0)	5.3	10.2(1.4)	13.3	4.7(1.1)	24.1	2.2(0.5)	23.7
생애주기별																	
19-64	1,880	22.2(1.2)	5.4	1.1(0.3)	24.7	35.8(1.4)	4.0	1.2(0.3)	24.6	3.5(0.6)	15.6	19.4(1.1)	5.7	11.7(1.0)	8.1	4.9(0.5)	10.8
65 이상	823	58.7(2.1)	3.6	4.6(0.6)	14.0	6.0(0.8)	12.9	10.2(1.4)	13.9	0.2(0.1)	27.7	11.1(1.3)	11.5	6.0(1.0)	16.8	3.2(0.5)	16.5
교육수준[2]																	
무학	502	61.1(3.0)	4.9	4.7(1.3)	26.7	6.0(1.4)	23.7	11.9(2.0)	16.4	0.2(0.2)	71.6	7.0(1.3)	18.9	6.7(1.4)	20.8	2.3(0.5)	23.8
초등학교	545	50.1(2.9)	5.9	3.5(0.6)	17.3	15.7(1.9)	12.3	4.8(1.1)	23.6	0.9(0.4)	45.2	15.6(1.7)	10.6	6.0(1.1)	18.7	3.5(0.7)	19.9
중학교	293	32.7(3.2)	9.9	1.2(0.7)	56.5	25.2(3.2)	12.9	3.1(1.1)	35.8	1.6(1.1)	64.1	20.0(2.6)	13.0	10.6(2.6)	24.7	5.5(1.3)	23.1
고등학교	855	23.7(1.8)	7.7	1.2(0.4)	35.6	33.4(2.0)	5.9	0.6(0.3)	54.2	3.1(0.7)	23.8	20.6(1.8)	8.6	12.7(1.4)	10.6	4.7(0.9)	19.0
대학교 이상	508	9.1(1.5)	16.0	0.5(0.2)	33.6	47.0(2.5)	5.4	1.1(0.6)	57.7	5.5(1.2)	22.2	19.0(2.1)	11.2	12.0(1.7)	14.5	5.8(1.0)	17.1
직업																	
전문행정관리	226	6.1(1.8)	29.2	0.2(0.1)	74.0	62.1(4.1)	6.7	1.0(1.0)	100.4	1.1(0.2)	22.3	16.7(2.9)	17.5	9.8(2.2)	22.2	3.0(1.8)	59.4
사무직	154	10.7(3.3)	30.3	0.8(0.5)	58.1	50.9(5.1)	10.1	0.0(0.0)	.	1.1(0.8)	74.4	17.3(3.9)	22.5	13.4(3.7)	27.5	5.7(1.9)	33.2
판매·서비스직	315	18.7(2.6)	14.0	0.4(0.2)	60.8	44.2(3.6)	8.2	0.0(0.0)	.	0.6(0.4)	70.7	21.4(2.6)	12.2	11.4(2.7)	23.4	3.4(1.1)	31.2
농림어업	442	35.5(2.7)	7.5	8.2(1.5)	18.9	21.7(2.3)	10.8	1.0(0.4)	44.8	0.3(0.2)	71.1	21.3(2.2)	10.3	6.8(1.5)	22.7	5.3(1.4)	25.8
기능단순노무직	621	30.7(2.4)	7.7	1.4(0.6)	44.3	36.4(2.5)	6.8	0.5(0.3)	58.0	0.4(0.3)	90.9	17.0(2.0)	11.5	8.4(1.8)	21.0	5.2(0.9)	17.7
기타[3]	944	41.3(2.2)	5.2	1.7(0.4)	27.1	6.6(1.2)	18.6	7.6(1.0)	13.6	8.0(1.3)	16.5	16.9(1.6)	9.5	13.1(1.3)	10.0	4.9(0.7)	14.3
월 가구소득																	
100만원 이하	702	59.5(2.3)	3.8	4.2(0.9)	21.1	8.2(1.3)	16.4	8.4(1.4)	16.7	0.5(0.2)	44.6	11.6(1.3)	11.5	4.3(0.9)	21.7	3.4(0.6)	16.9
101-200만원	426	42.7(3.5)	8.3	1.9(0.5)	27.3	23.6(2.6)	11.0	3.1(0.7)	22.6	3.0(1.3)	44.4	16.4(2.4)	14.6	6.0(1.3)	21.8	3.3(1.1)	32.7
201-300만원	473	23.6(2.9)	12.3	1.2(0.4)	32.9	33.8(2.9)	8.6	3.2(1.0)	33.0	6.7(1.6)	24.0	19.0(2.4)	12.8	6.7(1.6)	24.3	5.8(1.1)	19.2
301-400만원	374	22.6(2.9)	13.0	1.0(0.4)	43.5	32.1(3.0)	9.4	0.1(0.1)	100.2	3.3(1.0)	31.5	20.8(2.4)	11.7	16.1(2.2)	14.0	4.0(1.2)	29.1
401만원 이상	615	12.1(1.6)	13.3	1.0(0.5)	51.1	42.3(2.4)	5.7	1.0(0.5)	47.8	2.1(0.7)	31.7	19.4(2.1)	10.7	16.3(1.8)	10.7	5.9(1.0)	16.9
거주유형																	
동	746	28.9(1.9)	6.5	0.6(0.3)	57.6	30.6(1.9)	6.3	2.6(0.6)	22.0	3.6(0.7)	20.6	17.7(1.4)	7.9	12.2(1.3)	10.7	3.8(0.7)	17.2
읍·면	1,957	27.8(1.3)	4.5	3.2(0.4)	12.1	30.9(1.3)	4.2	3.0(0.4)	13.2	2.1(0.4)	19.4	18.3(1.2)	6.4	8.8(0.8)	8.7	5.7(0.6)	10.7

주 : 1) 치과진료 미치료자의 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 치과진료를 받지 못한 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 137〉 주관적 잇몸건강 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,573	67.7(0.6)	0.9	5,293	68.1(0.9)	1.3	6,280	67.2(0.8)	1.3
연령									
19-29	1,036	71.2(1.8)	2.5	471	71.2(2.5)	3.4	565	71.2(2.3)	3.2
30-39	1,602	69.0(1.3)	1.9	757	68.4(1.7)	2.5	845	69.7(1.9)	2.7
40-49	1,956	67.2(1.5)	2.2	964	65.1(1.9)	3.0	992	69.5(2.0)	2.9
50-59	2,476	66.6(1.3)	2.0	1,176	65.8(1.9)	2.8	1,300	67.4(1.8)	2.7
60-69	1,931	68.7(1.5)	2.2	893	71.4(2.0)	2.8	1,038	66.5(2.0)	3.1
70 이상	2,572	62.6(1.5)	2.3	1,032	70.1(2.0)	2.8	1,540	57.3(1.8)	3.1
생애주기별									
19-64	8,051	68.4(0.7)	1.0	3,839	67.6(1.0)	1.4	4,212	69.2(1.0)	1.4
65 이상	3,522	64.4(1.2)	1.9	1,454	71.2(1.6)	2.3	2,068	59.6(1.5)	2.6
교육수준[2]									
무학	1,698	56.4(1.8)	3.1	324	59.1(3.8)	6.4	1,374	55.8(1.9)	3.4
초등학교	2,299	64.4(1.3)	2.0	967	65.5(1.9)	3.0	1,332	63.7(1.8)	2.8
중학교	1,388	63.3(1.8)	2.9	683	63.0(2.5)	3.9	705	63.5(2.6)	4.0
고등학교	3,725	69.0(1.0)	1.4	1,920	67.5(1.4)	2.1	1,805	70.6(1.5)	2.1
대학교 이상	2,453	71.9(1.1)	1.6	1,396	71.8(1.5)	2.1	1,057	72.1(1.6)	2.2
직업									
전문행정관리	1,036	71.5(1.7)	2.4	543	68.2(2.4)	3.6	493	75.3(2.4)	3.2
사무직	741	71.4(2.0)	2.8	381	71.6(2.7)	3.7	360	71.2(3.0)	4.2
판매·서비스직	1,293	67.2(1.8)	2.7	423	64.8(3.0)	4.6	870	68.7(2.3)	3.3
농림어업	2,096	66.4(1.4)	2.2	1,201	69.6(1.7)	2.4	895	61.2(2.0)	3.3
기능단순노무직	2,409	64.6(1.2)	1.9	1,584	65.4(1.4)	2.2	825	62.8(2.1)	3.3
기타[3]	3,996	67.9(1.0)	1.5	1,160	71.5(1.8)	2.6	2,836	66.2(1.2)	1.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,290	60.2(1.5)	2.4	858	65.9(2.1)	3.3	1,432	56.4(1.7)	3.1
101-200만원	1,948	65.8(1.5)	2.2	895	68.5(2.2)	3.2	1,053	63.2(1.9)	3.0
201-300만원	1,922	66.0(1.4)	2.1	935	66.0(2.0)	3.0	987	66.1(2.0)	3.0
301-400만원	1,695	67.8(1.6)	2.4	828	68.8(2.2)	3.3	867	66.8(2.1)	3.2
401만원 이상	3,081	71.7(1.1)	1.5	1,501	69.9(1.5)	2.1	1,580	73.8(1.5)	2.0
거주유형									
동	3,225	67.6(0.9)	1.4	1,462	67.8(1.4)	2.0	1,763	67.4(1.3)	1.9
읍·면	8,348	67.8(0.7)	1.0	3,831	68.6(0.9)	1.3	4,517	66.9(0.9)	1.3

주 : 1) 주관적 잇몸건강 인지율 : ('정상이다'에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 138〉 하루 평균 수면시간[1]

(단위 : %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	시간(표준오차)	변동계수
전체	11,589	44.9(0.6)	1.4	51.5(0.6)	1.2	3.6(0.2)	6.3	6.6(0.0)	0.2
성									
남자	5,310	45.3(0.9)	1.9	51.3(0.9)	1.7	3.4(0.3)	9.1	6.7(0.0)	0.3
여자	6,279	44.5(1.0)	2.1	51.6(1.0)	1.8	3.9(0.4)	9.2	6.6(0.0)	0.3
연령									
19-29	1,036	34.7(1.8)	5.2	58.1(1.9)	3.3	7.2(0.9)	12.1	7.0(0.0)	0.6
30-39	1,603	40.0(1.5)	3.7	57.5(1.5)	2.6	2.5(0.5)	17.8	6.7(0.0)	0.5
40-49	1,957	46.4(1.6)	3.3	51.9(1.5)	3.0	1.8(0.3)	18.0	6.6(0.0)	0.5
50-59	2,479	52.0(1.3)	2.5	46.3(1.3)	2.8	1.8(0.3)	17.0	6.5(0.0)	0.4
60-69	1,932	48.4(1.5)	3.0	48.4(1.5)	3.1	3.3(0.5)	16.6	6.5(0.0)	0.6
70 이상	2,582	49.2(1.4)	2.8	44.0(1.4)	3.1	6.8(0.6)	9.4	6.5(0.0)	0.7
생애주기별									
19-64	8,056	44.0(0.7)	1.7	52.9(0.7)	1.4	3.1(0.2)	7.8	6.7(0.0)	0.2
65 이상	3,533	49.1(1.2)	2.4	44.9(1.1)	2.6	6.0(0.5)	9.0	6.5(0.0)	0.5
교육수준[2]									
무학	1,698	52.9(1.7)	3.3	42.1(1.7)	4.0	5.0(0.5)	10.6	6.4(0.0)	0.7
초등학교	2,304	48.4(1.5)	3.0	47.0(1.4)	2.9	4.6(0.5)	11.3	6.5(0.0)	0.6
중학교	1,389	49.9(1.9)	3.8	47.2(1.9)	4.0	2.9(0.5)	18.4	6.5(0.0)	0.7
고등학교	3,730	41.4(1.1)	2.6	54.1(1.0)	1.9	4.6(0.5)	10.1	6.8(0.0)	0.4
대학교 이상	2,458	44.0(1.3)	2.9	54.0(1.3)	2.3	1.9(0.3)	16.9	6.7(0.0)	0.4
직업									
전문행정관리	1,038	44.8(2.0)	4.4	53.1(1.9)	3.7	2.1(0.5)	25.3	6.6(0.0)	0.6
사무직	742	48.7(2.6)	5.3	50.1(2.6)	5.2	1.3(0.5)	36.7	6.6(0.1)	0.8
판매·서비스직	1,294	49.4(1.7)	3.5	47.9(1.7)	3.5	2.6(0.5)	19.6	6.6(0.0)	0.6
농림어업	2,095	43.2(1.2)	2.8	52.7(1.3)	2.4	4.2(0.5)	11.7	6.7(0.0)	0.5
기능단순노무직	2,411	46.8(1.3)	2.8	50.6(1.3)	2.6	2.6(0.4)	15.9	6.6(0.0)	0.4
기타[3]	4,007	41.4(1.1)	2.6	52.9(1.1)	2.0	5.8(0.6)	9.6	6.7(0.0)	0.4
월 가구소득									
100만원 이하	2,292	50.5(1.3)	2.6	44.5(1.3)	3.0	5.0(0.6)	11.8	6.4(0.0)	0.6
101-200만원	1,953	46.5(1.7)	3.6	49.7(1.7)	3.4	3.8(0.5)	13.2	6.6(0.0)	0.6
201-300만원	1,927	42.1(1.6)	3.8	53.5(1.6)	3.0	4.4(0.6)	14.1	6.7(0.0)	0.5
301-400만원	1,698	43.3(1.6)	3.6	52.9(1.6)	3.0	3.8(0.6)	14.5	6.7(0.0)	0.5
401만원 이상	3,084	44.8(1.1)	2.5	52.7(1.1)	2.1	2.5(0.4)	15.2	6.7(0.0)	0.4
거주유형									
동	3,231	46.8(0.9)	2.0	50.1(0.9)	1.9	3.1(0.3)	10.8	6.6(0.0)	0.3
읍·면	8,358	42.1(0.7)	1.6	53.6(0.7)	1.3	4.4(0.3)	6.3	6.7(0.0)	0.3

주 : 1) 하루 평균 수면시간 : 수면시간의 총 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 139〉 스트레스 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,578	28.9(0.6)	2.2	5,303	28.6(0.9)	3.0	6,275	29.2(0.8)	2.9
연령									
19-29	1,036	31.2(1.8)	5.9	471	27.5(2.4)	8.6	565	35.6(2.6)	7.3
30-39	1,602	33.6(1.6)	4.8	757	34.5(2.1)	6.0	845	32.6(2.2)	6.7
40-49	1,957	29.7(1.4)	4.9	965	34.8(2.1)	6.0	992	24.3(1.8)	7.3
50-59	2,481	27.9(1.3)	4.5	1,179	28.9(1.7)	6.0	1,302	26.8(1.7)	6.3
60-69	1,930	23.7(1.4)	6.1	894	17.6(1.6)	9.2	1,036	28.8(2.2)	7.5
70 이상	2,572	23.5(1.2)	5.0	1,037	16.4(1.6)	9.7	1,535	28.4(1.5)	5.2
생애주기별									
19-64	8,057	30.0(0.7)	2.4	3,843	30.6(1.0)	3.2	4,214	29.4(1.0)	3.2
65 이상	3,521	23.6(1.0)	4.1	1,460	16.8(1.3)	7.8	2,061	28.3(1.3)	4.6
교육수준[2]									
무학	1,690	29.7(1.4)	4.7	323	23.5(3.1)	13.2	1,367	31.1(1.6)	5.1
초등학교	2,303	27.8(1.4)	5.0	971	23.2(1.8)	7.9	1,332	31.1(1.9)	6.2
중학교	1,389	26.8(1.7)	6.5	683	24.3(2.0)	8.1	706	29.0(2.6)	8.9
고등학교	3,729	26.8(1.1)	4.0	1,924	27.3(1.5)	5.4	1,805	26.3(1.3)	4.9
대학교 이상	2,457	32.4(1.2)	3.6	1,399	33.3(1.5)	4.5	1,058	31.2(1.9)	6.2
직업									
전문행정관리	1,038	34.7(1.8)	5.1	545	36.3(2.3)	6.3	493	32.7(2.7)	8.2
사무직	742	34.8(2.1)	6.0	382	35.4(3.2)	9.0	360	33.9(3.1)	9.1
판매·서비스직	1,294	30.7(1.5)	5.0	423	32.1(2.7)	8.4	871	29.8(1.9)	6.2
농림어업	2,097	22.4(1.1)	4.9	1,203	16.1(1.2)	7.5	894	32.5(1.7)	5.4
기능단순노무직	2,409	29.4(1.3)	4.5	1,585	30.2(1.5)	5.0	824	27.4(2.0)	7.4
기타[3]	3,996	25.8(1.0)	3.9	1,164	22.8(1.8)	7.9	2,832	27.3(1.1)	4.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,285	28.6(1.3)	4.6	859	21.8(1.8)	8.3	1,426	33.2(1.7)	5.0
101-200만원	1,950	29.1(1.4)	4.9	897	25.6(2.0)	7.8	1,053	32.4(2.1)	6.5
201-300만원	1,925	26.3(1.5)	5.5	939	24.1(2.0)	8.4	986	28.6(1.8)	6.4
301-400만원	1,697	28.9(1.6)	5.5	830	30.6(2.1)	6.8	867	27.1(1.9)	6.9
401만원 이상	3,085	30.5(1.2)	4.1	1,503	33.1(1.6)	4.7	1,582	27.7(1.7)	6.0
거주유형									
동	3,230	30.1(1.0)	3.3	1,466	30.7(1.4)	4.4	1,764	29.5(1.3)	4.3
읍·면	8,348	27.1(0.6)	2.2	3,837	25.6(0.8)	3.1	4,511	28.7(0.8)	2.9

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느낀다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 140〉 우울감 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,595	6.9(0.3)	4.9	5,309	4.3(0.4)	8.5	6,286	9.5(0.5)	5.7
연령									
19-29	1,036	7.2(1.0)	13.7	471	4.6(1.2)	27.0	565	10.3(1.5)	14.6
30-39	1,603	5.8(0.8)	14.3	758	3.8(0.6)	16.9	845	7.9(1.5)	19.5
40-49	1,957	7.0(0.7)	10.4	965	4.7(0.8)	17.4	992	9.6(1.2)	12.5
50-59	2,481	6.9(0.7)	10.3	1,179	3.1(0.6)	18.5	1,302	10.8(1.3)	11.7
60-69	1,932	6.4(0.8)	13.2	894	4.9(1.0)	20.3	1,038	7.7(1.1)	14.8
70 이상	2,586	8.2(0.8)	9.7	1,042	5.6(1.1)	20.2	1,544	10.1(1.0)	10.1
생애주기별									
19-64	8,059	6.6(0.4)	5.7	3,845	4.1(0.4)	9.7	4,214	9.4(0.6)	6.8
65 이상	3,536	8.1(0.7)	8.5	1,464	5.7(0.9)	16.6	2,072	9.8(0.9)	9.0
교육수준[2]									
무학	1,701	10.3(1.1)	10.5	325	5.7(1.5)	26.2	1,376	11.4(1.3)	11.3
초등학교	2,307	9.0(0.8)	9.3	973	7.6(1.3)	17.2	1,334	10.0(1.1)	11.3
중학교	1,390	9.6(1.1)	11.2	684	4.5(0.9)	19.6	706	13.9(1.8)	12.9
고등학교	3,729	6.5(0.6)	9.3	1,924	4.3(0.6)	14.9	1,805	9.2(1.0)	10.9
대학교 이상	2,458	4.6(0.6)	11.9	1,400	3.2(0.6)	18.2	1,058	6.7(1.0)	15.1
직업									
전문행정관리	1,038	6.0(1.0)	16.3	545	2.9(0.7)	23.7	493	9.6(1.9)	19.6
사무직	742	4.1(0.8)	18.9	382	2.1(0.7)	33.3	360	6.8(1.5)	21.9
판매·서비스직	1,294	8.5(1.0)	11.5	423	4.6(1.5)	31.5	871	10.8(1.5)	13.7
농림어업	2,097	4.6(0.5)	11.9	1,203	2.7(0.6)	20.7	894	7.7(1.1)	14.4
기능단순노무직	2,410	6.0(0.6)	10.7	1,586	4.4(0.6)	14.6	824	10.0(1.5)	14.9
기타[3]	4,012	8.6(0.6)	6.6	1,169	6.6(1.0)	15.7	2,843	9.5(0.7)	7.4
월 가구소득									
100만원 이하	2,292	11.8(1.1)	9.1	860	7.5(1.2)	16.1	1,432	14.7(1.5)	10.3
101-200만원	1,953	7.9(0.8)	10.7	898	5.6(1.0)	18.4	1,055	9.9(1.3)	13.4
201-300만원	1,927	6.0(0.6)	10.1	939	3.3(0.7)	21.3	988	8.9(1.0)	11.6
301-400만원	1,698	6.1(0.8)	13.4	831	4.3(1.1)	24.9	867	8.2(1.2)	14.7
401만원 이상	3,086	6.2(0.7)	10.8	1,504	3.7(0.6)	17.0	1,582	8.8(1.1)	12.2
거주유형									
동	3,230	8.1(0.5)	6.5	1,466	4.8(0.6)	12.0	1,764	11.2(0.8)	7.4
읍·면	8,365	5.1(0.3)	5.6	3,843	3.5(0.3)	8.7	4,522	6.8(0.5)	7.2

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 141〉 자살생각률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,591	11.2(0.4)	3.7	5,308	8.2(0.5)	6.6	6,283	14.2(0.6)	4.0
연령									
19-29	1,035	6.9(1.0)	14.6	470	5.5(1.3)	23.5	565	8.6(1.4)	16.5
30-39	1,603	7.5(0.7)	9.8	758	5.7(0.9)	15.1	845	9.5(1.2)	12.8
40-49	1,954	10.1(1.0)	9.5	963	8.1(1.2)	14.5	991	12.3(1.4)	11.7
50-59	2,480	11.4(0.9)	7.5	1,179	8.9(1.1)	12.1	1,301	14.0(1.3)	9.2
60-69	1,934	14.0(1.0)	7.4	896	9.3(1.3)	14.0	1,038	17.8(1.5)	8.2
70 이상	2,585	21.5(1.3)	5.8	1,042	15.4(1.7)	11.2	1,543	25.8(1.7)	6.4
생애주기별									
19-64	8,055	9.4(0.4)	4.7	3,843	7.2(0.6)	8.0	4,212	11.7(0.6)	5.6
65 이상	3,536	19.8(1.0)	5.1	1,465	13.7(1.3)	9.7	2,071	24.1(1.3)	5.5
교육수준[2]									
무학	1,701	26.1(1.6)	6.0	326	21.2(3.1)	14.6	1,375	27.2(1.7)	6.4
초등학교	2,304	18.3(1.1)	6.0	972	15.6(1.9)	12.1	1,332	20.2(1.5)	7.2
중학교	1,390	15.8(1.2)	7.8	684	12.8(1.7)	13.1	706	18.3(2.0)	10.8
고등학교	3,730	8.5(0.6)	6.6	1,925	6.6(0.8)	11.5	1,805	10.7(0.9)	8.3
대학교 이상	2,456	6.2(0.7)	10.9	1,398	5.6(0.8)	14.5	1,058	7.1(1.0)	13.4
직업									
전문행정관리	1,037	6.6(0.9)	13.3	544	7.1(1.3)	17.6	493	6.0(1.3)	21.2
사무직	742	5.2(0.9)	17.1	382	1.9(0.7)	37.2	360	9.7(1.7)	17.9
판매·서비스직	1,294	12.1(1.2)	9.8	423	9.4(1.9)	20.2	871	13.6(1.5)	11.0
농림어업	2,096	11.7(0.8)	7.0	1,203	7.2(0.8)	10.9	893	19.1(1.6)	8.2
기능단순노무직	2,408	10.1(0.9)	8.5	1,585	8.5(1.0)	11.2	823	14.0(1.7)	11.9
기타[3]	4,012	14.8(0.7)	4.9	1,170	11.0(1.3)	11.5	2,842	16.7(0.8)	5.0
월 가구소득									
100만원 이하	2,294	23.1(1.3)	5.4	862	15.5(1.6)	10.4	1,432	28.3(1.6)	5.7
101-200만원	1,952	14.0(1.0)	7.0	897	11.0(1.3)	11.9	1,055	16.8(1.5)	8.9
201-300만원	1,925	10.4(0.9)	8.8	939	8.7(1.3)	14.5	986	12.1(1.2)	9.8
301-400만원	1,697	9.3(1.0)	10.8	830	7.7(1.5)	19.0	867	11.1(1.4)	12.3
401만원 이상	3,084	7.7(0.6)	8.3	1,503	5.4(0.7)	13.3	1,581	10.1(1.0)	9.8
거주유형									
동	3,229	11.0(0.6)	5.9	1,466	8.3(0.9)	10.3	1,763	13.6(0.9)	6.3
읍·면	8,362	11.5(0.4)	3.4	3,842	7.9(0.4)	5.7	4,520	15.2(0.6)	4.2

주 : 1) 자살생각률 : (최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 142〉 자살시도율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,600	0.4(0.1)	17.5	5,312	0.3(0.1)	34.1	6,288	0.5(0.1)	19.0
연령									
19-29	1,036	0.4(0.2)	67.9	471	0.4(0.4)	99.7	565	0.3(0.1)	53.8
30-39	1,603	0.3(0.1)	38.4	758	0.3(0.2)	70.7	845	0.4(0.2)	42.6
40-49	1,956	0.6(0.2)	34.6	964	0.4(0.2)	51.4	992	0.7(0.3)	46.1
50-59	2,481	0.4(0.1)	33.2	1,179	0.2(0.1)	70.2	1,302	0.5(0.2)	36.6
60-69	1,934	0.6(0.2)	36.3	896	0.6(0.4)	68.1	1,038	0.6(0.2)	32.0
70 이상	2,590	0.2(0.1)	45.4	1,044	0.1(0.1)	100.0	1,546	0.4(0.2)	49.3
생애주기별									
19-64	8,059	0.4(0.1)	20.5	3,845	0.3(0.1)	38.9	4,214	0.5(0.1)	23.1
65 이상	3,541	0.5(0.1)	30.9	1,467	0.4(0.3)	68.8	2,074	0.5(0.1)	28.1
교육수준[2]									
무학	1,706	0.4(0.2)	41.3	328	0.0(0.0)	.	1,378	0.5(0.2)	41.1
초등학교	2,307	0.6(0.1)	15.6	973	0.4(0.1)	23.6	1,334	0.7(0.1)	19.4
중학교	1,390	0.4(0.2)	45.7	684	0.5(0.4)	73.6	706	0.4(0.2)	49.0
고등학교	3,730	0.5(0.1)	29.7	1,925	0.4(0.2)	52.5	1,805	0.5(0.2)	34.3
대학교 이상	2,457	0.2(0.1)	51.6	1,399	0.2(0.1)	73.2	1,058	0.3(0.2)	72.7
직업									
전문행정관리	1,038	0.0(0.0)	100.1	545	0.0(0.0)	.	493	0.1(0.1)	100.1
사무직	742	0.4(0.3)	60.1	382	0.0(0.0)	.	360	1.1(0.6)	60.0
판매·서비스직	1,294	0.1(0.0)	24.3	423	0.0(0.0)	.	871	0.2(0.0)	24.4
농림어업	2,099	0.4(0.1)	28.9	1,204	0.1(0.1)	58.2	895	0.7(0.2)	33.2
기능단순노무직	2,410	0.4(0.1)	34.5	1,585	0.5(0.2)	39.5	825	0.2(0.1)	41.6
기타[3]	4,015	0.7(0.2)	25.6	1,172	0.7(0.4)	59.3	2,843	0.7(0.2)	25.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	1.0(0.3)	25.4	864	0.6(0.4)	71.0	1,434	1.3(0.3)	24.9
101-200만원	1,953	0.7(0.3)	35.0	898	0.9(0.4)	39.0	1,055	0.6(0.4)	64.7
201-300만원	1,927	0.3(0.2)	69.4	939	0.6(0.5)	80.5	988	0.1(0.1)	58.6
301-400만원	1,697	0.2(0.1)	58.6	830	0.3(0.2)	88.6	867	0.2(0.0)	20.5
401만원 이상	3,086	0.2(0.1)	35.5	1,504	0.0(0.0)	.	1,582	0.4(0.2)	35.4
거주유형									
동	3,231	0.4(0.1)	29.4	1,467	0.4(0.2)	49.9	1,764	0.4(0.1)	35.8
읍·면	8,369	0.4(0.1)	14.7	3,845	0.3(0.1)	31.8	4,524	0.6(0.1)	15.1

주 : 1) 자살시도율 : (최근 1년(365일) 동안 실제로 자살시도를 해 본적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 143〉 정신상담률

(단위 : %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률[1]			우울증상으로 인한 정신상담률[2]			자살생각으로 인한 정신상담률[3]			자살시도로 인한 정신상담률[4]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,138	6.9(0.6)	8.5	716	12.9(1.2)	9.2	1,504	8.5(0.9)	10.9	55	25.6(7.2)	28.3
성												
남자	1,333	5.3(0.8)	15.8	223	12.6(2.3)	18.6	499	6.9(1.5)	22.1	18	-(-)	-
여자	1,805	8.4(0.9)	10.5	493	13.1(1.4)	10.8	1,005	9.3(1.1)	11.3	37	32.6(7.1)	21.9
연령												
19-29	319	4.3(1.3)	29.1	65	11.9(3.5)	29.0	64	8.2(3.2)	39.1	3	-(-)	-
30-39	515	5.2(1.3)	24.2	90	9.6(3.2)	32.9	131	13.6(3.6)	26.6	7	-(-)	-
40-49	578	5.9(1.3)	22.2	115	8.6(2.2)	25.2	188	6.9(2.3)	33.8	8	-(-)	-
50-59	653	9.2(1.4)	15.4	159	12.0(2.0)	16.8	292	10.7(2.3)	21.8	16	-(-)	-
60-69	474	11.0(2.0)	18.4	115	21.3(4.6)	21.6	279	9.6(2.5)	26.1	13	-(-)	-
70 이상	599	9.1(1.9)	20.6	172	19.3(2.9)	15.1	550	4.6(1.4)	31.2	8	-(-)	-
생애주기별												
19-64	2,308	6.2(0.6)	9.9	482	10.4(1.2)	11.9	806	9.1(1.3)	13.8	36	22.3(8.9)	40.1
65 이상	830	10.9(1.8)	16.2	234	22.7(3.0)	13.4	698	7.0(1.2)	16.8	19	-(-)	-
교육수준[5]												
무학	496	7.5(1.3)	16.9	143	16.5(3.8)	23.0	462	5.4(1.9)	34.9	10	-(-)	-
초등학교	589	11.5(1.9)	16.6	158	14.6(3.0)	20.9	362	7.3(1.8)	24.7	12	-(-)	-
중학교	341	7.8(1.6)	20.1	96	10.1(1.9)	18.3	190	7.2(2.0)	27.7	8	-(-)	-
고등학교	981	4.6(0.7)	15.5	212	13.5(2.3)	17.4	342	11.0(2.3)	21.2	20	36.6(16.3)	44.6
대학교 이상	727	7.3(1.2)	16.9	105	10.4(2.2)	21.0	147	10.0(2.6)	26.2	5	-(-)	-
직업												
전문행정관리	336	10.7(2.0)	18.7	57	7.4(3.4)	45.6	76	11.6(4.4)	38.1	1	-(-)	-
사무직	236	7.0(1.9)	27.9	32	8.7(1.5)	17.4	41	13.9(5.2)	37.2	4	-(-)	-
판매·서비스직	400	6.5(1.4)	20.9	88	10.1(2.8)	27.7	156	11.2(3.3)	29.6	3	-(-)	-
농림어업	497	7.9(1.1)	13.9	89	17.2(3.2)	18.6	272	6.2(1.4)	23.2	7	-(-)	-
기능단순노무직	662	4.4(1.0)	22.6	128	15.0(2.8)	18.6	248	5.6(1.5)	26.2	13	-(-)	-
기타[6]	1,006	6.8(1.0)	14.9	322	14.4(2.0)	13.8	710	8.5(1.4)	17.0	27	29.8(13.1)	43.9
월 가구소득												
100만원 이하	638	8.3(1.5)	18.4	207	14.0(2.3)	16.3	523	6.9(1.3)	19.1	22	20.1(0.5)	2.3
101-200만원	522	10.7(2.0)	18.3	125	19.1(3.4)	17.8	281	10.6(2.3)	21.6	13	-(-)	-
201-300만원	505	4.7(1.2)	25.0	109	11.3(2.7)	23.4	217	6.1(1.8)	29.5	6	-(-)	-
301-400만원	446	5.5(1.3)	24.2	86	3.6(2.2)	62.9	147	3.6(2.2)	59.3	4	-(-)	-
401만원 이상	865	6.9(1.0)	15.1	163	14.0(2.6)	18.4	251	13.4(2.3)	17.1	8	-(-)	-
거주유형												
동	924	7.5(0.9)	11.9	277	12.0(1.6)	13.1	384	9.3(1.4)	15.5	14	-(-)	-
읍·면	2,214	5.9(0.5)	8.7	439	15.2(1.6)	10.3	1,120	7.3(0.9)	13.0	41	12.0(1.8)	15.3

주 : 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 스트레스를 인지하고 있다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 우울증상이 있다고 응답한 사람의 수) × 100

3) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살 생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수) × 100

4) 자살시도로 인한 정신상담률 : (자살 시도로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 실제로 자살을 시도해 본 적이 있는 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 144〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도[1]

(단위 : %)

구분	N	전혀 없다		한 달에 1번 미만		한 달에 1번 정도		일주일에 1번 정도		거의 매일	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	7,473	90.1(0.5)	0.6	3.6(0.3)	9.1	2.2(0.2)	10.4	2.8(0.3)	9.4	1.3(0.2)	16.8
성											
남자	3,667	88.9(0.7)	0.8	3.7(0.4)	11.8	2.3(0.3)	14.5	3.4(0.4)	11.7	1.7(0.3)	17.7
여자	3,806	91.4(0.6)	0.7	3.5(0.4)	11.9	2.1(0.3)	14.5	2.1(0.3)	14.7	0.8(0.2)	24.7
연령											
19-29	1,028	72.9(1.8)	2.5	8.6(1.0)	11.3	6.2(0.9)	14.6	8.4(1.1)	12.5	3.9(0.9)	22.4
30-39	1,549	88.7(0.9)	1.0	4.7(0.7)	15.0	2.4(0.4)	17.1	3.0(0.4)	14.9	1.2(0.3)	25.9
40-49	1,759	96.1(0.6)	0.6	1.8(0.5)	24.4	1.0(0.3)	26.0	0.8(0.2)	26.3	0.3(0.1)	34.6
50-59	1,601	98.7(0.3)	0.3	0.7(0.2)	33.2	0.2(0.1)	41.1	0.2(0.1)	45.7	0.1(0.1)	52.7
60-69	801	98.8(0.5)	0.5	0.2(0.1)	42.9	0.1(0.1)	58.1	0.3(0.2)	57.3	0.6(0.5)	84.3
70 이상	735	99.6(0.2)	0.2	0.3(0.1)	54.8	0.0(0.0)	100.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	100.2
생애주기별											
19-64	6,385	89.3(0.6)	0.6	3.9(0.4)	9.2	2.4(0.3)	10.5	3.0(0.3)	9.4	1.4(0.2)	16.8
65 이상	1,088	99.5(0.2)	0.2	0.2(0.1)	44.8	0.1(0.0)	71.0	0.2(0.1)	64.8	0.1(0.0)	70.8
교육수준[2]											
무학	435	98.9(0.8)	0.8	0.1(0.1)	100.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(0.8)	76.2
초등학교	815	99.4(0.3)	0.3	0.1(0.1)	59.0	0.3(0.2)	86.0	0.2(0.1)	79.6	0.1(0.1)	66.5
중학교	795	98.1(0.6)	0.6	0.8(0.4)	48.8	0.2(0.2)	73.4	0.4(0.2)	53.4	0.5(0.4)	78.8
고등학교	3,101	87.2(0.9)	1.1	4.4(0.6)	13.6	2.9(0.4)	15.2	3.9(0.5)	12.1	1.7(0.3)	19.4
대학교 이상	2,320	89.5(0.9)	1.0	4.2(0.6)	13.3	2.4(0.3)	14.2	2.8(0.4)	14.9	1.2(0.3)	24.4
직업											
전문행정관리	977	90.3(1.3)	1.4	3.4(0.7)	21.7	2.3(0.6)	25.0	2.5(0.5)	21.7	1.6(0.6)	36.8
사무직	706	88.9(1.3)	1.5	5.8(1.1)	19.3	1.3(0.3)	24.4	3.2(0.8)	24.2	0.7(0.2)	30.0
판매·서비스직	1,020	90.5(1.2)	1.3	3.7(0.7)	19.8	2.4(0.6)	24.5	2.8(0.7)	25.7	0.6(0.2)	35.0
농림어업	930	96.2(0.8)	0.8	1.0(0.4)	37.7	1.4(0.5)	33.6	1.0(0.4)	43.8	0.4(0.2)	58.9
기능단순노무직	1,731	92.1(0.8)	0.9	3.2(0.5)	15.9	1.6(0.4)	24.6	2.0(0.5)	23.1	1.0(0.3)	27.1
기타[3]	2,107	87.3(1.0)	1.1	3.7(0.6)	16.2	3.1(0.5)	17.1	3.8(0.6)	14.6	2.0(0.5)	23.2
월 가구소득											
100만원 이하	789	93.2(1.6)	1.7	2.0(0.9)	43.9	0.7(0.5)	70.9	3.7(1.3)	35.1	0.5(0.3)	69.5
101-200만원	1,036	92.5(1.2)	1.3	1.9(0.5)	24.3	1.7(0.5)	29.5	2.4(0.8)	33.7	1.6(0.5)	29.2
201-300만원	1,373	91.0(1.1)	1.2	2.8(0.6)	22.5	2.1(0.6)	30.0	2.9(0.6)	20.1	1.3(0.4)	34.3
301-400만원	1,316	89.9(1.2)	1.3	2.8(0.6)	21.2	2.8(0.6)	22.9	3.7(0.7)	19.5	0.7(0.3)	35.1
401만원 이상	2,614	88.7(0.8)	1.0	5.1(0.6)	11.8	2.3(0.4)	15.6	2.5(0.4)	14.6	1.3(0.3)	20.0
거주유형											
동	2,476	89.6(0.8)	0.9	4.0(0.5)	12.3	2.5(0.3)	13.8	2.9(0.4)	13.0	1.1(0.3)	27.3
읍·면	4,997	90.9(0.6)	0.6	3.0(0.3)	10.5	1.8(0.2)	13.6	2.7(0.3)	12.1	1.6(0.3)	17.0

주 : 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 145〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,472	4.0(0.3)	8.4	3,667	5.5(0.5)	9.4	3,805	2.4(0.3)	14.8
연령									
19-29	1,028	11.3(1.3)	11.5	467	14.4(1.9)	13.0	561	7.6(1.4)	18.7
30-39	1,549	4.3(0.6)	14.7	738	6.7(1.0)	15.3	811	1.7(0.5)	31.7
40-49	1,759	1.4(0.3)	23.9	884	1.8(0.6)	32.0	875	0.9(0.3)	29.2
50-59	1,600	0.7(0.3)	36.3	818	1.0(0.5)	45.8	782	0.4(0.2)	46.0
60-69	801	0.6(0.5)	83.2	429	0.9(0.8)	99.8	372	0.2(0.2)	99.8
70 이상	735	0.1(0.1)	99.9	331	0.2(0.2)	99.9	404	0.0(0.0)	.
생애주기별									
19-64	6,384	4.3(0.4)	8.4	3,149	5.9(0.6)	9.4	3,235	2.6(0.4)	14.7
65 이상	1,088	0.1(0.1)	99.8	518	0.2(0.2)	99.7	570	0.0(0.0)	.
교육수준[2]									
무학	435	0.8(0.7)	89.5	79	4.1(4.0)	96.2	356	0.1(0.1)	100.2
초등학교	815	0.3(0.3)	88.5	354	0.0(0.0)	.	461	0.6(0.5)	88.5
중학교	795	1.1(0.5)	45.7	384	1.3(0.9)	66.1	411	1.0(0.6)	61.6
고등학교	3,100	5.2(0.6)	10.7	1,541	7.4(0.9)	12.2	1,559	2.7(0.5)	20.1
대학교 이상	2,320	4.1(0.5)	12.7	1,307	4.9(0.7)	14.2	1,013	3.1(0.7)	24.3
직업									
전문행정관리	977	5.2(0.9)	18.0	508	6.2(1.3)	21.0	469	4.1(1.3)	33.2
사무직	706	3.5(0.8)	24.2	361	4.3(1.3)	30.3	345	2.3(0.9)	37.4
판매·서비스직	1,019	3.4(0.8)	23.9	359	6.4(1.8)	28.0	660	1.4(0.6)	44.3
농림어업	930	0.6(0.3)	50.2	570	0.5(0.4)	80.5	360	1.0(0.6)	59.9
기능단순노무직	1,731	3.5(0.6)	17.2	1,254	4.1(0.7)	18.4	477	1.6(0.7)	44.3
기타[3]	2,107	5.0(0.7)	14.3	614	9.6(1.7)	17.5	1,493	2.5(0.5)	22.1
월 가구소득									
100만원 이하	789	1.7(0.7)	39.6	323	2.6(1.1)	42.4	466	1.0(0.9)	85.2
101-200만원	1,036	2.5(0.6)	25.5	502	3.6(1.0)	28.8	534	1.4(0.7)	52.7
201-300만원	1,372	5.0(0.8)	17.0	700	7.4(1.4)	19.5	672	2.1(0.6)	30.3
301-400만원	1,316	4.8(0.9)	18.0	665	6.4(1.3)	20.9	651	2.9(1.1)	36.5
401만원 이상	2,614	3.9(0.5)	13.0	1,313	5.2(0.8)	15.9	1,301	2.4(0.5)	20.3
거주유형									
동	2,476	4.5(0.5)	11.2	1,195	6.4(0.8)	12.2	1,281	2.5(0.5)	20.2
읍·면	4,996	3.2(0.3)	9.7	2,472	4.1(0.5)	11.7	2,524	2.1(0.3)	16.6

주 : 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 : (주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 "항상" 또는 "대체로" 지적받는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 146〉 연간 인플루엔자 예방접종률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,566	40.7(0.7)	1.7	5,295	34.7(0.9)	2.5	6,271	46.7(0.9)	2.0
연령									
19-29	1,031	22.4(1.7)	7.4	467	20.2(2.2)	10.7	564	25.1(2.3)	9.1
30-39	1,600	32.0(1.6)	5.0	756	26.6(1.9)	7.1	844	37.7(2.2)	5.8
40-49	1,955	22.7(1.3)	5.7	964	19.4(1.6)	8.3	991	26.3(1.8)	6.9
50-59	2,473	38.3(1.5)	3.8	1,175	30.7(1.6)	5.1	1,298	46.2(2.1)	4.5
60-69	1,928	67.4(1.5)	2.2	893	62.4(2.0)	3.3	1,035	71.5(1.8)	2.5
70 이상	2,579	89.0(0.9)	1.0	1,040	88.9(1.4)	1.6	1,539	89.1(1.2)	1.3
생애주기별									
19-64	8,040	31.0(0.8)	2.4	3,833	26.2(0.9)	3.6	4,207	36.3(1.0)	2.8
65 이상	3,526	86.1(0.8)	1.0	1,462	84.4(1.3)	1.6	2,064	87.2(1.0)	1.2
교육수준[2]									
무학	1,697	82.5(1.4)	1.7	326	79.7(3.0)	3.7	1,371	83.2(1.5)	1.8
초등학교	2,299	65.8(1.4)	2.1	969	62.4(2.1)	3.3	1,330	68.2(1.7)	2.5
중학교	1,386	49.1(1.7)	3.5	682	47.4(2.4)	5.0	704	50.6(2.3)	4.5
고등학교	3,723	29.7(1.1)	3.6	1,919	28.2(1.3)	4.7	1,804	31.4(1.4)	4.6
대학교 이상	2,451	30.3(1.3)	4.2	1,396	26.9(1.5)	5.5	1,055	35.2(2.0)	5.6
직업									
전문행정관리	1,037	30.3(1.8)	6.1	544	25.4(2.2)	8.7	493	35.9(2.8)	7.8
사무직	740	30.3(2.4)	7.8	382	29.3(3.1)	10.5	358	31.6(3.1)	9.7
판매·서비스직	1,291	28.7(1.6)	5.6	421	23.4(2.4)	10.4	870	31.8(2.0)	6.3
농림어업	2,090	58.7(1.5)	2.6	1,197	54.4(1.8)	3.3	893	65.7(2.0)	3.0
기능단순노무직	2,406	33.3(1.3)	3.8	1,584	27.6(1.3)	4.7	822	48.2(2.3)	4.8
기타[3]	4,000	52.4(1.1)	2.1	1,166	48.9(1.9)	3.9	2,834	54.2(1.3)	2.4
월 가구소득									
100만원 이하	2,290	71.3(1.4)	2.0	859	62.5(2.6)	4.2	1,431	77.2(1.4)	1.8
101-200만원	1,945	49.7(1.8)	3.6	895	45.4(2.3)	5.1	1,050	53.7(2.2)	4.1
201-300만원	1,923	33.9(1.6)	4.6	937	30.4(1.8)	6.0	986	37.7(2.0)	5.3
301-400만원	1,695	38.5(1.9)	4.9	831	31.7(2.2)	6.9	864	45.9(2.3)	5.0
401만원 이상	3,080	31.3(1.2)	3.9	1,499	27.7(1.4)	5.2	1,581	35.1(1.6)	4.6
거주유형									
동	3,230	36.8(1.1)	2.9	1,467	30.8(1.3)	4.3	1,763	42.7(1.4)	3.3
읍·면	8,336	46.4(0.8)	1.7	3,828	40.2(1.0)	2.4	4,508	52.8(1.0)	1.8

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 147〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	10.1(0.4)	4.2	5,312	7.3(0.6)	7.6	6,286	12.8(0.6)	4.4
연령									
19-29	1,036	5.8(1.0)	17.7	471	4.9(1.4)	28.5	565	6.9(1.1)	15.7
30-39	1,603	5.4(0.6)	11.9	758	4.6(0.8)	16.5	845	6.2(1.0)	15.5
40-49	1,957	6.8(0.7)	10.8	965	5.5(0.9)	16.1	992	8.2(1.2)	14.4
50-59	2,481	11.0(0.9)	8.0	1,179	8.1(0.9)	11.7	1,302	14.1(1.6)	11.4
60-69	1,934	15.5(1.2)	7.9	896	8.8(1.1)	13.1	1,038	21.1(1.9)	9.2
70 이상	2,587	22.1(1.3)	5.8	1,043	17.8(1.8)	10.4	1,544	25.0(1.5)	6.1
생애주기별									
19-64	8,060	7.9(0.4)	5.4	3,846	5.9(0.6)	9.9	4,214	10.0(0.6)	5.9
65 이상	3,538	20.3(1.1)	5.4	1,466	15.7(1.4)	8.9	2,072	23.7(1.4)	6.1
교육수준[2]									
무학	1,704	25.9(1.6)	6.2	328	23.9(3.8)	15.7	1,376	26.4(1.7)	6.6
초등학교	2,306	18.7(1.2)	6.6	972	14.9(1.6)	10.7	1,334	21.3(1.7)	7.9
중학교	1,390	11.8(1.3)	10.9	684	9.4(1.4)	14.6	706	13.9(1.9)	13.7
고등학교	3,730	7.0(0.6)	8.9	1,925	5.7(1.0)	17.9	1,805	8.4(0.8)	9.8
대학교 이상	2,458	5.6(0.5)	9.7	1,400	5.0(0.6)	12.3	1,058	6.5(0.9)	14.3
직업									
전문행정관리	1,038	5.2(0.7)	14.5	545	3.6(0.7)	19.7	493	7.0(1.3)	18.4
사무직	742	3.8(0.7)	18.5	382	1.8(0.7)	42.0	360	6.6(1.3)	20.2
판매·서비스직	1,294	8.3(1.2)	14.1	423	3.2(0.8)	25.5	871	11.3(1.7)	15.4
농림어업	2,098	12.6(1.0)	7.5	1,203	10.4(1.0)	9.9	895	16.3(1.6)	9.8
기능단순노무직	2,411	9.2(0.9)	10.0	1,586	7.4(1.0)	14.2	825	13.9(1.6)	11.5
기타[3]	4,013	14.2(0.8)	5.5	1,172	12.4(1.2)	9.9	2,841	15.1(1.0)	6.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,295	22.1(1.4)	6.3	863	17.3(1.9)	10.7	1,432	25.3(1.9)	7.3
101-200만원	1,953	15.1(1.2)	7.8	898	11.0(1.5)	13.6	1,055	19.0(1.8)	9.7
201-300만원	1,927	7.0(1.0)	13.7	939	5.8(1.2)	19.9	988	8.3(1.1)	13.1
301-400만원	1,698	7.7(0.9)	11.5	831	6.9(1.1)	15.7	867	8.4(1.3)	15.4
401만원 이상	3,086	6.9(0.6)	8.9	1,504	4.4(0.7)	15.4	1,582	9.6(0.9)	9.6
거주유형									
동	3,231	9.0(0.6)	7.2	1,467	6.2(0.9)	14.3	1,764	11.8(0.9)	7.2
읍·면	8,367	11.6(0.5)	3.9	3,845	9.0(0.5)	5.7	4,522	14.4(0.6)	4.1

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 148〉 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수[1]

(단위 : 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	1,320	8.6(0.2)	2.3	459	8.7(0.3)	3.7	861	8.5(0.2)	2.9
연령									
19-29	69	7.2(0.6)	7.8	21	7.8(1.1)	14.4	48	6.8(0.5)	7.9
30-39	88	7.0(0.7)	10.2	39	7.1(1.0)	14.3	49	6.9(1.1)	15.3
40-49	140	7.6(0.6)	7.8	55	9.7(0.7)	7.3	85	6.1(0.8)	13.6
50-59	247	9.2(0.4)	4.4	86	9.6(0.5)	5.2	161	8.9(0.6)	6.2
60-69	268	9.2(0.4)	4.2	88	8.6(0.6)	7.3	180	9.4(0.5)	5.0
70 이상	508	9.3(0.3)	3.5	170	8.5(0.6)	7.3	338	9.7(0.3)	3.3

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 : 최근 2주(14일) 동안 이환일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

〈표 149〉 연간 평균 혈압 및 혈당 측정횟수

(단위 : 회)

구분	연간 평균 혈압 측정횟수[1]			연간 평균 혈당 측정횟수[2]		
	N	회(표준오차)	변동계수	N	회(표준오차)	변동계수
전체	11,585	11.1(0.5)	4.1	11,570	5.3(0.3)	6.0
성						
남자	5,306	11.9(0.7)	5.6	5,304	5.4(0.5)	9.2
여자	6,279	10.2(0.5)	4.7	6,266	5.1(0.4)	8.1
연령						
19-29	1,035	4.6(0.7)	15.6	1,035	0.7(0.1)	13.5
30-39	1,602	5.6(0.7)	11.6	1,600	2.0(0.7)	33.9
40-49	1,956	7.7(0.8)	11.0	1,954	3.4(0.6)	16.9
50-59	2,479	14.8(1.1)	7.6	2,480	7.3(0.9)	11.7
60-69	1,931	18.5(1.2)	6.5	1,928	11.9(1.3)	10.7
70 이상	2,582	21.2(1.8)	8.4	2,573	10.5(1.2)	11.5
생애주기별						
19-64	8,054	9.1(0.4)	4.9	8,048	4.2(0.3)	7.8
65 이상	3,531	20.5(1.4)	6.6	3,522	10.6(0.9)	8.4
교육수준[3]						
무학	1,701	17.0(1.6)	9.5	1,695	9.4(1.3)	13.5
초등학교	2,301	16.0(1.1)	7.1	2,298	8.6(0.9)	11.0
중학교	1,390	16.0(1.3)	8.2	1,386	8.5(1.4)	16.0
고등학교	3,726	9.1(0.7)	7.8	3,726	4.3(0.5)	12.0
대학교 이상	2,457	8.4(0.6)	7.5	2,455	3.1(0.5)	16.3
직업						
전문행정관리	1,037	10.6(1.3)	12.7	1,038	3.4(0.7)	20.2
사무직	742	6.5(0.7)	10.9	741	3.4(1.4)	40.3
판매·서비스직	1,292	8.9(0.8)	9.1	1,290	3.6(0.6)	16.0
농림어업	2,099	12.6(0.8)	6.6	2,098	6.0(0.9)	15.1
기능단순노무직	2,411	9.5(0.8)	8.4	2,408	4.6(0.7)	15.0
기타[4]	4,002	13.9(1.0)	6.9	3,993	7.5(0.6)	8.0
월 가구소득						
100만원 이하	2,290	18.1(1.6)	9.0	2,285	9.9(1.0)	10.6
101-200만원	1,953	13.1(1.1)	8.5	1,951	7.0(1.1)	15.2
201-300만원	1,926	10.6(1.1)	10.1	1,922	5.2(0.8)	15.7
301-400만원	1,697	8.2(0.7)	8.5	1,695	3.8(0.6)	15.9
401만원 이상	3,082	9.6(0.8)	8.5	3,082	3.8(0.5)	13.8
거주유형						
동	3,228	10.4(0.7)	6.3	3,224	5.1(0.5)	9.6
읍·면	8,357	12.1(0.6)	4.8	8,346	5.5(0.3)	5.5

주 : 1) 연간 평균 혈압 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수))/조사대상 응답자 수
2) 연간 평균 혈당 측정횟수 : ((하루 측정횟수×365일)+(일주일 측정횟수×52주)+(한 달 측정횟수×12개월)+(일 년 측정횟수))/조사대상 응답자 수
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 150〉 혈압, 혈당 및 총 콜레스테롤 인지율

(단위 : %)

구분	혈압 인지율[1]			혈당 인지율[2]			총 콜레스테롤 인지율[3]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,521	51.2(0.7)	1.4	11,519	12.4(0.5)	3.7	11,511	5.0(0.3)	6.5
성									
남자	5,283	54.5(1.0)	1.8	5,274	12.7(0.6)	5.1	5,278	5.1(0.5)	9.2
여자	6,238	47.9(0.9)	1.9	6,245	12.2(0.6)	4.5	6,233	4.9(0.4)	8.2
연령									
19-29	1,034	31.4(1.8)	5.8	1,036	4.8(0.9)	17.9	1,035	2.5(0.6)	24.7
30-39	1,591	51.4(1.6)	3.1	1,592	7.7(0.8)	10.5	1,598	6.0(0.8)	12.5
40-49	1,946	56.5(1.6)	2.8	1,948	12.5(1.0)	8.3	1,944	6.2(0.8)	12.1
50-59	2,472	66.3(1.3)	1.9	2,459	19.8(1.1)	5.5	2,460	7.4(0.8)	10.7
60-69	1,922	59.4(1.5)	2.5	1,915	19.3(1.4)	7.3	1,914	4.6(0.8)	16.8
70 이상	2,556	37.9(1.4)	3.7	2,569	12.3(0.9)	7.4	2,560	1.4(0.4)	27.0
생애주기별									
19-64	8,019	53.0(0.8)	1.5	8,006	12.1(0.5)	4.2	8,007	5.6(0.4)	6.8
65 이상	3,502	42.6(1.2)	2.9	3,513	13.9(0.9)	6.5	3,504	2.1(0.4)	18.1
교육수준[4]									
무학	1,682	27.7(1.6)	5.8	1,692	8.3(1.0)	11.7	1,683	0.6(0.2)	37.2
초등학교	2,290	48.3(1.5)	3.0	2,292	13.9(0.9)	6.6	2,284	2.0(0.4)	19.7
중학교	1,382	60.5(1.6)	2.6	1,377	16.0(1.3)	7.9	1,381	3.6(0.7)	18.6
고등학교	3,710	50.5(1.2)	2.3	3,702	11.6(0.7)	6.3	3,705	4.2(0.4)	10.1
대학교 이상	2,447	56.6(1.3)	2.2	2,446	13.0(1.0)	7.4	2,448	8.8(0.8)	9.1
직업									
전문행정관리	1,032	59.2(2.1)	3.6	1,031	16.1(1.4)	8.8	1,033	8.7(1.1)	12.3
사무직	737	59.3(2.5)	4.2	738	12.0(1.4)	11.6	738	9.4(1.4)	15.0
판매·서비스직	1,289	53.9(1.8)	3.3	1,283	13.1(1.1)	8.5	1,283	4.5(0.6)	14.4
농림어업	2,087	42.6(1.4)	3.3	2,085	10.7(0.8)	7.3	2,086	1.5(0.3)	19.0
기능단순노무직	2,406	55.6(1.3)	2.3	2,394	10.8(0.8)	7.8	2,395	4.1(0.5)	13.2
기타[5]	3,968	44.2(1.1)	2.5	3,986	12.5(0.7)	5.9	3,974	4.2(0.5)	11.8
월 가구소득									
100만원 이하	2,266	40.4(1.5)	3.6	2,280	12.5(0.9)	7.4	2,278	1.4(0.3)	22.0
101-200만원	1,942	49.5(1.6)	3.2	1,939	12.2(1.1)	9.2	1,944	2.9(0.5)	19.1
201-300만원	1,917	49.2(1.5)	3.1	1,917	11.6(0.9)	7.8	1,915	4.6(0.7)	14.8
301-400만원	1,690	53.6(1.8)	3.4	1,684	12.0(1.1)	9.1	1,676	7.0(1.0)	13.9
401만원 이상	3,070	56.4(1.3)	2.3	3,064	13.2(0.8)	6.1	3,068	6.4(0.6)	10.1
거주유형									
동	3,205	56.4(1.1)	1.9	3,184	13.7(0.7)	5.3	3,182	6.3(0.5)	8.3
읍·면	8,316	43.6(0.8)	1.9	8,335	10.7(0.4)	3.8	8,329	3.1(0.3)	8.1

주 : 1) 혈압 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 혈당 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 총 콜레스테롤 인지율 : (본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수)× 100
4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 151〉 고혈압 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,597	19.9(0.5)	2.5	5,310	18.2(0.7)	3.8	6,287	21.5(0.7)	3.2
30세 이상[2]	10,561	23.6(0.6)	2.5	4,839	21.7(0.8)	3.6	5,722	25.5(0.8)	3.1
연령									
19-29	1,036	1.7(0.5)	29.2	471	2.9(0.9)	31.5	565	0.3(0.0)	5.0
30-39	1,603	3.9(0.5)	13.6	758	5.3(0.8)	15.7	845	2.3(0.6)	26.9
40-49	1,957	9.8(0.8)	8.1	965	11.6(1.2)	10.7	992	7.8(1.0)	13.3
50-59	2,481	24.0(1.1)	4.6	1,179	22.3(1.5)	6.9	1,302	25.8(1.6)	6.3
60-69	1,933	43.8(1.5)	3.4	895	41.4(2.2)	5.3	1,038	45.8(2.1)	4.6
70 이상	2,587	57.3(1.3)	2.3	1,042	52.7(2.2)	4.1	1,545	60.5(1.8)	2.9
고혈압 현재치료율									
전체[3]	3,250	89.9(0.8)	0.8	1,358	83.9(1.4)	1.7	1,892	94.9(0.7)	0.8
30세 이상[4]	3,234	90.9(0.7)	0.7	1,343	86.1(1.2)	1.4	1,891	94.9(0.7)	0.8
연령									
19-29									
30-39	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	64	56.8(6.5)	11.5	45	49.5(8.2)	16.6	19	-(-)	-
50-59	197	76.2(3.6)	4.7	110	73.1(5.1)	7.0	87	81.3(5.1)	6.3
60-69	676	92.6(1.1)	1.2	292	90.0(1.7)	1.9	384	95.0(1.4)	1.4
70 이상	839	93.4(1.3)	1.4	362	91.2(2.0)	2.2	477	95.0(1.5)	1.6

주 : 1) 고혈압 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 고혈압 현재치료율 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
4) 고혈압 현재치료율(≥30) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 152〉 본인 인지 혈압 조절률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,238	94.8(0.5)	0.5	1,352	93.7(0.8)	0.8	1,886	95.7(0.6)	0.6
30세 이상[2]	3,223	95.0(0.5)	0.5	1,338	94.3(0.7)	0.7	1,885	95.7(0.6)	0.6
연령									
19-29	15	-(-)	-	14	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	63	84.8(3.8)	4.5	44	85.8(4.0)	4.7	19	-(-)	-
40-49	196	91.2(2.0)	2.2	109	87.7(2.9)	3.3	87	96.8(2.5)	2.6
50-59	674	97.1(0.6)	0.7	292	95.6(1.2)	1.3	382	98.5(0.5)	0.5
60-69	838	95.7(0.9)	0.9	361	96.1(1.2)	1.2	477	95.4(1.3)	1.3
70 이상	1,452	95.3(0.7)	0.8	532	96.3(0.8)	0.9	920	94.7(1.0)	1.1

주 : 1) 본인 인지 혈압 조절률 : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 본인 인지 혈압 조절률(≥30) : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 153〉 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,597	7.4(0.3)	3.8	5,312	7.8(0.5)	5.8	6,285	7.0(0.4)	5.5
30세 이상[2]	10,562	8.9(0.3)	3.9	4,841	9.5(0.6)	5.8	5,721	8.3(0.5)	5.5
연령									
19-29	1,035	0.2(0.1)	83.1	471	0.2(0.2)	100.0	564	0.1(0.1)	100.1
30-39	1,603	1.2(0.3)	23.6	758	1.3(0.4)	33.2	845	1.0(0.4)	39.4
40-49	1,957	3.4(0.5)	15.2	965	4.3(0.8)	18.3	992	2.4(0.6)	26.6
50-59	2,481	9.8(0.7)	7.3	1,179	11.4(1.1)	9.9	1,302	8.2(1.0)	12.3
60-69	1,934	17.2(1.1)	6.7	896	20.3(1.9)	9.3	1,038	14.7(1.4)	9.6
70 이상	2,587	20.6(1.1)	5.4	1,043	21.4(1.9)	8.8	1,544	20.0(1.4)	7.0
당뇨병 현재치료율									
전체[3]	1,126	90.6(1.1)	1.2	538	89.6(1.6)	1.7	588	91.7(1.5)	1.7
30세 이상[4]	1,124	90.5(1.1)	1.2	537	89.6(1.6)	1.8	587	91.6(1.5)	1.7
연령									
19-29									
30-39	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	20	54.1(10.5)	19.5	10	-(-)	-	10	-(-)	-
50-59	75	81.0(4.4)	5.4	48	76.6(6.3)	8.2	27	89.4(3.0)	3.3
60-69	242	88.3(2.8)	3.2	133	87.8(3.6)	4.1	109	89.1(4.6)	5.2
70 이상	316	94.0(1.7)	1.8	160	93.6(2.2)	2.3	156	94.6(2.5)	2.6

주 : 1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 당뇨병 현재치료율 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
4) 당뇨병 현재치료율(≥30) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 154〉 본인 인지 혈당 조절률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,115	86.8(1.4)	1.6	533	87.7(2.0)	2.2	582	85.7(1.8)	2.1
30세 이상[2]	1,113	86.7(1.4)	1.6	532	87.7(2.0)	2.2	581	85.7(1.8)	2.1
연령									
19-29	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	9	-(-)	-	10	-(-)	-
40-49	74	84.3(4.1)	4.9	48	80.8(6.0)	7.4	26	91.2(2.5)	2.8
50-59	241	87.3(3.2)	3.7	132	87.0(4.8)	5.5	109	87.7(4.0)	4.6
60-69	313	87.9(2.4)	2.7	158	90.7(2.8)	3.0	155	84.8(3.9)	4.5
70 이상	466	86.7(1.7)	2.0	185	90.6(2.5)	2.7	281	83.7(2.7)	3.2

주 : 1) 본인 인지 혈당 조절률 : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 본인 인지 혈당 조절률(≥30) : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 155〉 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,560	11.7(0.4)	3.5	5,302	10.6(0.5)	5.1	6,258	12.9(0.6)	4.6
30세 이상[2]	10,525	14.0(0.5)	3.3	4,831	12.8(0.6)	5.0	5,694	15.1(0.7)	4.5
연령									
19-29	1,035	0.9(0.3)	37.9	471	0.7(0.4)	60.2	564	1.1(0.5)	48.7
30-39	1,603	4.5(0.6)	13.4	758	6.6(0.9)	14.2	845	2.3(0.6)	27.7
40-49	1,955	8.7(0.8)	8.9	963	10.9(1.3)	11.5	992	6.4(0.9)	14.4
50-59	2,477	19.3(1.2)	6.2	1,177	17.9(1.5)	8.1	1,300	20.9(1.7)	8.1
60-69	1,929	26.2(1.4)	5.4	893	19.6(1.8)	9.1	1,036	31.7(2.1)	6.6
70 이상	2,561	17.4(1.0)	5.8	1,040	11.7(1.4)	11.9	1,521	21.4(1.5)	6.9

주 : 1) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 156〉 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	1.7(0.1)	8.3	5,313	1.8(0.2)	11.2	6,284	1.6(0.2)	12.2
50세 이상[2]	7,001	3.5(0.3)	7.7	3,119	3.7(0.4)	10.3	3,882	3.3(0.3)	10.6
연령									
19-29	1,036	0.2(0.2)	98.8	471	0.4(0.4)	98.3	565	0.0(0.0)	.
30-39	1,603	0.1(0.0)	40.4	758	0.1(0.1)	70.8	845	0.1(0.0)	4.1
40-49	1,957	0.6(0.3)	43.7	965	0.9(0.5)	52.4	992	0.4(0.3)	93.2
50-59	2,481	1.2(0.2)	21.1	1,179	1.2(0.3)	25.3	1,302	1.1(0.3)	30.2
60-69	1,934	4.4(0.6)	14.1	896	5.0(1.0)	19.6	1,038	3.9(0.8)	19.6
70 이상	2,586	6.3(0.6)	9.8	1,044	7.2(1.0)	13.8	1,542	5.7(0.8)	13.2

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 157〉 심근경색증 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,580	1.2(0.1)	10.1	5,308	1.5(0.2)	12.5	6,272	0.8(0.1)	14.7
40세 이상[2]	8,941	1.8(0.2)	9.9	4,079	2.4(0.3)	12.3	4,862	1.2(0.2)	14.1
연령									
19-29	1,036	0.2(0.2)	100.0	471	0.0(0.0)	.	565	0.3(0.3)	99.9
30-39	1,603	0.0(0.0)	.	758	0.0(0.0)	.	845	0.0(0.0)	.
40-49	1,957	0.6(0.3)	40.3	965	1.1(0.5)	43.1	992	0.1(0.1)	74.1
50-59	2,479	0.9(0.2)	25.0	1,178	1.3(0.3)	26.0	1,301	0.5(0.3)	59.6
60-69	1,933	3.0(0.5)	15.5	896	4.4(0.8)	19.1	1,037	1.9(0.5)	27.3
70 이상	2,572	4.0(0.5)	13.4	1,040	5.5(1.1)	19.3	1,532	3.0(0.6)	19.7

주 : 1) 심근경색증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 심근경색증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 심근경색증 평생 의사진단 경험률(≥40) : (의사에게 심근경색증을 진단받은 사람의 수 / 40세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 158〉 협심증 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,576	1.7(0.1)	8.3	5,307	1.5(0.2)	13.3	6,269	1.9(0.2)	9.6
40세 이상[2]	8,938	2.6(0.2)	8.1	4,079	2.3(0.3)	13.2	4,859	2.9(0.3)	9.4
연령									
19-29	1,036	0.0(0.0)	.	471	0.0(0.0)	.	565	0.0(0.0)	.
30-39	1,602	0.0(0.0)	100.1	757	0.0(0.0)	.	845	0.0(0.0)	100.1
40-49	1,957	0.4(0.2)	44.4	965	0.1(0.1)	58.2	992	0.6(0.3)	54.0
50-59	2,481	1.7(0.3)	20.3	1,179	1.0(0.4)	42.3	1,302	2.3(0.5)	23.0
60-69	1,930	4.5(0.8)	17.2	895	5.8(1.2)	20.8	1,035	3.5(0.8)	23.5
70 이상	2,570	6.2(0.7)	11.6	1,040	6.1(1.2)	20.4	1,530	6.3(0.8)	12.6

주 : 1) 협심증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 협심증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 협심증 평생 의사진단 경험률(≥40) : (의사에게 협심증을 진단받은 사람의 수 / 40세 이상 조사대상 응답자 수) × 100