〈표 159〉 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
관절염 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,592	11.6(0.4)	3.1	5,311	4.8(0.3)	6.3	6,281	18.4(0.6)	3.4
50세 이상[2]	6,998	24.1(0.7)	2.9	3,117	10.1(0.6)	6.4	3,881	36.5(1.1)	2.9
연령									
19-29	1,036	0.6(0.3)	48.7	471	0.8(0.5)	58.6	565	0.3(0.2)	81.0
30-39	1,601	1.4(0.3)	23.1	758	0.9(0.3)	32.5	843	2.0(0.6)	30.3
40-49	1,957	3.4(0.5)	14.4	965	1.5(0.5)	30.9	992	5.4(0.9)	16.8
50-59	2,481	13.5(0.9)	6.7	1,179	6.7(0.9)	13.6	1,302	20.6(1.5)	7.3
60-69	1,932	28.1(1.4)	4.9	895	11.1(1.2)	10.6	1,037	42.3(2.2)	5.2
70 이상	2,585	37.5(1.3)	3.4	1,043	16.0(1.3)	8.1	1,542	52.5(1.8)	3.4
관절염 현재치료율									
전체[3]	2,058	51.8(1.5)	2.8	416	52.9(3.0)	5.6	1,642	51.5(1.7)	3.3
50세 이상[4]	1,960	52.9(1.5)	2.8	393	54.0(2.9)	5.4	1,567	52.6(1.7)	3.3
연령									
19-29									
30-39	6	-(-)	-	4	-(-)	-	2	-(-)	-
40-49	21	25.0(7.7)	30.9	5	-(-)	-	16	-(-)	-
50-59	71	45.2(6.6)	14.7	14	-(-)	-	57	40.0(6.6)	16.5
60-69	373	45.4(2.8)	6.2	78	50.9(6.1)	11.9	295	43.5(3.2)	7.4
70 이상	577	50.9(3.0)	5.9	115	45.5(5.0)	11.0	462	52.1(3.4)	6.6

주 : 1) 관절염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 관절염 현재치료율 : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
4) 관절염 현재치료율(≥50) : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

〈표 160〉 골다공증 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,580	6.9(0.3)	4.0	5,310	1.3(0.1)	11.5	6,270	12.4(0.5)	4.0
50세 이상[2]	6,984	15.0(0.6)	4.0	3,116	2.5(0.3)	13.6	3,868	26.0(1.0)	3.8
연령									
19-29	1,036	0.1(0.1)	75.9	471	0.1(0.1)	100.2	565	0.0(0.0)	100.1
30-39	1,603	0.6(0.1)	14.9	758	0.8(0.1)	11.1	845	0.3(0.1)	53.9
40-49	1,957	1.1(0.3)	31.4	965	0.3(0.2)	57.1	992	1.9(0.7)	35.8
50-59	2,479	6.6(0.7)	10.3	1,179	1.1(0.5)	40.3	1,300	12.4(1.3)	10.4
60-69	1,933	17.6(1.1)	6.2	895	2.8(0.7)	24.1	1,038	29.8(1.8)	6.2
70 이상	2,572	26.0(1.1)	4.4	1,042	5.1(0.8)	15.7	1,530	40.8(1.8)	4.3

주 : 1) 골다공증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 골다공증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 골다공증 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 골다공증을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 161〉 천식 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	11,597	2.5(0.2)	8.6	5,313	2.3(0.3)	12.3	6,284	2.6(0.3)	11.3
연령									
19-29	1,036	1.9(0.5)	28.4	471	2.7(0.9)	33.9	565	0.9(0.4)	45.3
30-39	1,603	1.4(0.4)	29.0	758	1.1(0.3)	26.6	845	1.7(0.8)	44.9
40-49	1,957	1.5(0.4)	26.2	965	1.8(0.7)	37.1	992	1.3(0.4)	35.3
50-59	2,481	2.3(0.5)	20.4	1,179	1.4(0.4)	25.6	1,302	3.1(0.9)	27.7
60-69	1,934	3.7(0.6)	15.5	896	2.6(0.6)	24.5	1,038	4.7(1.0)	21.8
70 이상	2,586	5.5(0.6)	11.4	1,044	6.6(1.2)	17.6	1,542	4.8(0.7)	15.4

주 : 1) 천식 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 천식을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 162〉 알레르기비염 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	11,588	13.5(0.5)	3.7	5,309	12.1(0.7)	6.1	6,279	14.9(0.6)	4.2
연령									
19-29	1,036	23.2(1.7)	7.5	471	22.6(2.4)	10.8	565	23.9(2.2)	9.2
30-39	1,602	18.7(1.1)	5.9	757	16.3(1.5)	9.1	845	21.3(1.7)	7.8
40-49	1,956	13.8(0.9)	6.7	964	10.6(1.3)	11.8	992	17.2(1.5)	8.8
50-59	2,480	9.0(0.7)	8.1	1,179	6.6(0.9)	13.7	1,301	11.5(1.1)	9.5
60-69	1,932	7.8(0.9)	11.3	895	6.5(1.2)	18.7	1,037	8.9(1.3)	14.5
70 이상	2,582	4.1(0.5)	12.8	1,043	4.8(0.9)	19.4	1,539	3.7(0.6)	17.5

주 : 1) 알레르기비염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 알레르기비염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 163〉 아토피피부염 평생 의사진단 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	11,589	3.0(0.2)	8.1	5,311	2.6(0.3)	12.6	6,278	3.3(0.3)	9.4
연령									
19-29	1,036	6.6(0.9)	13.9	471	5.7(1.3)	22.6	565	7.7(1.3)	16.5
30-39	1,603	3.4(0.5)	14.2	758	2.1(0.5)	24.8	845	4.7(0.8)	17.9
40-49	1,957	2.3(0.5)	20.9	965	2.2(0.7)	30.1	992	2.4(0.6)	24.7
50-59	2,480	2.2(0.4)	16.3	1,179	1.5(0.5)	30.9	1,301	3.0(0.6)	19.3
60-69	1,932	1.8(0.5)	26.3	895	2.6(0.8)	30.9	1,037	1.2(0.5)	42.7
70 이상	2,581	0.7(0.2)	25.8	1,043	0.7(0.3)	41.4	1,538	0.7(0.2)	32.5

주 : 1) 아토피피부염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 아토피피부염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 164〉 백내장 평생 의사진단 경험률[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,593	8.3(0.3)	3.9	5,311	6.7(0.4)	6.1	6,282	9.9(0.4)	4.5
50세 이상[2)]	6,997	18.3(0.6)	3.4	3,117	15.5(0.9)	5.7	3,880	20.8(0.8)	4.1
연령									
19-29	1,036	0.2(0.2)	99.9	471	0.0(0.0)	.	565	0.3(0.3)	100.3
30-39	1,603	0.3(0.1)	36.3	758	0.3(0.0)	4.1	845	0.3(0.2)	72.4
40-49	1,957	1.2(0.3)	22.8	965	1.3(0.4)	27.9	992	1.0(0.4)	38.3
50-59	2,480	4.5(0.6)	12.2	1,179	5.1(0.9)	17.0	1,301	3.9(0.7)	17.2
60-69	1,934	16.3(1.2)	7.2	896	12.9(1.5)	12.0	1,038	19.1(1.8)	9.3
70 이상	2,583	41.9(1.3)	3.2	1,042	38.7(2.2)	5.6	1,541	44.2(1.7)	3.9

주 : 1) 백내장 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 백내장을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 백내장 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 백내장을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 165〉 B형 간염 평생 의사진단 경험률[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,549	2.8(0.2)	7.4	5,299	3.5(0.3)	9.4	6,250	2.1(0.3)	12.4
연령									
19-29	1,036	1.5(0.4)	28.7	471	1.8(0.7)	37.4	565	1.1(0.4)	40.3
30-39	1,601	3.6(0.5)	14.8	756	4.5(0.8)	18.0	845	2.5(0.6)	25.2
40-49	1,954	3.1(0.5)	15.3	964	3.2(0.7)	22.0	990	2.9(0.6)	21.4
50-59	2,476	3.0(0.5)	16.0	1,175	4.2(0.8)	19.1	1,301	1.8(0.5)	31.2
60-69	1,925	3.7(0.7)	18.8	894	4.6(0.9)	20.4	1,031	2.9(1.0)	35.0
70 이상	2,557	1.7(0.3)	19.9	1,039	2.4(0.6)	24.2	1,518	1.3(0.4)	33.0

주 : 1) B형 간염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 B형 간염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 166〉 우울증 평생 의사진단 경험률[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,595	3.0(0.2)	6.6	5,311	1.4(0.2)	14.2	6,284	4.6(0.4)	8.0
연령									
19-29	1,036	1.2(0.4)	30.0	471	1.3(0.6)	45.6	565	1.2(0.4)	35.8
30-39	1,603	2.5(0.5)	21.8	758	1.2(0.3)	25.1	845	3.9(1.0)	26.1
40-49	1,957	2.3(0.4)	18.7	965	0.7(0.3)	46.4	992	3.9(0.8)	20.3
50-59	2,480	4.0(0.5)	12.4	1,179	1.6(0.4)	26.8	1,301	6.5(0.9)	13.6
60-69	1,933	4.8(0.7)	14.1	895	2.6(0.7)	25.2	1,038	6.6(1.1)	16.6
70 이상	2,586	4.2(0.6)	14.9	1,043	2.4(1.0)	41.4	1,543	5.5(0.8)	14.7

주 : 1) 우울증 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 우울증을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 167〉 고혈압 약물치료율[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	3,250	89.0(0.8)	0.9	1,358	83.2(1.5)	1.8	1,892	93.9(0.8)	0.8
30세 이상[2]	3,234	90.1(0.7)	0.8	1,343	85.4(1.3)	1.5	1,891	93.9(0.8)	0.8
연령									
19-29	16	-(-)	-	15	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	64	52.4(6.7)	12.7	45	46.7(8.4)	17.9	19	-(-)	-
40-49	197	76.2(3.6)	4.7	110	73.1(5.1)	7.0	87	81.3(5.1)	6.3
50-59	676	91.6(1.2)	1.3	292	89.0(1.8)	2.0	384	94.0(1.5)	1.6
60-69	839	93.1(1.3)	1.4	362	90.8(2.0)	2.3	477	94.8(1.5)	1.6
70 이상	1,458	94.7(0.8)	0.8	534	91.3(1.7)	1.8	924	96.8(0.6)	0.6

주 : 1) 고혈압 약물치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 약물치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 168〉 고혈압 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	신장질환 합병증검사 수진율[1] N	신장질환 합병증검사 수진율[1] %(표준오차)	신장질환 합병증검사 수진율[1] 변동계수	심장질환 합병증검사 수진율[2] N	심장질환 합병증검사 수진율[2] %(표준오차)	심장질환 합병증검사 수진율[2] 변동계수	뇌혈관질환 합병증검사 수진율[3] N	뇌혈관질환 합병증검사 수진율[3] %(표준오차)	뇌혈관질환 합병증검사 수진율[3] 변동계수
전체	3,230	17.1(0.9)	5.4	3,227	14.1(0.9)	6.3	3,225	11.2(0.8)	7.1
성									
남자	1,352	19.4(1.4)	7.2	1,351	15.1(1.3)	8.8	1,352	12.6(1.2)	9.7
여자	1,878	15.2(1.2)	7.6	1,876	13.3(1.1)	8.0	1,873	9.9(0.9)	9.5
30세 이상[4),5),6)]	3,214	17.2(0.9)	5.4	3,211	14.2(0.9)	6.4	3,209	11.2(0.8)	7.2
연령									
19-29	16	-(-)	-	16	-(-)	-	16	-(-)	-
30-39	64	12.6(3.8)	30.3	64	11.3(3.5)	30.9	64	11.0(3.2)	28.9
40-49	197	21.7(3.5)	16.0	196	17.8(3.2)	17.8	197	13.5(2.9)	21.8
50-59	675	18.4(2.0)	11.1	676	13.8(2.0)	14.4	674	10.8(1.6)	14.8
60-69	837	16.9(1.6)	9.7	835	15.7(1.5)	9.6	835	11.7(1.5)	13.2
70 이상	1,441	15.8(1.5)	9.4	1,440	12.6(1.3)	10.5	1,439	10.5(1.2)	11.1

주 : 1) 고혈압 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 심장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 /의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
4) 고혈압 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
5) 고혈압 심장질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
6) 고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 169〉 당뇨병 치료율[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	1,126	89.1(1.2)	1.3	538	87.7(1.7)	2.0	588	90.6(1.5)	1.7
30세 이상[2]	1,124	89.0(1.2)	1.3	537	87.6(1.7)	2.0	587	90.6(1.6)	1.7
연령									
19-29	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	20	54.1(10.5)	19.5	10	-(-)	-	10	-(-)	-
40-49	75	79.8(4.6)	5.7	48	74.8(6.5)	8.7	27	89.4(3.0)	3.3
50-59	242	86.6(3.0)	3.4	133	85.4(3.9)	4.6	109	88.2(4.6)	5.3
60-69	316	93.8(1.7)	1.8	160	93.1(2.2)	2.3	156	94.6(2.5)	2.6
70 이상	471	92.8(1.5)	1.6	186	95.4(2.2)	2.3	285	90.9(2.1)	2.3

주 : 1) 당뇨병 치료율 : (현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 치료율(≥30) : (현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 170〉 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 및 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율

(단위 : %)

구분	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율[1] N	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율[1] %(표준오차)	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율[1] 변동계수	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율[2] N	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율[2] %(표준오차)	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율[2] 변동계수
전체	1,124	27.3(1.6)	5.8	1,121	28.3(1.8)	6.2
성						
남자	537	26.0(2.1)	7.9	537	29.4(2.4)	8.1
여자	587	28.7(2.4)	8.2	584	27.0(2.3)	8.6
30세 이상[3),4)]	1,122	27.0(1.6)	5.8	1,120	28.1(1.8)	6.2
연령						
19-29	2	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	20	22.8(8.0)	35.2	20	23.5(6.7)	28.6
40-49	75	18.1(5.3)	29.4	75	22.0(5.5)	25.1
50-59	242	33.6(3.7)	11.1	242	34.7(4.5)	12.8
60-69	316	30.2(3.1)	10.4	316	30.5(3.2)	10.4
70 이상	469	22.5(2.4)	10.6	467	23.2(2.7)	11.4

주 : 1) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
4) 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 171〉 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	고혈압 관리교육 장소[1]						고혈압 관리교육 이수율[2]	
	병의원		한방병의원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	21.5(1.0)	4.7	1.4(0.3)	18.9	8.4(0.5)	6.2	27.0(1.1)	4.0
성								
남자	22.5(1.4)	6.4	1.6(0.5)	32.5	6.8(0.8)	11.5	27.2(1.6)	5.8
여자	20.7(1.2)	5.9	1.2(0.2)	16.7	9.6(0.7)	6.7	26.8(1.3)	4.9
30세 이상[3),4)]	21.5(1.0)	4.7	1.4(0.3)	19.2	8.5(0.5)	6.1	27.0(1.1)	4.0
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	20.3(5.4)	26.7	4.3(4.2)	96.6	6.5(4.5)	69.4	26.8(6.4)	23.9
40-49	25.7(3.5)	13.6	1.6(1.0)	60.8	2.1(1.0)	46.1	27.1(3.6)	13.1
50-59	24.4(2.3)	9.3	0.6(0.2)	39.3	7.2(1.0)	13.8	29.3(2.4)	8.1
60-69	20.0(1.6)	8.2	1.2(0.4)	29.6	6.3(0.8)	12.3	23.3(1.7)	7.5
70 이상	19.4(1.4)	7.3	1.6(0.4)	24.4	12.8(1.0)	7.5	28.0(1.5)	5.5

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 172〉 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	당뇨병 관리교육 장소[1]						당뇨병 관리교육 이수율[2]	
	병의원		한방병의원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	28.7(1.8)	6.2	1.5(0.4)	26.5	6.9(0.6)	9.3	32.8(1.9)	5.7
성								
남자	27.8(2.6)	9.5	0.9(0.4)	44.7	5.2(0.8)	15.0	30.9(2.7)	8.8
여자	29.7(2.5)	8.3	2.1(0.7)	33.0	8.8(1.1)	13.0	34.9(2.5)	7.2
30세 이상[3),4)]	28.5(1.8)	6.3	1.5(0.4)	26.5	6.9(0.6)	9.4	32.6(1.9)	5.7
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	38.4(13.6)	35.3	3.3(3.2)	99.1	13.5(4.1)	30.0	51.9(13.3)	25.7
40-49	45.3(7.5)	16.6	2.6(1.6)	64.1	5.1(2.0)	39.6	48.1(7.5)	15.6
50-59	27.4(3.9)	14.3	0.8(0.7)	84.1	3.7(1.1)	29.7	29.7(3.9)	13.2
60-69	28.2(2.9)	10.4	1.3(0.6)	45.1	6.5(1.1)	17.3	31.2(3.0)	9.6
70 이상	24.1(2.5)	10.4	1.7(0.8)	47.0	9.6(1.5)	15.7	30.0(2.6)	8.7

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 173〉 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(단위 : %)

구분	관절염 관리교육 장소[1]						관절염 관리교육 이수율[2]	
	병의원		한방병의원		보건소 (보건지소, 진료소, 의료원)			
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	20.0(1.0)	5.2	2.5(0.4)	14.0	4.2(0.4)	10.4	23.1(1.1)	4.7
성								
남자	20.6(2.4)	11.6	2.9(0.9)	30.2	3.5(0.7)	19.5	24.0(2.4)	9.8
여자	19.8(1.0)	5.3	2.4(0.4)	16.7	4.4(0.5)	10.6	22.8(1.1)	4.9
50세 이상[3),4)]	20.4(1.1)	5.5	2.6(0.4)	14.3	4.6(0.5)	10.5	23.6(1.1)	4.9
연령								
19-29	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	6.3(3.6)	57.4	5.7(5.6)	97.3	0.0(0.0)	.	12.0(6.5)	54.0
40-49	16.4(4.0)	24.5	1.3(0.5)	39.2	0.5(0.5)	100.2	16.4(4.0)	24.5
50-59	17.4(2.3)	13.2	2.0(0.8)	38.2	1.4(0.6)	44.9	18.6(2.3)	12.6
60-69	18.3(1.8)	9.7	3.3(0.7)	22.9	3.9(0.8)	19.5	20.9(1.9)	9.2
70 이상	23.5(1.6)	6.8	2.4(0.5)	18.8	6.9(0.9)	12.4	28.3(1.6)	5.8

주 : 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100
4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

〈표 174〉 천식증상경험률 및 운동성 천식이환율

(단위 : %)

구분	천식증상경험률[1]			운동성 천식이환율[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,591	3.3(0.2)	6.5	11,586	3.2(0.2)	7.5
성						
남자	5,307	3.1(0.3)	10.1	5,308	3.2(0.3)	10.5
여자	6,284	3.4(0.3)	8.2	6,278	3.2(0.3)	10.0
연령						
19-29	1,036	2.3(0.6)	25.7	1,036	3.1(0.7)	22.4
30-39	1,602	2.0(0.4)	17.6	1,602	2.1(0.4)	19.9
40-49	1,957	2.4(0.5)	20.4	1,956	2.6(0.5)	19.6
50-59	2,481	2.6(0.4)	15.4	2,478	2.2(0.4)	18.9
60-69	1,931	4.6(0.6)	12.3	1,933	3.2(0.5)	15.2
70 이상	2,584	7.7(0.8)	9.7	2,581	7.4(0.7)	9.4

주 : 1) 천식증상경험률 : (최근 1년(365일) 동안 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 운동성 천식이환율 : (최근 1년(365일) 동안 운동중이나 운동 후에 숨 쉴 때, 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 175〉 대사증후군 인지율[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,408	31.1(0.6)	2.1	5,247	28.7(0.8)	2.8	6,161	33.5(0.9)	2.7
연령									
19-29	1,028	18.8(1.4)	7.2	469	15.6(1.8)	11.5	559	22.5(1.9)	8.3
30-39	1,593	38.9(1.5)	3.9	752	31.4(1.9)	6.0	841	47.0(2.3)	4.9
40-49	1,950	44.2(1.5)	3.5	963	38.5(2.0)	5.2	987	50.3(2.1)	4.1
50-59	2,451	37.5(1.5)	4.0	1,165	33.9(1.8)	5.2	1,286	41.3(2.0)	4.8
60-69	1,896	25.0(1.5)	5.9	881	28.9(2.0)	7.1	1,015	21.7(1.8)	8.3
70 이상	2,490	8.8(1.0)	11.6	1,017	15.9(1.9)	11.8	1,473	3.7(0.8)	21.6

주 : 1) 대사증후군 인지율 : (대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 176〉 에이즈 인지율[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,336	81.4(0.5)	0.6	5,219	84.7(0.7)	0.8	6,117	78.1(0.7)	0.8
연령									
19-29	1,034	87.9(1.4)	1.5	471	85.7(2.0)	2.4	563	90.4(1.3)	1.5
30-39	1,600	94.6(0.6)	0.7	756	93.5(0.9)	1.0	844	95.7(0.8)	0.8
40-49	1,949	92.6(0.8)	0.9	962	93.2(1.1)	1.2	987	92.1(1.0)	1.1
50-59	2,454	87.3(1.0)	1.1	1,167	89.1(1.1)	1.3	1,287	85.4(1.4)	1.6
60-69	1,877	70.8(1.4)	2.0	876	77.5(1.7)	2.3	1,001	65.2(2.0)	3.0
70 이상	2,422	31.4(1.4)	4.4	987	45.3(2.2)	4.8	1,435	21.5(1.6)	7.4

주 : 1) 에이즈 인지율 : (에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 177〉 에이즈에 대한 지식 정답률 및 긍정적 태도율 (단위 : %)

구분	에이즈에 대한 지식 정답률[1]			에이즈에 대한 긍정적 태도율[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,966	39.2(1.0)	2.7	4,598	4.6(0.4)	8.9
성						
남자	2,046	43.1(1.4)	3.3	2,333	5.7(0.6)	11.2
여자	1,920	34.4(1.4)	4.2	2,265	3.2(0.5)	14.0
연령						
19-29	546	38.2(2.5)	6.7	527	5.8(1.3)	22.2
30-39	999	43.0(2.1)	4.9	919	3.0(0.6)	21.0
40-49	996	38.8(1.8)	4.7	1,052	6.7(1.0)	14.7
50-59	892	39.9(2.2)	5.5	1,181	3.8(0.6)	14.9
60-69	393	28.7(2.8)	9.9	626	2.3(0.8)	32.2
70 이상	140	29.9(5.3)	17.6	293	3.6(1.8)	50.6
생애주기별						
19-64	3,662	39.6(1.1)	2.7	4,037	4.7(0.4)	9.2
65 이상	304	30.6(3.1)	10.1	561	3.1(1.1)	35.1
교육수준[3]						
무학	53	15.4(8.1)	52.8	114	5.0(0.9)	18.3
초등학교	341	18.3(2.4)	13.2	580	3.8(1.4)	38.0
중학교	364	30.9(2.9)	9.4	572	1.9(0.5)	26.4
고등학교	1,708	35.4(1.5)	4.3	1,868	5.8(0.7)	11.8
대학교 이상	1,497	47.3(1.7)	3.6	1,462	4.0(0.6)	16.1
직업						
전문행정관리	626	49.3(2.4)	4.9	622	4.2(0.8)	20.1
사무직	447	45.9(3.0)	6.5	426	3.5(1.0)	28.6
판매·서비스직	567	36.2(2.4)	6.7	676	3.7(0.7)	18.2
농림어업	405	28.4(2.5)	8.8	591	2.9(0.8)	28.3
기능단순노무직	939	36.2(1.8)	5.0	1,067	6.3(0.9)	13.8
기타[4]	981	35.2(2.1)	5.9	1,216	4.5(0.9)	20.1
월 가구소득						
100만원 이하	227	21.9(3.1)	14.1	386	5.6(2.0)	34.7
101-200만원	463	33.8(3.3)	9.8	651	4.3(1.1)	24.4
201-300만원	780	38.1(2.5)	6.5	866	2.6(0.5)	19.3
301-400만원	759	39.7(2.3)	5.8	819	5.2(1.1)	21.6
401만원 이상	1,585	41.9(1.6)	3.9	1,676	5.2(0.6)	12.2
거주유형						
동	1,424	39.4(1.5)	3.7	1,606	4.2(0.6)	13.8
읍·면	2,542	38.8(1.3)	3.3	2,992	5.3(0.5)	8.9

주 : 1) 에이즈에 대한 지식 정답률 : (에이즈에 대한 지식 4문항†) 모두 정답에 응답한 사람의 수 / 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람 중 에이즈에 대한 지식 4문항에 대해 "예" 또는 "아니오"에 응답한 사람의 수) × 100
2) 에이즈에 대한 긍정적 태도율 : (에이즈에 대한 태도 4문항‡) 모두 긍정적 태도에 응답한 사람의 수 / 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람 중 에이즈에 대한 태도 4문항에 대해 "예" 또는 "아니오"에 응답한 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

† 에이즈에 대한 지식 문항 :
Q1. 콘돔으로 에이즈를 예방할 수 있다.
Q2. 에이즈에 걸린 사람도 건강해 보일 수 있다.
Q3. 모기로도 에이즈에 감염될 수 있다.
Q4. 에이즈에 감염된 사람과 함께 식사를 하면 에이즈에 감염될 수 있다.

‡ 에이즈에 대한 태도 문항 :
Q1. 가족 중 에이즈 감염인이 생긴다면 집에서 돌보겠다.
Q2. 에이즈 감염인이 일하는 가게에서도 채소나 과일을 사겠다.
Q3. 자녀가 에이즈 감염인과 같은 학교에 다니도록 허용하겠다.
Q4. 가족 중 에이즈 감염인이 있다면 가족 이외의 사람에게는 비밀로 하겠다.

〈표 178〉 심뇌혈관질환 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,489	44.6(0.7)	1.6	5,278	43.5(1.0)	2.3	6,211	45.6(0.9)	1.9
연령									
19-29	1,033	27.0(1.5)	5.7	470	21.3(2.2)	10.3	563	33.7(2.1)	6.3
30-39	1,600	55.7(1.5)	2.7	756	52.2(2.0)	3.9	844	59.4(2.0)	3.3
40-49	1,953	59.0(1.6)	2.7	963	57.0(2.1)	3.7	990	61.1(2.3)	3.8
50-59	2,472	52.4(1.5)	2.8	1,177	50.2(1.9)	3.8	1,295	54.7(1.9)	3.4
60-69	1,913	41.5(1.8)	4.4	887	44.0(2.3)	5.3	1,026	39.4(2.4)	6.1
70 이상	2,518	17.7(1.3)	7.6	1,025	24.7(2.2)	8.9	1,493	12.8(1.4)	11.3

주 : 1) 심뇌혈관질환 인지율 : (심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 179〉 심뇌혈관질환 매체 경험률[1]

(단위 : %)

구분	인터넷		TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등		병의원		보건기관 (보건소, 보건지소, 진료소)	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	17.8(0.8)	4.6	78.4(0.9)	1.1	39.1(1.1)	2.9	7.1(0.5)	7.1
성								
남자	20.1(1.2)	6.0	77.7(1.2)	1.5	39.3(1.5)	3.7	6.2(0.6)	10.3
여자	15.6(1.1)	6.8	79.0(1.1)	1.4	39.0(1.4)	3.7	8.0(0.7)	8.8
연령								
19-29	37.7(3.2)	8.6	74.7(2.9)	3.9	31.0(3.7)	11.9	10.3(2.2)	21.4
30-39	23.8(1.8)	7.6	80.2(1.7)	2.1	33.9(2.1)	6.2	7.4(1.1)	14.4
40-49	18.7(1.6)	8.6	80.4(1.6)	2.0	39.5(2.1)	5.2	6.1(0.8)	13.0
50-59	11.2(1.3)	11.4	77.4(1.6)	2.1	45.1(1.9)	4.3	5.8(0.7)	12.0
60-69	4.6(1.0)	21.0	76.6(2.4)	3.1	44.1(2.8)	6.4	6.2(1.0)	16.7
70 이상	1.8(0.8)	41.8	74.6(3.6)	4.9	40.1(4.3)	10.7	12.6(2.0)	16.2

주 : 1) 심뇌혈관질환 매체 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수) × 100

〈표 180〉 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,553	16.2(0.5)	3.1	5,299	15.1(0.6)	4.3	6,254	17.4(0.7)	4.2
연령									
19-29	1,035	9.2(1.0)	11.1	471	6.0(1.3)	21.1	564	12.9(1.7)	13.1
30-39	1,599	18.9(1.2)	6.6	755	16.7(1.7)	10.4	844	21.3(1.8)	8.5
40-49	1,955	23.1(1.3)	5.5	963	20.0(1.7)	8.2	992	26.5(1.8)	6.8
50-59	2,476	20.0(1.2)	5.8	1,176	18.7(1.5)	8.1	1,300	21.4(1.6)	7.7
60-69	1,929	15.2(1.2)	8.2	894	17.9(1.8)	10.0	1,035	12.9(1.6)	12.2
70 이상	2,559	5.3(0.7)	12.4	1,040	7.9(1.2)	15.2	1,519	3.4(0.6)	16.2

주 : 1) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율 : ('심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙' 에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

〈표 181〉 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률[1]

(단위 : %)

구분	인터넷		TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등		병의원		보건기관 (보건소, 보건지소, 진료소)	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	19.1(1.3)	6.7	57.9(1.6)	2.8	55.0(1.6)	2.9	16.7(1.0)	6.0
성								
남자	20.4(2.0)	9.6	57.5(2.3)	3.9	52.8(2.4)	4.6	15.7(1.5)	9.7
여자	18.0(1.7)	9.4	58.2(2.1)	3.5	56.9(2.0)	3.4	17.6(1.3)	7.5
연령								
19-29	37.8(5.3)	13.9	49.9(6.0)	11.9	46.8(5.9)	12.6	17.7(3.8)	21.4
30-39	25.2(2.8)	10.9	58.0(3.7)	6.3	47.9(3.6)	7.5	13.9(2.1)	15.3
40-49	18.6(2.2)	12.1	57.5(2.9)	5.1	58.1(3.1)	5.4	16.5(1.8)	10.7
50-59	15.5(2.3)	14.9	59.0(3.0)	5.1	60.6(2.9)	4.7	16.0(1.8)	11.6
60-69	5.9(1.8)	30.0	60.7(4.2)	6.9	60.1(4.5)	7.5	17.4(2.8)	16.3
70 이상	2.1(0.5)	23.8	65.1(5.4)	8.3	42.8(6.6)	15.4	32.8(5.8)	17.6

주 : 1) 심뇌혈관질환 예방관리수칙 매체 경험률 : (응답보기별 응답자 수 / '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙' 에 관한 홍보물을 본 적이 있는 사람의 수) × 100

〈표 182〉 필요의료서비스 미치료율 및 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 (단위 : %)

구분	필요의료서비스 미치료율[1]			필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	14.0(0.5)	3.3	1,782	15.2(1.1)	7.0
성						
남자	5,313	12.0(0.6)	5.2	660	11.2(1.4)	12.3
여자	6,288	15.9(0.6)	3.9	1,122	18.2(1.4)	7.9
연령						
19-29	1,036	11.6(1.2)	10.6	148	6.2(2.6)	41.3
30-39	1,603	15.8(1.2)	7.6	258	6.5(1.6)	24.3
40-49	1,957	13.9(1.0)	7.0	279	10.6(2.4)	23.0
50-59	2,481	13.8(0.9)	6.3	368	14.6(2.2)	15.4
60-69	1,934	12.1(0.9)	7.8	267	28.9(3.6)	12.6
70 이상	2,590	16.7(1.0)	5.8	462	33.9(3.3)	9.7
생애주기별						
19-64	8,060	13.6(0.5)	3.9	1,186	10.3(1.0)	10.2
65 이상	3,541	15.6(0.8)	5.2	596	35.1(2.9)	8.2
교육수준[3]						
무학	1,706	21.9(1.3)	5.9	389	32.7(3.4)	10.5
초등학교	2,307	15.2(0.9)	6.1	370	32.4(3.2)	9.8
중학교	1,390	12.9(1.1)	8.3	181	15.1(2.7)	18.0
고등학교	3,730	12.7(0.8)	6.1	498	11.1(1.8)	15.9
대학교 이상	2,458	13.3(0.8)	6.4	343	4.2(1.2)	29.2
직업						
전문행정관리	1,038	14.5(1.5)	10.3	156	4.6(2.2)	48.5
사무직	742	13.6(1.6)	11.9	115	4.9(1.8)	37.6
판매·서비스직	1,294	15.3(1.2)	7.8	211	10.1(2.6)	25.7
농림어업	2,099	16.7(1.0)	6.0	313	14.7(2.5)	17.3
기능단순노무직	2,411	15.2(1.0)	6.5	390	11.9(2.1)	17.3
기타[4]	4,015	11.8(0.6)	5.3	597	28.8(2.6)	8.9
월 가구소득						
100만원 이하	2,298	20.9(1.2)	5.8	493	39.2(3.2)	8.3
101-200만원	1,953	15.6(1.2)	7.6	287	21.5(3.2)	14.8
201-300만원	1,927	13.8(1.0)	7.4	286	8.8(2.1)	24.1
301-400만원	1,698	11.0(1.0)	8.8	207	5.6(2.1)	38.0
401만원 이상	3,086	12.8(0.9)	6.7	424	5.6(1.5)	26.7
거주유형						
동	3,231	12.8(0.7)	5.3	438	16.5(1.7)	10.5
읍·면	8,370	15.7(0.5)	3.4	1,344	13.6(1.1)	8.1

주 : 1) 필요의료서비스 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율 : (경제적 이유로 치료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 183〉 필요의료서비스 미치료 이유[1]

(단위 : %)

구분	N	경제적인 이유로		병의원 등에 예약을 하기 힘들어서		교통편이 불편해서		내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서		병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서		증상이 가벼워서		기 타	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체	11,600	2.1(0.2)	7.7	0.5(0.1)	19.4	1.0(0.1)	10.4	5.5(0.3)	4.9	0.8(0.1)	14.0	2.7(0.2)	8.1	1.5(0.2)	11.1
성															
남자	5,313	1.3(0.2)	13.6	0.4(0.1)	29.8	0.5(0.1)	22.2	5.5(0.4)	7.7	0.6(0.1)	23.4	2.6(0.3)	11.7	1.0(0.2)	18.8
여자	6,287	2.9(0.3)	8.8	0.5(0.1)	22.0	1.5(0.2)	11.6	5.5(0.4)	6.8	0.9(0.2)	17.8	2.7(0.3)	9.2	1.9(0.2)	12.5
연령															
19-29	1,036	0.7(0.3)	44.7	0.5(0.3)	50.8	0.6(0.3)	46.9	4.9(0.7)	15.1	0.5(0.2)	51.7	2.4(0.5)	22.2	2.0(0.5)	25.3
30-39	1,603	1.0(0.3)	25.5	0.8(0.3)	37.5	0.5(0.2)	32.5	7.7(0.8)	10.6	1.3(0.4)	28.6	2.9(0.5)	17.8	1.5(0.3)	23.0
40-49	1,957	1.5(0.4)	24.6	0.2(0.1)	54.4	0.5(0.2)	39.3	7.2(0.7)	9.3	0.6(0.2)	32.5	3.1(0.5)	17.6	0.8(0.2)	25.7
50-59	2,480	2.0(0.4)	17.6	0.5(0.2)	38.5	0.6(0.1)	22.7	5.7(0.6)	11.0	0.8(0.2)	24.6	2.5(0.4)	14.8	1.6(0.3)	20.6
60-69	1,934	3.5(0.6)	16.5	0.2(0.1)	40.6	0.7(0.1)	21.4	3.2(0.4)	12.5	0.7(0.2)	28.9	2.8(0.5)	18.1	1.0(0.3)	32.3
70 이상	2,590	5.7(0.7)	12.6	0.5(0.2)	32.3	3.9(0.4)	11.5	1.9(0.3)	13.8	0.6(0.2)	30.5	2.1(0.3)	12.2	2.1(0.4)	18.3
생애주기별															
19-64	8,059	1.4(0.2)	11.0	0.4(0.1)	23.0	0.6(0.1)	19.0	6.2(0.3)	5.2	0.8(0.1)	15.5	2.8(0.3)	9.3	1.4(0.2)	13.4
65 이상	3,541	5.5(0.6)	11.1	0.5(0.1)	27.6	3.0(0.3)	10.6	2.2(0.2)	11.0	0.6(0.1)	25.0	2.1(0.3)	12.4	1.8(0.3)	15.4
교육수준[2]															
무학	1,706	7.2(0.9)	13.0	0.7(0.2)	31.3	4.7(0.6)	12.8	2.4(0.4)	16.3	0.9(0.3)	31.3	2.4(0.4)	17.1	3.6(0.7)	19.8
초등학교	2,307	4.9(0.6)	13.1	0.2(0.1)	43.2	1.5(0.2)	15.1	4.1(0.5)	10.9	0.8(0.2)	31.0	2.4(0.4)	15.8	1.2(0.2)	21.5
중학교	1,389	1.9(0.4)	20.2	0.7(0.4)	54.1	0.6(0.2)	28.3	5.1(0.7)	14.1	0.4(0.2)	43.4	2.8(0.5)	16.1	1.2(0.5)	38.1
고등학교	3,730	1.4(0.3)	18.0	0.3(0.1)	43.9	0.7(0.2)	28.7	5.8(0.4)	7.6	0.7(0.2)	24.6	2.5(0.3)	13.6	1.3(0.3)	22.3
대학교 이상	2,458	0.6(0.2)	29.8	0.6(0.2)	31.5	0.2(0.1)	34.3	6.7(0.6)	8.9	0.9(0.2)	23.4	2.9(0.5)	15.3	1.4(0.3)	18.5
직업															
전문행정관리	1,038	0.7(0.4)	53.0	0.9(0.3)	33.2	0.3(0.1)	51.3	7.2(0.8)	11.5	1.4(0.4)	31.0	2.1(0.5)	23.5	1.9(0.7)	36.1
사무직	742	0.7(0.2)	37.1	0.4(0.2)	60.2	0.5(0.3)	49.8	7.4(1.4)	18.5	0.7(0.3)	42.2	2.2(0.6)	25.1	1.6(0.5)	32.7
판매·서비스직	1,294	1.5(0.4)	26.7	0.6(0.3)	52.3	0.2(0.1)	57.4	7.6(1.0)	13.6	0.9(0.3)	35.0	3.8(0.6)	15.5	0.7(0.2)	32.1
농림어업	2,098	2.4(0.5)	19.1	0.2(0.1)	46.7	1.9(0.3)	13.5	5.9(0.6)	9.8	1.0(0.3)	29.1	3.4(0.5)	14.3	1.7(0.4)	23.4
기능단순노무직	2,411	1.8(0.3)	18.3	0.5(0.2)	47.2	0.6(0.2)	37.2	7.8(0.8)	9.9	0.5(0.2)	37.1	3.0(0.5)	16.4	1.1(0.2)	21.9
기타[3]	4,015	3.4(0.4)	10.8	0.3(0.1)	27.0	1.7(0.2)	14.3	1.9(0.3)	15.1	0.6(0.2)	27.0	2.1(0.3)	12.7	1.8(0.3)	15.0
월 가구소득															
100만원 이하	2,298	8.2(0.9)	10.7	0.7(0.1)	20.8	3.5(0.4)	11.3	3.2(0.6)	17.9	1.0(0.2)	22.9	2.4(0.4)	15.0	1.9(0.3)	17.9
101-200만원	1,952	3.3(0.5)	16.3	0.2(0.1)	62.8	1.0(0.3)	25.4	6.0(0.8)	13.7	0.6(0.3)	46.8	3.1(0.6)	20.3	1.3(0.4)	28.5
201-300만원	1,927	1.2(0.3)	27.7	0.5(0.2)	51.6	0.6(0.2)	31.8	6.5(0.7)	11.1	0.6(0.2)	29.7	2.3(0.4)	16.6	2.1(0.3)	16.7
301-400만원	1,698	0.6(0.2)	39.3	0.3(0.1)	41.9	0.4(0.1)	26.8	5.5(0.7)	12.9	0.4(0.2)	40.8	2.6(0.4)	15.4	1.2(0.3)	22.1
401만원 이상	3,086	0.7(0.2)	27.7	0.6(0.2)	33.5	0.6(0.2)	29.1	5.9(0.5)	8.4	1.0(0.2)	23.1	2.8(0.4)	14.0	1.3(0.3)	23.1
거주유형															
동	3,231	2.1(0.2)	11.6	0.5(0.1)	26.9	0.4(0.1)	32.9	5.3(0.4)	7.5	0.8(0.2)	19.8	2.3(0.3)	13.9	1.3(0.2)	18.9
읍·면	8,369	2.1(0.2)	8.4	0.4(0.1)	19.2	1.8(0.1)	8.2	5.8(0.3)	5.7	0.7(0.1)	16.1	3.2(0.3)	8.0	1.8(0.2)	11.3

주 : 1) 필요의료서비스 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 184〉 연간 낙상 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	11,599	19.9(0.5)	2.6	5,311	18.8(0.7)	3.9	6,288	20.9(0.7)	3.2
65세이상[2]	3,540	26.7(1.0)	3.8	1,466	22.3(1.4)	6.4	2,074	29.9(1.3)	4.4
연령									
19-29	1,036	24.6(1.7)	6.8	471	25.3(2.6)	10.1	565	23.6(2.0)	8.5
30-39	1,603	15.1(1.0)	6.9	758	15.1(1.5)	10.0	845	15.2(1.6)	10.5
40-49	1,957	16.3(1.1)	6.8	965	17.1(1.5)	9.0	992	15.4(1.5)	10.1
50-59	2,480	18.0(1.0)	5.7	1,178	16.0(1.3)	8.4	1,302	20.1(1.4)	7.2
60-69	1,934	22.0(1.3)	5.8	896	19.1(1.8)	9.4	1,038	24.4(1.8)	7.4
70 이상	2,589	27.4(1.2)	4.5	1,043	22.6(1.7)	7.7	1,546	30.8(1.6)	5.1
생애주기별									
19-64	8,059	18.4(0.6)	3.1	3,845	18.2(0.8)	4.6	4,214	18.6(0.8)	4.1
65 이상	3,540	26.7(1.0)	3.9	1,466	22.3(1.5)	6.6	2,074	29.9(1.3)	4.5
교육수준[3]									
무학	1,706	30.8(1.5)	4.9	328	29.2(3.5)	11.9	1,378	31.1(1.6)	5.3
초등학교	2,307	25.8(1.2)	4.8	973	23.0(1.9)	8.1	1,334	27.7(1.6)	5.8
중학교	1,390	19.1(1.3)	6.7	684	18.6(1.9)	10.1	706	19.6(1.8)	9.0
고등학교	3,728	19.4(0.9)	4.7	1,923	19.9(1.2)	6.2	1,805	18.9(1.3)	6.7
대학교 이상	2,458	15.2(0.8)	5.4	1,400	15.4(1.1)	7.4	1,058	15.0(1.3)	8.5
직업									
전문행정관리	1,038	14.6(1.4)	9.3	545	14.1(1.8)	12.9	493	15.1(2.1)	14.1
사무직	742	14.8(1.4)	9.7	382	12.0(1.9)	15.5	360	18.5(2.3)	12.7
판매·서비스직	1,294	19.0(1.5)	7.9	423	19.9(2.8)	13.9	871	18.5(1.6)	8.6
농림어업	2,098	23.3(1.1)	4.7	1,203	20.9(1.4)	6.9	895	27.2(1.6)	6.0
기능단순노무직	2,411	19.8(1.0)	4.8	1,586	18.9(1.2)	6.4	825	22.0(1.7)	7.9
기타[4]	4,014	22.7(1.0)	4.3	1,171	23.0(1.7)	7.4	2,843	22.5(1.0)	4.6
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	30.8(1.3)	4.1	864	26.0(2.1)	8.0	1,434	34.0(1.5)	4.4
101-200만원	1,952	23.5(1.3)	5.6	897	21.3(1.8)	8.6	1,055	25.6(1.8)	7.2
201-300만원	1,926	20.4(1.3)	6.6	938	20.7(2.0)	9.7	988	19.9(1.6)	8.1
301-400만원	1,698	17.3(1.1)	6.4	831	18.3(1.7)	9.3	867	16.2(1.6)	10.0
401만원 이상	3,086	15.8(0.8)	5.2	1,504	15.2(1.0)	6.8	1,582	16.5(1.1)	6.8
거주유형									
동	3,230	19.0(0.8)	4.1	1,466	18.5(1.1)	6.1	1,764	19.6(1.0)	5.2
읍·면	8,369	21.0(0.6)	2.7	3,845	19.2(0.8)	4.1	4,524	23.0(0.7)	3.1

주 : 1) 연간 낙상 경험률 : (연간 낙상 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 연간 낙상 경험률(≥65) : (연간 낙상 경험자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 185〉 연간 낙상 건수율[1]

(단위 : 건 / 인구 1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
전체	11,599	356.6(11.4)	3.2	5,311	346.3(16.3)	4.7	6,288	366.9(15.2)	4.1
65세이상[2]	3,540	464.0(20.9)	4.5	1,466	373.5(27.0)	7.2	2,074	528.2(27.5)	5.2
연령									
19-29	1,036	534.7(42.0)	7.9	471	528.3(61.2)	11.6	565	542.3(54.3)	10.0
30-39	1,603	290.3(21.0)	7.2	758	310.6(34.0)	11.0	845	268.7(33.7)	12.6
40-49	1,957	251.1(18.1)	7.2	965	276.6(26.4)	9.5	992	223.8(24.6)	11.0
50-59	2,480	287.4(18.5)	6.5	1,178	270.2(24.7)	9.2	1,302	305.3(24.9)	8.2
60-69	1,934	385.5(29.3)	7.6	896	368.5(48.1)	13.0	1,038	399.7(38.0)	9.5
70 이상	2,589	470.3(24.3)	5.2	1,043	358.7(32.2)	9.0	1,546	547.9(32.2)	5.9
생애주기별									
19-64	8,059	333.7(12.7)	3.8	3,845	341.7(18.5)	5.4	4,214	325.2(17.3)	5.3
65 이상	3,540	464.0(21.2)	4.6	1,466	373.5(27.3)	7.3	2,074	528.2(28.3)	5.3
교육수준[3]									
무학	1,706	548.1(32.2)	5.9	328	467.7(63.3)	13.5	1,378	567.5(38.0)	6.7
초등학교	2,307	428.4(22.1)	5.2	973	402.8(33.0)	8.2	1,334	446.4(29.7)	6.7
중학교	1,390	338.3(28.4)	8.4	684	346.1(37.8)	10.9	706	331.7(40.3)	12.2
고등학교	3,728	365.6(20.8)	5.7	1,923	377.5(29.6)	7.8	1,805	352.1(29.4)	8.3
대학교 이상	2,458	269.1(17.8)	6.6	1,400	282.7(24.3)	8.6	1,058	249.6(25.8)	10.4
직업									
전문행정관리	1,038	245.8(24.8)	10.1	545	229.3(30.9)	13.5	493	265.0(42.1)	15.9
사무직	742	258.8(30.8)	11.9	382	204.0(32.7)	16.0	360	333.8(58.0)	17.4
판매·서비스직	1,294	372.6(38.5)	10.3	423	418.5(73.3)	17.5	871	345.6(41.3)	12.0
농림어업	2,098	429.9(26.8)	6.2	1,203	410.7(36.9)	9.0	895	461.1(30.5)	6.6
기능단순노무직	2,411	349.6(22.2)	6.3	1,586	351.4(28.7)	8.2	825	345.1(31.8)	9.2
기타[4]	4,014	403.8(21.4)	5.3	1,171	412.2(39.6)	9.6	2,843	399.6(22.7)	5.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	559.3(30.4)	5.4	864	494.4(54.6)	11.0	1,434	603.4(35.0)	5.8
101-200만원	1,952	419.0(35.4)	8.5	897	376.8(44.8)	11.9	1,055	458.1(47.1)	10.3
201-300만원	1,926	383.1(30.6)	8.0	938	408.6(50.0)	12.2	988	355.0(37.0)	10.4
301-400만원	1,698	301.9(23.4)	7.7	831	323.1(31.7)	9.8	867	278.9(36.3)	13.0
401만원 이상	3,086	279.2(17.4)	6.2	1,504	281.9(24.5)	8.7	1,582	276.2(21.4)	7.8
거주유형									
동	3,230	339.7(16.6)	4.9	1,466	337.4(24.3)	7.2	1,764	342.0(22.6)	6.6
읍·면	8,369	381.2(13.9)	3.6	3,845	358.8(19.2)	5.3	4,524	404.6(17.1)	4.2

주 : 1) 연간 낙상 건수율 : (연간 낙상 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000
2) 연간 낙상 건수율(≥65) : (연간 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 1,000
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 186〉 장소별 낙상 분포[1]

(단위 : %)

구분	N	집 안												집 밖									
		화장실 / 욕조		방		부엌		거실 / 마루		계단		기타 집안		농어업시설		운송지역		스포츠 / 운동장소		상업 또는 서비스시설		기타 집밖	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	4,292	4.0(0.5)	11.4	2.5(0.3)	12.0	0.9(0.2)	18.7	3.3(0.4)	13.1	3.9(0.6)	15.7	3.7(0.3)	8.5	9.0(0.6)	7.0	6.3(0.8)	12.2	13.3(1.3)	10.1	10.0(0.7)	6.9	43.1(1.5)	3.6
성																							
남자	1,775	3.3(0.7)	19.7	1.2(0.3)	25.0	0.2(0.1)	51.5	1.2(0.3)	24.2	1.9(0.5)	24.9	1.6(0.3)	21.1	10.3(1.1)	10.2	5.5(0.9)	16.6	22.8(2.5)	10.8	8.5(1.1)	13.3	43.6(2.2)	5.0
여자	2,517	4.7(0.6)	12.4	3.7(0.5)	14.4	1.5(0.3)	20.2	5.3(0.8)	14.7	5.8(1.1)	18.8	5.7(0.6)	9.7	7.7(0.7)	8.8	7.1(1.1)	15.8	4.4(0.9)	19.7	11.3(1.2)	10.3	42.7(2.1)	5.0
65세이상[2]	1,684	5.5(0.7)	13.3	5.5(0.7)	13.6	2.1(0.4)	19.3	5.9(0.7)	12.7	4.9(0.7)	15.0	9.1(0.8)	8.6	16.9(1.4)	8.1	5.1(0.7)	13.9	2.4(0.4)	16.7	4.1(0.8)	18.4	38.6(1.8)	4.7
연령																							
19-29	566	4.4(1.1)	24.8	1.4(0.5)	36.0	0.1(0.1)	99.7	2.3(1.1)	46.5	3.4(2.0)	57.6	0.4(0.2)	45.8	0.6(0.4)	59.9	3.7(1.2)	32.8	24.5(4.0)	16.5	8.5(1.5)	17.2	50.8(3.8)	7.6
30-39	472	5.3(1.4)	25.7	0.8(0.3)	43.1	0.3(0.1)	48.7	0.9(0.4)	46.7	2.3(0.8)	35.1	3.0(0.7)	22.0	1.4(0.9)	61.7	8.9(2.0)	22.5	13.3(2.4)	17.7	18.0(2.6)	14.2	45.7(3.6)	7.9
40-49	521	3.0(0.8)	25.5	1.7(0.9)	52.5	0.6(0.6)	99.6	3.9(1.0)	26.6	4.0(1.3)	32.4	2.5(0.9)	37.3	7.3(1.6)	22.6	10.6(2.4)	23.0	14.0(2.4)	17.2	13.1(2.3)	17.4	39.3(3.2)	8.1
50-59	725	2.2(0.5)	24.0	1.7(0.6)	31.9	0.6(0.4)	57.8	3.0(1.3)	42.5	5.5(1.5)	28.0	3.0(0.6)	21.0	15.9(2.0)	12.4	5.4(1.2)	21.4	9.5(2.5)	26.2	11.5(1.9)	16.9	41.5(3.1)	7.5
60-69	756	2.2(0.6)	26.8	2.8(0.9)	31.2	1.1(0.4)	36.3	3.4(1.0)	28.2	2.5(0.7)	26.7	6.0(1.0)	17.4	21.5(3.2)	14.8	6.8(1.7)	24.2	9.2(4.2)	46.3	4.9(1.3)	26.6	39.7(4.2)	10.5
70 이상	1,252	6.3(1.1)	17.0	6.7(1.1)	16.2	2.7(0.6)	21.4	6.7(1.0)	14.6	5.7(1.1)	19.2	9.8(1.2)	12.7	14.6(1.3)	9.3	4.8(0.9)	19.2	2.0(0.5)	25.7	4.4(1.1)	25.0	36.4(2.4)	6.5

주 : 1) 장소별 낙상 분포 : (장소별 낙상 건수 / 낙상 건수) × 100
2) 장소별 낙상 분포(≥65) : (장소별 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자의 낙상 건수) × 100

〈표 187〉 원인별 낙상 분포[1]

(단위 : %)

구분	N	바닥이 미끄러워서		사람이나 사물에 부딪혀서		보도나 문의 턱에 걸려		경사가 급해서		조명이 어두워서		다리를 접질려서		갑자기 어지러워서		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	4,292	33.3(1.2)	3.5	11.9(1.0)	8.0	16.6(0.9)	5.7	4.4(0.5)	12.4	2.1(0.6)	29.1	19.9(1.0)	5.2	7.9(0.6)	8.1	3.9(0.5)	12.2
성																	
남자	1,775	35.8(1.6)	4.6	15.9(1.7)	10.8	12.1(1.1)	8.9	6.2(0.9)	14.7	2.5(1.1)	44.2	17.9(1.5)	8.5	4.9(0.8)	15.4	4.7(0.8)	17.3
여자	2,517	30.9(1.7)	5.3	8.1(0.9)	11.1	20.9(1.6)	7.7	2.7(0.6)	22.9	1.7(0.5)	28.5	21.8(1.3)	6.0	10.7(1.0)	9.3	3.2(0.5)	16.3
65세이상[2]	1,684	25.4(1.5)	5.8	8.0(1.2)	15.5	14.7(1.3)	8.7	4.8(0.8)	17.5	1.2(0.4)	36.6	17.6(1.3)	7.6	24.0(1.5)	6.5	4.4(0.7)	15.3
연령																	
19-29	566	27.4(2.7)	10.0	17.4(3.0)	17.3	18.8(2.5)	13.5	3.0(1.0)	32.8	2.6(1.0)	37.2	25.7(2.9)	11.2	1.8(0.9)	48.7	3.4(1.1)	31.8
30-39	472	40.6(2.9)	7.2	8.9(1.7)	18.7	17.8(2.3)	13.2	2.8(1.4)	49.3	5.5(3.5)	63.8	20.6(2.3)	11.2	1.8(0.8)	46.8	2.0(0.7)	35.0
40-49	521	42.5(3.0)	7.1	14.0(2.1)	14.9	15.0(2.1)	13.9	3.4(1.2)	34.2	0.5(0.3)	57.2	17.3(2.2)	12.4	3.1(0.7)	23.8	4.3(1.2)	28.4
50-59	725	38.0(2.7)	7.1	10.1(1.8)	17.5	17.8(2.1)	11.8	6.3(1.1)	16.9	0.8(0.4)	43.8	16.3(2.0)	12.5	5.5(1.1)	20.9	5.2(1.4)	26.4
60-69	756	33.8(2.7)	8.1	11.0(2.0)	18.5	13.6(2.2)	15.9	8.5(2.3)	27.0	1.1(0.6)	53.4	17.4(2.3)	13.3	10.5(1.9)	18.5	4.1(1.2)	28.9
70 이상	1,252	22.8(1.6)	7.0	6.5(1.0)	15.4	14.7(1.6)	10.6	4.0(0.6)	15.4	1.5(0.6)	39.1	17.9(1.5)	8.5	27.8(2.3)	8.1	4.8(0.8)	16.7

주 : 1) 원인별 낙상 분포 : (원인별 낙상 건수 / 낙상 건수) × 100
2) 원인별 낙상 분포(≥65) : (원인별 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자의 낙상 건수) × 100

〈표 188〉 낙상에 대한 두려움[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,595	31.8(0.6)	2.0	5,307	20.6(0.8)	3.7	6,288	42.9(0.9)	2.1
65세이상[2]	3,541	63.8(1.1)	1.7	1,467	46.5(1.8)	3.9	2,074	76.2(1.1)	1.4
연령									
19-29	1,036	21.7(1.6)	7.4	471	15.8(2.0)	12.8	565	28.6(2.3)	7.9
30-39	1,602	18.1(1.1)	6.1	757	11.6(1.2)	10.7	845	25.1(1.6)	6.5
40-49	1,957	23.7(1.3)	5.5	965	16.1(1.7)	10.8	992	31.8(2.0)	6.3
50-59	2,479	30.7(1.4)	4.6	1,177	18.9(1.5)	7.9	1,302	43.0(2.1)	4.8
60-69	1,931	44.4(1.5)	3.4	893	26.1(2.0)	7.8	1,038	59.7(2.2)	3.8
70 이상	2,590	69.6(1.4)	1.9	1,044	53.6(2.3)	4.3	1,546	80.8(1.3)	1.6
생애주기별									
19-64	8,054	24.9(0.7)	2.8	3,840	16.2(0.8)	4.9	4,214	34.3(1.0)	2.9
65 이상	3,541	63.8(1.1)	1.8	1,467	46.5(1.8)	3.9	2,074	76.2(1.2)	1.5
교육수준[3]									
무학	1,706	75.7(1.4)	1.8	328	61.0(3.6)	5.8	1,378	79.2(1.4)	1.8
초등학교	2,305	51.1(1.5)	2.9	971	37.0(2.0)	5.5	1,334	60.9(1.9)	3.2
중학교	1,389	35.5(1.7)	4.8	683	26.5(2.1)	8.0	706	43.0(2.6)	6.0
고등학교	3,727	24.6(0.9)	3.9	1,922	17.5(1.1)	6.4	1,805	32.7(1.4)	4.3
대학교 이상	2,458	19.8(1.1)	5.4	1,400	14.3(1.1)	7.8	1,058	27.7(1.8)	6.4
직업									
전문행정관리	1,038	19.4(1.7)	8.6	545	12.6(1.8)	14.2	493	27.4(2.7)	9.9
사무직	742	16.3(1.6)	10.0	382	10.7(1.9)	17.6	360	24.1(2.8)	11.8
판매·서비스직	1,294	29.3(1.8)	6.1	423	19.3(2.5)	13.1	871	35.2(2.3)	6.4
농림어업	2,095	38.2(1.3)	3.4	1,200	27.6(1.5)	5.3	895	55.5(2.1)	3.7
기능단순노무직	2,411	23.5(1.1)	4.7	1,586	16.9(1.2)	6.8	825	40.5(2.3)	5.6
기타[4]	4,013	45.3(1.2)	2.6	1,170	32.7(1.9)	5.9	2,843	51.6(1.3)	2.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,296	62.7(1.5)	2.4	862	46.4(2.5)	5.3	1,434	73.7(1.6)	2.1
101-200만원	1,952	39.4(1.6)	4.0	897	27.0(2.2)	8.3	1,055	50.8(2.0)	3.9
201-300만원	1,926	28.5(1.4)	4.9	938	19.7(2.0)	10.1	988	38.1(1.8)	4.7
301-400만원	1,697	25.0(1.4)	5.8	830	15.9(1.8)	11.6	867	34.8(2.0)	5.9
401만원 이상	3,086	23.7(1.1)	4.6	1,504	14.7(1.1)	7.6	1,582	33.5(1.6)	4.7
거주유형									
동	3,231	31.7(1.0)	3.1	1,467	21.3(1.2)	5.7	1,764	41.9(1.3)	3.2
읍·면	8,364	31.8(0.7)	2.2	3,840	19.7(0.7)	3.6	4,524	44.5(1.0)	2.2

주 : 1) 낙상에 대한 두려움 : (평소 넘어지는 것에 대해 “약간” 또는 “많이” 두려워한다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 낙상에 대한 두려움(≥65) : 평소 넘어지는 것에 대해 “약간” 또는 “많이” 두려워한다고 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 189〉 연간 사고중독 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	8.3(0.4)	4.3	5,312	9.1(0.5)	5.9	6,287	7.5(0.4)	5.9
연령									
19-29	1,036	9.0(1.3)	14.0	471	11.3(2.0)	17.8	565	6.2(1.3)	20.4
30-39	1,603	6.3(0.7)	11.1	758	7.2(1.1)	14.9	845	5.3(0.9)	16.3
40-49	1,957	7.0(0.7)	10.6	965	8.1(1.1)	13.7	992	5.7(1.0)	16.6
50-59	2,479	8.4(0.8)	9.1	1,178	7.8(1.0)	12.3	1,301	9.0(1.2)	13.8
60-69	1,934	8.4(0.9)	10.6	896	9.5(1.5)	16.1	1,038	7.4(1.0)	13.9
70 이상	2,590	12.4(0.9)	6.9	1,044	12.7(1.3)	10.0	1,546	12.2(1.1)	8.8
생애주기별									
19-64	8,058	7.7(0.4)	5.4	3,845	8.7(0.6)	7.0	4,213	6.6(0.5)	7.9
65 이상	3,541	11.3(0.7)	5.8	1,467	11.6(1.0)	8.7	2,074	11.0(0.9)	7.8
교육수준[2]									
무학	1,706	12.2(1.0)	8.0	328	20.0(2.8)	14.0	1,378	10.3(0.9)	8.9
초등학교	2,307	10.3(0.9)	8.6	973	10.4(1.3)	12.7	1,334	10.2(1.1)	10.9
중학교	1,389	8.8(1.0)	11.2	683	9.9(1.4)	14.3	706	7.9(1.3)	16.8
고등학교	3,729	7.3(0.6)	7.8	1,925	8.1(0.8)	10.0	1,804	6.4(0.8)	12.2
대학교 이상	2,458	7.5(0.7)	9.5	1,400	8.7(1.2)	13.3	1,058	5.9(0.9)	15.4
직업									
전문행정관리	1,038	9.0(1.2)	13.3	545	8.6(1.8)	21.3	493	9.4(1.8)	19.7
사무직	742	5.4(1.1)	19.5	382	5.0(1.5)	29.7	360	6.1(1.4)	23.3
판매·서비스직	1,293	7.1(0.9)	12.7	423	8.9(1.9)	20.8	870	6.1(1.0)	16.6
농림어업	2,099	9.7(0.7)	7.1	1,204	10.3(0.9)	8.8	895	8.6(0.9)	11.0
기능단순노무직	2,410	8.7(0.8)	8.9	1,585	8.9(0.9)	10.6	825	8.2(1.4)	16.8
기타[3]	4,015	8.6(0.6)	6.5	1,172	11.0(1.2)	10.5	2,843	7.4(0.6)	8.2
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	11.4(0.8)	6.8	864	11.7(1.3)	10.8	1,434	11.2(1.0)	8.7
101-200만원	1,953	8.8(0.8)	9.5	898	10.4(1.4)	13.0	1,055	7.3(1.1)	14.9
201-300만원	1,927	8.0(0.8)	10.4	939	9.4(1.2)	13.0	988	6.5(1.0)	15.3
301-400만원	1,698	6.8(0.8)	11.2	831	7.5(1.1)	15.1	867	6.0(1.0)	17.0
401만원 이상	3,084	7.6(0.7)	9.8	1,503	8.1(1.1)	13.9	1,581	7.2(0.8)	11.4
거주유형									
동	3,231	7.5(0.5)	7.1	1,467	8.6(0.8)	9.8	1,764	6.4(0.7)	10.3
읍·면	8,368	9.5(0.4)	4.2	3,845	9.8(0.5)	5.5	4,523	9.2(0.5)	5.7

주 : 1) 연간 사고중독 경험률 : (연간 사고중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 190〉 연간 사고중독 건수율[1]

(단위 : 건 / 인구 1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
전체	11,599	101.1(4.6)	4.5	5,312	111.3(7.3)	6.5	6,287	90.9(5.6)	6.1
연령									
19-29	1,036	108.2(17.0)	15.7	471	132.3(26.8)	20.2	565	79.8(19.3)	24.2
30-39	1,603	72.7(7.7)	10.6	758	87.1(11.9)	13.7	845	57.3(9.4)	16.4
40-49	1,957	85.0(9.6)	11.3	965	98.5(15.1)	15.3	992	70.5(11.1)	15.8
50-59	2,479	102.1(10.1)	9.9	1,178	100.0(14.4)	14.4	1,301	104.3(14.2)	13.6
60-69	1,934	103.3(11.1)	10.7	896	123.3(20.9)	17.0	1,038	86.7(11.5)	13.3
70 이상	2,590	156.2(11.2)	7.2	1,044	155.9(16.7)	10.7	1,546	156.4(13.6)	8.7
생애주기별									
19-64	8,058	92.4(5.2)	5.6	3,845	105.1(8.1)	7.7	4,213	78.7(6.4)	8.2
65 이상	3,541	141.9(8.6)	6.1	1,467	147.9(14.1)	9.6	2,074	137.6(10.4)	7.5
교육수준[2]									
무학	1,706	151.3(12.7)	8.4	328	239.0(34.4)	14.4	1,378	130.2(11.9)	9.1
초등학교	2,307	137.2(12.9)	9.4	973	146.4(21.7)	14.8	1,334	130.8(14.7)	11.3
중학교	1,389	113.7(13.6)	11.9	683	144.4(24.0)	16.6	706	87.7(13.9)	15.8
고등학교	3,729	85.8(7.5)	8.7	1,925	96.6(11.6)	12.0	1,804	73.5(8.7)	11.9
대학교 이상	2,458	87.8(9.0)	10.3	1,400	98.2(13.4)	13.7	1,058	72.8(13.1)	18.0
직업									
전문행정관리	1,038	115.5(15.7)	13.6	545	109.4(19.7)	18.0	493	122.6(27.5)	22.4
사무직	742	63.5(12.3)	19.4	382	53.7(15.9)	29.6	360	77.0(18.2)	23.7
판매·서비스직	1,293	79.1(9.6)	12.1	423	91.9(18.7)	20.4	870	71.7(11.4)	15.9
농림어업	2,099	120.3(9.7)	8.1	1,204	126.5(12.3)	9.7	895	110.3(14.6)	13.3
기능단순노무직	2,410	106.9(11.8)	11.1	1,585	111.3(15.1)	13.6	825	95.8(16.5)	17.3
기타[3]	4,015	104.0(7.1)	6.8	1,172	138.0(15.9)	11.5	2,843	87.1(6.8)	7.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	152.0(12.8)	8.4	864	161.8(25.0)	15.5	1,434	145.4(12.6)	8.7
101-200만원	1,953	110.7(10.3)	9.3	898	138.2(17.3)	12.5	1,055	85.2(12.3)	14.4
201-300만원	1,927	103.9(14.2)	13.6	939	132.1(24.0)	18.2	988	72.8(12.1)	16.6
301-400만원	1,698	81.2(10.7)	13.2	831	83.7(12.9)	15.5	867	78.5(17.4)	22.1
401만원 이상	3,084	85.8(8.1)	9.4	1,503	88.7(11.8)	13.3	1,581	82.6(9.3)	11.2
거주유형									
동	3,231	88.2(6.7)	7.6	1,467	105.5(11.5)	10.9	1,764	71.5(7.8)	10.9
읍·면	8,368	119.8(5.4)	4.5	3,845	119.5(6.7)	5.6	4,523	120.0(7.4)	6.2

주 : 1) 연간 사고중독 건수율 : (연간 사고중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 191〉 양호한 주관적 건강수준 인지율[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	43.8(0.7)	1.5	5,312	49.1(1.0)	2.0	6,286	38.6(0.8)	2.0
연령									
19-29	1,036	64.2(1.8)	2.8	471	69.5(2.6)	3.7	565	58.1(2.3)	3.9
30-39	1,602	49.5(1.6)	3.3	758	53.0(2.2)	4.1	844	45.8(2.1)	4.7
40-49	1,957	46.4(1.4)	3.0	965	47.9(1.9)	4.1	992	44.9(2.1)	4.6
50-59	2,479	42.7(1.4)	3.2	1,178	47.5(1.9)	3.9	1,301	37.7(1.8)	4.7
60-69	1,934	29.9(1.5)	5.1	896	36.5(2.2)	6.1	1,038	24.5(1.8)	7.5
70 이상	2,590	17.4(1.1)	6.2	1,044	22.9(1.7)	7.6	1,546	13.5(1.3)	9.6
생애주기별									
19-64	8,057	48.9(0.8)	1.5	3,845	53.0(1.1)	2.1	4,212	44.5(1.0)	2.2
65 이상	3,541	20.2(1.0)	4.9	1,467	26.1(1.5)	5.9	2,074	15.9(1.2)	7.5
교육수준[2]									
무학	1,706	15.5(1.2)	7.5	328	20.9(2.8)	13.3	1,378	14.2(1.3)	9.4
초등학교	2,307	23.6(1.1)	4.8	973	26.3(1.8)	6.8	1,334	21.6(1.6)	7.3
중학교	1,389	35.1(1.5)	4.2	684	37.5(2.4)	6.3	705	33.0(2.0)	5.9
고등학교	3,729	51.0(1.1)	2.2	1,925	54.5(1.5)	2.7	1,804	47.1(1.5)	3.1
대학교 이상	2,457	53.6(1.2)	2.3	1,399	54.9(1.6)	2.9	1,058	51.8(1.8)	3.4
직업									
전문행정관리	1,038	53.1(1.8)	3.4	545	54.5(2.4)	4.5	493	51.5(2.8)	5.4
사무직	742	52.1(2.0)	3.8	382	52.4(3.0)	5.7	360	51.7(3.0)	5.9
판매·서비스직	1,294	47.5(1.7)	3.6	423	51.9(3.3)	6.3	871	45.0(2.2)	4.8
농림어업	2,099	35.1(1.2)	3.5	1,204	40.5(1.7)	4.1	895	26.4(1.8)	6.9
기능단순노무직	2,410	46.3(1.3)	2.8	1,586	50.0(1.6)	3.1	824	37.1(2.1)	5.7
기타[3]	4,013	37.3(1.2)	3.2	1,171	45.9(2.1)	4.6	2,842	33.1(1.3)	3.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	18.7(1.2)	6.2	864	27.0(2.2)	8.0	1,433	13.1(1.1)	8.7
101-200만원	1,953	36.8(1.8)	4.8	898	41.3(2.5)	6.1	1,055	32.6(2.0)	6.2
201-300만원	1,926	45.1(1.6)	3.6	938	48.1(2.2)	4.5	988	41.9(2.1)	5.1
301-400만원	1,698	46.5(1.6)	3.4	831	48.5(2.2)	4.5	867	44.4(2.2)	5.0
401만원 이상	3,085	53.4(1.2)	2.3	1,504	58.6(1.7)	2.8	1,581	47.7(1.6)	3.4
거주유형									
동	3,231	46.2(1.0)	2.1	1,467	50.6(1.5)	2.9	1,764	41.9(1.2)	2.8
읍·면	8,367	40.5(0.7)	1.7	3,845	47.0(1.0)	2.1	4,522	33.7(0.8)	2.5

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 "매우 좋음" 또는 "좋음"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 192〉 침상와병 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체 N	전체 %(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 %(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 %(표준오차)	여자 변동계수
전체	11,600	5.6(0.3)	4.9	5,312	3.9(0.3)	8.7	6,288	7.3(0.4)	5.8
연령									
19-29	1,036	5.5(0.8)	14.3	471	4.2(1.1)	25.3	565	7.0(1.1)	16.0
30-39	1,603	5.7(0.7)	12.1	758	4.8(0.8)	17.3	845	6.7(1.0)	15.3
40-49	1,957	4.5(0.5)	11.7	965	2.7(0.5)	18.3	992	6.4(1.0)	15.2
50-59	2,481	3.8(0.5)	12.5	1,179	2.9(0.6)	19.8	1,302	4.7(0.8)	16.3
60-69	1,934	6.6(0.7)	11.1	896	3.4(0.7)	21.3	1,038	9.3(1.1)	12.2
70 이상	2,589	9.3(0.8)	9.1	1,043	6.9(1.3)	18.5	1,546	11.0(1.1)	9.8
생애주기별									
19-64	8,060	4.9(0.3)	5.8	3,846	3.6(0.3)	9.7	4,214	6.4(0.5)	7.4
65 이상	3,540	8.8(0.7)	7.9	1,466	6.1(1.0)	16.0	2,074	10.7(0.9)	8.4
교육수준[2]									
무학	1,705	11.5(1.2)	10.3	327	11.3(3.5)	31.3	1,378	11.6(1.2)	10.4
초등학교	2,307	7.7(0.7)	8.7	973	5.3(0.8)	14.5	1,334	9.3(0.9)	10.1
중학교	1,390	6.6(0.9)	14.2	684	5.4(1.1)	20.4	706	7.6(1.5)	19.1
고등학교	3,730	4.3(0.4)	8.9	1,925	3.3(0.5)	14.1	1,805	5.4(0.7)	12.4
대학교 이상	2,458	4.5(0.5)	10.4	1,400	3.3(0.6)	16.9	1,058	6.3(0.8)	13.0
직업									
전문행정관리	1,038	4.4(0.7)	16.4	545	4.0(1.0)	24.1	493	4.9(1.1)	23.4
사무직	742	3.4(0.7)	21.2	382	2.8(1.0)	34.6	360	4.3(1.1)	25.8
판매·서비스직	1,294	5.4(0.8)	15.7	423	3.6(1.1)	31.4	871	6.5(1.2)	18.1
농림어업	2,099	4.9(0.5)	11.1	1,204	3.5(0.6)	17.3	895	7.2(1.0)	13.7
기능단순노무직	2,411	4.3(0.5)	11.8	1,586	3.3(0.5)	16.4	825	7.1(1.2)	16.8
기타[3]	4,014	7.7(0.6)	7.2	1,171	5.8(0.9)	16.1	2,843	8.7(0.7)	7.9
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	10.2(0.8)	7.8	864	7.7(1.4)	17.9	1,434	12.0(0.9)	7.5
101-200만원	1,953	6.8(0.8)	11.5	898	4.6(0.9)	19.6	1,055	8.9(1.2)	13.0
201-300만원	1,927	5.0(0.7)	14.7	939	4.2(0.9)	20.6	988	5.9(1.1)	19.3
301-400만원	1,698	5.1(0.6)	11.7	831	3.4(0.7)	19.9	867	7.0(1.0)	14.8
401만원 이상	3,085	4.2(0.4)	9.9	1,503	2.9(0.5)	16.8	1,582	5.7(0.7)	12.8
거주유형									
동	3,231	5.2(0.4)	7.8	1,467	3.4(0.5)	15.0	1,764	6.9(0.6)	9.2
읍·면	8,369	6.2(0.3)	5.3	3,845	4.6(0.4)	8.4	4,524	7.8(0.5)	5.9

주 : 1) 침상와병 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 193〉 침상와병일수[1]

(단위 : 일)

구분	전체 N	전체 일(표준오차)	전체 변동계수	남자 N	남자 일(표준오차)	남자 변동계수	여자 N	여자 일(표준오차)	여자 변동계수
전체	690	5.2(0.3)	6.0	223	5.7(0.4)	7.4	467	4.9(0.4)	9.0
연령									
19-29	66	3.9(0.5)	14.1	21	4.7(1.1)	23.8	45	3.3(0.5)	13.6
30-39	93	2.8(0.5)	16.4	37	2.9(0.7)	24.7	56	2.7(0.6)	21.9
40-49	93	3.6(0.2)	6.5	30	5.1(0.5)	9.9	63	3.0(0.3)	8.6
50-59	102	6.6(1.5)	22.5	34	6.9(1.3)	18.9	68	6.5(2.3)	35.6
60-69	117	5.9(0.5)	9.2	31	8.1(1.1)	13.7	86	5.2(0.6)	11.8
70 이상	219	8.4(0.8)	9.3	70	8.8(1.4)	15.8	149	8.2(0.9)	11.2

주 : 1) 침상와병일수 : 최근 1달(30일) 동안 침상와병일 수 / 와병 경험자 수

〈표 194〉 결근결석 경험률[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,532	3.9(0.3)	7.5	4,167	3.1(0.3)	10.8	3,365	5.0(0.5)	9.9
연령									
19-29	773	4.4(0.9)	21.1	375	3.4(1.1)	31.0	398	5.7(1.5)	25.8
30-39	1,230	4.2(0.6)	15.5	717	3.3(0.7)	21.0	513	5.7(1.3)	22.3
40-49	1,626	3.3(0.5)	16.0	915	2.7(0.6)	23.9	711	4.3(0.9)	21.7
50-59	1,928	3.0(0.5)	16.3	1,081	2.8(0.6)	21.4	847	3.3(0.8)	25.2
60-69	1,137	5.0(1.0)	20.8	628	3.9(1.1)	28.0	509	6.4(1.5)	23.3
70 이상	838	5.4(0.9)	17.2	451	3.6(0.9)	24.0	387	7.6(1.8)	23.1
생애주기별									
19-64	6,171	3.7(0.3)	8.0	3,442	3.0(0.4)	11.6	2,729	4.8(0.5)	11.0
65 이상	1,361	5.3(0.8)	15.7	725	3.8(0.9)	24.9	636	6.9(1.4)	19.7
교육수준[2)]									
무학	594	4.8(1.1)	23.8	153	3.5(1.3)	36.0	441	5.3(1.5)	28.4
초등학교	1,347	5.0(0.7)	13.6	678	3.1(0.6)	19.4	669	7.1(1.3)	18.8
중학교	930	6.4(1.1)	16.9	523	6.5(1.5)	22.6	407	6.4(1.6)	24.7
고등학교	2,714	3.9(0.5)	12.3	1,579	3.2(0.6)	17.6	1,135	4.9(0.9)	17.7
대학교 이상	1,939	2.8(0.4)	15.9	1,232	2.3(0.5)	22.8	707	3.8(0.8)	22.0
직업									
전문행정관리	1,021	3.1(0.7)	22.3	540	2.6(0.8)	30.3	481	3.7(1.1)	31.0
사무직	735	1.6(0.5)	30.3	382	0.4(0.2)	46.1	353	3.3(1.1)	34.5
판매·서비스직	1,260	4.1(0.8)	18.3	410	2.8(1.2)	41.4	850	4.9(0.9)	18.9
농림어업	1,992	5.2(0.6)	10.7	1,161	4.4(0.7)	16.8	831	6.7(1.1)	16.2
기능단순노무직	2,300	4.8(0.6)	12.1	1,552	4.1(0.7)	16.1	748	6.8(1.2)	18.1
기타[3)]	224	2.4(0.9)	38.0	122	1.5(0.9)	61.1	102	4.3(2.1)	48.8
월 가구소득									
100만원 이하	890	7.3(1.1)	15.2	416	4.2(1.2)	28.1	474	10.5(1.9)	18.3
101-200만원	1,220	5.2(1.0)	19.9	652	4.8(1.2)	25.7	568	5.7(1.8)	31.0
201-300만원	1,323	4.3(0.9)	20.3	792	4.6(1.0)	22.1	531	3.9(1.4)	34.9
301-400만원	1,238	3.6(0.6)	15.9	721	2.6(0.6)	23.4	517	5.3(1.1)	20.9
401만원 이상	2,470	3.1(0.4)	13.5	1,376	2.2(0.5)	20.7	1,094	4.4(0.8)	17.2
거주유형									
동	2,044	3.5(0.4)	12.7	1,139	2.4(0.5)	21.0	905	5.1(0.8)	15.0
읍·면	5,488	4.4(0.3)	7.1	3,028	4.1(0.4)	10.0	2,460	4.9(0.5)	10.0

주 : 1) 결근결석 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장에 가지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수†) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 195〉 결근결석일수[1)]

(단위 : 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	300	4.7(0.3)	7.3	137	5.6(0.6)	10.8	163	3.8(0.3)	8.8
연령									
19-29	37	3.6(0.8)	20.9	13	-(-)	-	24	2.5(0.3)	10.4
30-39	54	3.7(0.4)	9.9	27	4.5(0.7)	15.5	27	3.0(0.2)	7.5
40-49	61	3.5(0.6)	15.9	29	3.1(0.5)	17.5	32	3.8(1.0)	25.1
50-59	63	7.1(1.1)	15.9	32	8.6(1.7)	19.7	31	5.0(0.7)	14.7
60-69	45	7.3(1.4)	19.0	16	-(-)	-	29	6.2(1.8)	29.2
70 이상	40	4.7(0.5)	10.0	20	5.8(0.9)	16.3	20	4.1(0.6)	15.0

주 : 1) 결근결석일수 : 최근 1달(30일) 동안 결근결석일 수 / 결근결석 경험자 수

†조사대상 응답자 수 : 학교 또는 직장을 다니고 있지 않은(주부, 무직) 대상자 제외

〈표 196〉 삶의 질 지수(EQ-5D Index)1),2)

(단위 : 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	11,588	0.939(0.002)	0.2	5,304	0.956(0.002)	0.2	6,284	0.922(0.002)	0.3
연령									
19-29	1,036	0.978(0.002)	0.2	471	0.982(0.003)	0.3	565	0.973(0.003)	0.3
30-39	1,603	0.971(0.002)	0.2	758	0.973(0.003)	0.3	845	0.969(0.002)	0.2
40-49	1,957	0.967(0.002)	0.2	965	0.971(0.003)	0.3	992	0.963(0.003)	0.3
50-59	2,480	0.945(0.003)	0.3	1,178	0.960(0.003)	0.4	1,302	0.930(0.005)	0.5
60-69	1,931	0.903(0.005)	0.5	894	0.933(0.006)	0.6	1,037	0.879(0.007)	0.8
70 이상	2,581	0.810(0.005)	0.7	1,038	0.858(0.008)	0.9	1,543	0.777(0.007)	0.9
생애주기별									
19-64	8,057	0.961(0.001)	0.1	3,844	0.969(0.001)	0.2	4,213	0.953(0.002)	0.2
65 이상	3,531	0.831(0.005)	0.6	1,460	0.876(0.006)	0.7	2,071	0.800(0.006)	0.8
교육수준3)									
무학	1,698	0.790(0.008)	1.0	324	0.826(0.016)	1.9	1,374	0.782(0.009)	1.2
초등학교	2,304	0.873(0.005)	0.5	970	0.891(0.007)	0.8	1,334	0.861(0.006)	0.7
중학교	1,389	0.933(0.004)	0.5	683	0.940(0.005)	0.5	706	0.927(0.006)	0.7
고등학교	3,729	0.966(0.001)	0.1	1,924	0.970(0.002)	0.2	1,805	0.962(0.002)	0.2
대학교 이상	2,458	0.972(0.002)	0.2	1,400	0.973(0.002)	0.3	1,058	0.971(0.002)	0.2
직업									
전문행정관리	1,038	0.976(0.002)	0.2	545	0.977(0.004)	0.4	493	0.975(0.003)	0.3
사무직	742	0.980(0.002)	0.2	382	0.985(0.003)	0.3	360	0.975(0.003)	0.3
판매·서비스직	1,294	0.961(0.003)	0.3	423	0.973(0.003)	0.3	871	0.954(0.004)	0.4
농림어업	2,097	0.920(0.003)	0.3	1,203	0.941(0.003)	0.3	894	0.887(0.006)	0.6
기능단순노무직	2,410	0.958(0.002)	0.2	1,585	0.969(0.002)	0.2	825	0.931(0.005)	0.5
기타4)	4,005	0.896(0.004)	0.4	1,165	0.910(0.005)	0.6	2,840	0.890(0.005)	0.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,293	0.828(0.006)	0.7	860	0.867(0.008)	0.9	1,433	0.801(0.008)	1.1
101-200만원	1,950	0.915(0.004)	0.4	896	0.939(0.004)	0.4	1,054	0.894(0.006)	0.7
201-300만원	1,927	0.949(0.003)	0.3	939	0.959(0.004)	0.4	988	0.938(0.004)	0.5
301-400만원	1,698	0.959(0.002)	0.2	831	0.969(0.003)	0.3	867	0.948(0.003)	0.3
401만원 이상	3,085	0.969(0.001)	0.1	1,503	0.976(0.002)	0.2	1,582	0.962(0.002)	0.2
거주유형									
동	3,231	0.947(0.002)	0.2	1,467	0.963(0.002)	0.3	1,764	0.932(0.003)	0.4
읍·면	8,357	0.926(0.002)	0.2	3,837	0.946(0.002)	0.2	4,520	0.906(0.002)	0.3

주 : 1) 삶의 질 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표
2) 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 197〉 오늘의 건강상태(EQ-VAS)[1]

(단위 : 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	11,563	72.8(0.3)	0.4	5,303	74.4(0.4)	0.5	6,260	71.2(0.3)	0.5
연령									
19-29	1,035	75.9(0.7)	0.9	471	77.1(1.1)	1.4	564	74.3(0.8)	1.0
30-39	1,603	73.9(0.5)	0.7	758	74.4(0.7)	1.0	845	73.3(0.7)	1.0
40-49	1,956	75.0(0.5)	0.7	965	74.6(0.7)	1.0	991	75.4(0.7)	0.9
50-59	2,478	74.6(0.4)	0.6	1,177	76.1(0.5)	0.7	1,301	73.0(0.7)	0.9
60-69	1,929	70.5(0.6)	0.9	895	73.5(0.8)	1.1	1,034	68.0(0.9)	1.3
70 이상	2,562	62.6(0.6)	1.0	1,037	66.6(0.8)	1.2	1,525	59.8(0.8)	1.3
생애주기별									
19-64	8,053	74.6(0.3)	0.4	3,843	75.4(0.4)	0.5	4,210	73.7(0.4)	0.5
65 이상	3,510	64.4(0.6)	0.9	1,460	68.5(0.7)	1.0	2,050	61.4(0.7)	1.2
교육수준[2]									
무학	1,680	61.0(0.8)	1.3	325	63.8(1.5)	2.3	1,355	60.3(0.9)	1.5
초등학교	2,296	67.3(0.6)	0.9	967	68.9(0.8)	1.2	1,329	66.2(0.8)	1.2
중학교	1,389	71.5(0.6)	0.9	683	72.7(0.8)	1.1	706	70.4(0.9)	1.3
고등학교	3,730	75.1(0.5)	0.6	1,925	75.8(0.6)	0.8	1,805	74.4(0.5)	0.7
대학교 이상	2,458	75.7(0.4)	0.5	1,400	75.8(0.5)	0.7	1,058	75.5(0.5)	0.7
직업									
전문행정관리	1,038	75.4(0.8)	1.0	545	75.4(1.1)	1.4	493	75.3(0.8)	1.0
사무직	742	75.8(0.7)	0.9	382	75.6(1.0)	1.3	360	76.1(0.8)	1.0
판매·서비스직	1,294	74.0(0.7)	0.9	423	75.6(1.0)	1.3	871	73.1(0.8)	1.1
농림어업	2,093	72.5(0.5)	0.6	1,202	74.9(0.5)	0.7	891	68.7(0.7)	1.0
기능단순노무직	2,407	74.3(0.5)	0.6	1,585	75.3(0.5)	0.7	822	71.8(0.9)	1.2
기타[3]	3,987	69.6(0.5)	0.8	1,165	71.3(0.9)	1.3	2,822	68.8(0.6)	0.8
월 가구소득									
100만원 이하	2,282	62.6(0.7)	1.2	859	66.9(0.9)	1.4	1,423	59.7(1.0)	1.6
101-200만원	1,944	71.1(0.6)	0.9	895	72.4(0.9)	1.2	1,049	69.8(0.8)	1.1
201-300만원	1,926	73.8(0.6)	0.8	939	74.9(0.7)	1.0	987	72.7(0.8)	1.0
301-400만원	1,697	74.0(0.5)	0.7	831	75.3(0.7)	0.9	866	72.7(0.7)	1.0
401만원 이상	3,082	75.6(0.5)	0.6	1,503	76.4(0.6)	0.8	1,579	74.8(0.6)	0.7
거주유형									
동	3,231	73.1(0.4)	0.6	1,467	74.5(0.5)	0.7	1,764	71.7(0.5)	0.7
읍·면	8,332	72.4(0.3)	0.4	3,836	74.3(0.3)	0.5	4,496	70.4(0.4)	0.5

주 : 1) 오늘의 건강상태 : 건강상태 점수의 총 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 198〉 행복감지수[1]

(단위 : 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	11,520	6.8(0.0)	0.4	5,282	6.8(0.0)	0.5	6,238	6.7(0.0)	0.5
연령									
19-29	1,036	7.0(0.1)	1.0	471	7.1(0.1)	1.6	565	6.8(0.1)	1.1
30-39	1,602	6.9(0.1)	0.8	757	7.0(0.1)	1.1	845	6.9(0.1)	1.1
40-49	1,956	6.9(0.1)	0.7	964	6.8(0.1)	1.0	992	6.9(0.1)	1.0
50-59	2,474	6.8(0.1)	0.8	1,175	6.8(0.1)	1.0	1,299	6.8(0.1)	1.0
60-69	1,915	6.6(0.1)	1.1	886	6.8(0.1)	1.4	1,029	6.5(0.1)	1.4
70 이상	2,537	6.2(0.1)	1.0	1,029	6.4(0.1)	1.4	1,508	6.0(0.1)	1.3
생애주기별									
19-64	8,042	6.9(0.0)	0.4	3,833	6.9(0.0)	0.6	4,209	6.8(0.0)	0.5
65 이상	3,478	6.3(0.1)	0.9	1,449	6.5(0.1)	1.2	2,029	6.1(0.1)	1.1
교육수준[2]									
무학	1,652	6.0(0.1)	1.3	316	6.1(0.2)	2.8	1,336	5.9(0.1)	1.4
초등학교	2,288	6.3(0.1)	0.9	960	6.4(0.1)	1.4	1,328	6.3(0.1)	1.1
중학교	1,386	6.5(0.1)	1.2	682	6.5(0.1)	1.5	704	6.6(0.1)	1.5
고등학교	3,729	6.8(0.0)	0.6	1,924	6.8(0.1)	0.9	1,805	6.8(0.1)	0.8
대학교 이상	2,455	7.2(0.0)	0.6	1,397	7.1(0.1)	0.8	1,058	7.2(0.1)	0.9
직업									
전문행정관리	1,037	7.2(0.1)	1.0	544	7.3(0.1)	1.1	493	7.2(0.1)	1.3
사무직	742	7.2(0.1)	0.8	382	7.2(0.1)	1.1	360	7.0(0.1)	1.3
판매·서비스직	1,294	6.7(0.1)	0.9	423	6.8(0.1)	1.6	871	6.7(0.1)	1.0
농림어업	2,078	6.7(0.0)	0.7	1,194	6.8(0.1)	0.9	884	6.5(0.1)	1.0
기능단순노무직	2,405	6.7(0.1)	0.8	1,583	6.8(0.1)	1.0	822	6.5(0.1)	1.2
기타[3]	3,962	6.6(0.1)	0.8	1,155	6.6(0.1)	1.5	2,807	6.6(0.1)	0.8
월 가구소득									
100만원 이하	2,262	6.0(0.1)	1.1	851	6.2(0.1)	1.7	1,411	5.8(0.1)	1.2
101-200만원	1,938	6.4(0.1)	1.2	893	6.4(0.1)	1.6	1,045	6.5(0.1)	1.4
201-300만원	1,921	6.7(0.1)	0.9	936	6.8(0.1)	1.3	985	6.7(0.1)	1.1
301-400만원	1,695	6.8(0.1)	0.8	829	6.8(0.1)	1.0	866	6.8(0.1)	1.1
401만원 이상	3,081	7.1(0.0)	0.6	1,501	7.2(0.1)	0.7	1,580	7.1(0.1)	0.8
거주유형									
동	3,230	6.8(0.0)	0.6	1,467	6.8(0.1)	0.9	1,763	6.7(0.1)	0.8
읍·면	8,290	6.8(0.0)	0.4	3,815	6.8(0.0)	0.5	4,475	6.7(0.0)	0.5

주 : 1) 행복감지수 : 현재 수준에서의 삶에 대한 전반적인 만족도(1~10점)
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 199〉 보건기관 이용률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	35.7(0.6)	1.8	5,313	28.8(0.8)	2.7	6,288	42.5(0.9)	2.1
연령									
19-29	1,036	22.3(1.4)	6.5	471	16.8(1.8)	10.9	565	28.8(2.1)	7.2
30-39	1,603	31.2(1.4)	4.6	758	23.2(1.6)	7.0	845	39.7(2.0)	5.1
40-49	1,957	22.2(1.2)	5.6	965	17.1(1.4)	8.1	992	27.7(1.9)	6.8
50-59	2,481	32.6(1.3)	4.1	1,179	25.6(1.6)	6.1	1,302	39.9(1.9)	4.8
60-69	1,934	51.1(1.7)	3.4	896	47.1(2.2)	4.6	1,038	54.4(2.2)	4.0
70 이상	2,590	74.3(1.5)	2.0	1,044	74.2(2.1)	2.9	1,546	74.5(1.9)	2.6
생애주기별									
19-64	8,060	28.5(0.7)	2.3	3,846	22.2(0.8)	3.6	4,214	35.3(1.0)	2.8
65 이상	3,541	69.4(1.3)	1.9	1,467	67.7(1.8)	2.6	2,074	70.6(1.6)	2.2
교육수준[2]									
무학	1,706	69.0(1.9)	2.7	328	66.1(4.0)	6.1	1,378	69.7(2.0)	2.8
초등학교	2,307	55.6(1.5)	2.7	973	54.0(2.4)	4.4	1,334	56.8(1.7)	3.0
중학교	1,390	43.7(1.8)	4.1	684	43.0(2.4)	5.6	706	44.4(2.5)	5.6
고등학교	3,730	26.8(1.0)	3.7	1,925	22.0(1.2)	5.3	1,805	32.3(1.5)	4.5
대학교 이상	2,458	27.1(1.2)	4.3	1,400	22.5(1.3)	5.6	1,058	33.8(1.9)	5.7
직업									
전문행정관리	1,038	23.0(1.6)	6.9	545	20.0(1.8)	9.2	493	26.4(2.3)	8.8
사무직	742	21.4(1.8)	8.6	382	18.1(2.5)	13.7	360	25.9(2.6)	10.2
판매·서비스직	1,294	36.7(1.6)	4.5	423	23.6(2.3)	9.7	871	44.3(2.1)	4.7
농림어업	2,099	61.5(1.4)	2.3	1,204	57.5(1.6)	2.8	895	68.0(1.9)	2.8
기능단순노무직	2,411	28.1(1.2)	4.1	1,586	23.5(1.3)	5.4	825	40.0(2.3)	5.8
기타[3]	4,015	42.4(1.1)	2.7	1,172	35.4(1.8)	5.1	2,843	45.8(1.2)	2.7
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	62.0(1.6)	2.6	864	55.2(2.6)	4.7	1,434	66.6(1.7)	2.6
101-200만원	1,953	44.1(1.7)	3.9	898	40.4(2.4)	5.8	1,055	47.6(2.0)	4.2
201-300만원	1,927	34.4(1.4)	4.1	939	29.5(1.7)	5.9	988	39.7(2.0)	5.1
301-400만원	1,698	32.1(1.5)	4.7	831	25.7(1.8)	6.9	867	39.1(2.0)	5.2
401만원 이상	3,086	25.4(1.1)	4.2	1,504	18.7(1.1)	6.1	1,582	32.5(1.6)	5.0
거주유형									
동	3,231	27.9(0.9)	3.2	1,467	21.5(1.1)	5.0	1,764	34.0(1.3)	3.8
읍·면	8,370	47.0(0.8)	1.8	3,846	39.0(1.0)	2.6	4,524	55.3(1.0)	1.8

주 : 1) 보건기관 이용률 : (최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 200〉 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관[1]

(단위 : %)

구분	N	이용한 적 없다		보건소(보건의료원)		보건지소		보건진료소	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	64.3(0.6)	1.0	23.5(0.6)	2.4	7.5(0.3)	4.0	4.7(0.3)	5.6
성									
남자	5,313	71.2(0.8)	1.1	18.8(0.7)	3.6	6.2(0.3)	5.4	3.8(0.3)	7.0
여자	6,288	57.5(0.9)	1.5	28.2(0.8)	2.9	8.8(0.4)	4.5	5.6(0.3)	6.1
연령									
19-29	1,036	77.7(1.4)	1.9	19.9(1.4)	7.2	1.8(0.3)	18.7	0.6(0.2)	33.4
30-39	1,603	68.8(1.4)	2.1	24.9(1.4)	5.5	5.1(0.6)	11.3	1.2(0.3)	24.0
40-49	1,957	77.8(1.2)	1.6	16.6(1.1)	6.8	3.2(0.4)	11.1	2.4(0.5)	20.2
50-59	2,481	67.4(1.3)	2.0	20.8(1.2)	5.7	7.4(0.6)	8.0	4.4(0.5)	10.5
60-69	1,934	48.9(1.7)	3.5	28.2(1.6)	5.5	13.0(1.0)	7.4	9.9(0.9)	9.3
70 이상	2,590	25.7(1.5)	5.9	38.0(1.6)	4.2	21.3(1.1)	5.2	15.1(1.0)	6.5
생애주기별									
19-64	8,060	71.5(0.7)	0.9	20.9(0.6)	2.9	4.9(0.3)	5.4	2.7(0.2)	7.7
65 이상	3,541	30.6(1.3)	4.3	35.4(1.3)	3.6	19.8(0.9)	4.7	14.1(0.8)	5.9
교육수준[2]									
무학	1,706	31.0(1.9)	6.0	31.8(1.8)	5.6	21.6(1.4)	6.6	15.6(1.2)	7.4
초등학교	2,307	44.4(1.5)	3.4	28.5(1.4)	4.9	14.9(0.9)	6.3	12.2(0.9)	7.4
중학교	1,390	56.3(1.8)	3.2	27.7(1.7)	6.1	10.0(0.8)	7.9	6.0(0.7)	11.5
고등학교	3,730	73.2(1.0)	1.4	20.4(0.9)	4.5	4.2(0.3)	7.8	2.2(0.2)	10.5
대학교 이상	2,458	72.9(1.2)	1.6	21.8(1.1)	4.9	3.9(0.4)	10.8	1.4(0.3)	18.7
직업									
전문행정관리	1,038	77.0(1.6)	2.0	18.2(1.4)	7.7	3.5(0.6)	17.8	1.2(0.4)	29.0
사무직	742	78.6(1.8)	2.3	16.9(1.7)	9.8	3.5(0.7)	21.3	1.0(0.4)	43.2
판매·서비스직	1,294	63.3(1.6)	2.6	30.9(1.6)	5.3	3.3(0.5)	14.6	2.5(0.5)	20.5
농림어업	2,099	38.5(1.4)	3.7	18.0(1.3)	7.1	23.8(1.4)	5.7	19.7(1.3)	6.8
기능단순노무직	2,411	71.9(1.2)	1.6	20.9(1.0)	5.0	4.5(0.4)	9.0	2.7(0.4)	13.8
기타[3]	4,015	57.6(1.1)	2.0	27.5(1.0)	3.8	9.5(0.5)	5.5	5.3(0.4)	6.8
월 가구소득									
100만원 이하	2,298	38.0(1.6)	4.3	29.2(1.5)	5.2	19.3(1.2)	6.2	13.5(0.9)	6.9
101-200만원	1,953	55.9(1.7)	3.1	26.9(1.7)	6.1	9.6(0.7)	7.5	7.6(0.7)	9.5
201-300만원	1,927	65.6(1.4)	2.2	24.6(1.4)	5.6	6.0(0.6)	9.5	3.8(0.5)	12.2
301-400만원	1,698	67.9(1.5)	2.2	25.1(1.4)	5.7	4.9(0.6)	11.5	2.1(0.4)	17.1
401만원 이상	3,086	74.6(1.1)	1.4	19.3(1.0)	5.1	3.8(0.4)	9.9	2.2(0.4)	17.2
거주유형									
동	3,231	72.1(0.9)	1.2	25.9(0.9)	3.3	0.5(0.2)	39.1	1.5(0.2)	13.9
읍·면	8,370	53.0(0.8)	1.6	19.9(0.6)	3.1	17.7(0.7)	4.0	9.4(0.6)	6.2

주 : 1) 최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 201〉 보건기관 이용 서비스 종류[1]

(단위 : %)

구분	예방접종		건강교실 (금연, 절주, 운동, 영양)		건강검진		방문보건 서비스		영양보충 서비스		정신보건 서비스		모자보건 서비스		구강보건 서비스		진료서비스		민원서비스 (서류증명서 발급)		기타	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	69.1(1.0)	1.5	8.5(0.5)	5.6	15.7(0.7)	4.6	7.5(0.4)	5.9	2.1(0.3)	12.2	0.7(0.1)	16.3	4.5(0.5)	10.3	4.6(0.3)	6.6	32.6(0.8)	2.6	18.5(0.9)	4.7	3.3(0.3)	9.0
성																						
남자	66.1(1.6)	2.3	11.0(0.9)	8.2	15.8(1.1)	6.7	6.6(0.6)	8.7	1.0(0.3)	26.0	0.4(0.1)	33.7	2.1(0.5)	25.1	5.2(0.5)	9.7	36.1(1.3)	3.6	13.9(1.1)	7.6	4.2(0.6)	14.2
여자	71.1(1.3)	1.8	6.8(0.5)	6.7	15.7(0.8)	5.4	8.2(0.5)	6.4	2.9(0.4)	13.7	0.9(0.2)	18.2	6.1(0.6)	9.4	4.1(0.3)	7.8	30.3(1.0)	3.3	21.5(1.2)	5.6	2.7(0.3)	10.8
연령																						
19-29	39.3(3.6)	9.2	6.7(2.1)	30.5	19.8(2.8)	14.4	1.0(0.7)	64.5	4.7(1.5)	31.4	0.0(0.0)	.	14.7(2.5)	17.1	1.2(0.5)	39.1	16.0(2.9)	17.9	30.5(3.3)	11.0	3.5(1.3)	35.3
30-39	70.7(2.3)	3.3	7.6(1.2)	15.9	4.3(0.8)	18.5	1.1(0.4)	35.3	4.4(1.1)	25.2	0.7(0.3)	43.9	14.0(1.7)	12.3	2.9(0.9)	29.8	12.7(1.5)	11.9	20.5(2.1)	10.4	5.0(1.1)	21.1
40-49	45.0(3.1)	6.9	9.9(1.7)	17.2	14.1(2.2)	15.6	2.6(0.9)	34.2	0.8(0.3)	44.0	0.5(0.4)	80.4	3.7(1.5)	41.3	4.2(1.0)	23.4	22.6(2.2)	9.7	37.5(3.0)	8.1	4.9(1.1)	22.0
50-59	60.8(2.2)	3.7	8.3(1.0)	11.6	16.4(1.5)	9.4	3.8(0.7)	17.9	0.6(0.2)	35.3	0.4(0.2)	46.7	0.5(0.2)	39.4	3.2(0.5)	15.1	36.2(1.8)	5.0	23.4(1.8)	7.5	2.5(0.6)	23.3
60-69	78.6(1.9)	2.4	7.9(1.1)	14.1	17.4(1.6)	9.4	7.0(0.7)	10.6	0.7(0.2)	31.8	0.9(0.3)	34.4	0.2(0.1)	53.4	4.9(0.7)	14.1	40.9(2.1)	5.2	11.8(1.6)	13.6	3.9(0.6)	15.6
70 이상	92.3(1.0)	1.1	9.5(0.8)	8.8	20.4(1.3)	6.2	19.5(1.2)	6.2	2.4(0.3)	13.2	1.2(0.3)	21.2	0.2(0.1)	75.8	7.9(0.7)	8.9	49.1(1.6)	3.2	3.4(0.4)	12.8	1.6(0.3)	18.0
생애주기별																						
19-64	57.6(1.4)	2.4	8.2(0.6)	7.7	13.6(0.9)	6.4	2.6(0.3)	12.9	2.2(0.4)	17.7	0.5(0.1)	27.3	6.7(0.7)	10.4	3.1(0.4)	11.6	24.9(1.0)	4.1	25.6(1.2)	4.8	4.1(0.4)	10.6
65 이상	91.2(0.9)	1.0	9.0(0.7)	7.6	19.8(1.1)	5.4	16.9(1.0)	5.8	2.1(0.3)	12.4	1.2(0.2)	19.6	0.2(0.1)	54.8	7.5(0.6)	7.8	47.5(1.4)	3.0	4.8(0.5)	11.4	1.9(0.3)	17.2
교육수준[2]																						
무학	89.7(1.3)	1.5	8.4(0.8)	9.0	22.6(1.5)	6.7	21.9(1.6)	7.4	2.2(0.4)	16.4	1.2(0.3)	24.6	0.3(0.1)	52.1	7.5(0.8)	10.7	52.0(1.9)	3.6	4.1(0.7)	16.4	1.2(0.3)	23.7
초등학교	79.4(1.7)	2.1	9.0(0.8)	9.1	20.7(1.5)	7.2	11.5(0.8)	7.3	1.7(0.3)	19.8	0.8(0.2)	27.1	0.3(0.1)	51.8	7.1(0.7)	9.7	47.7(1.8)	3.7	11.5(1.5)	12.7	2.0(0.5)	25.7
중학교	66.8(2.9)	4.3	6.1(0.8)	13.7	13.9(1.6)	11.8	4.8(0.7)	14.3	0.8(0.3)	35.5	0.9(0.4)	45.2	2.5(0.9)	35.5	3.2(0.6)	20.1	37.0(2.3)	6.1	22.5(2.5)	11.1	3.7(0.9)	24.1
고등학교	57.9(2.0)	3.4	8.4(1.0)	11.9	14.4(1.3)	9.2	3.2(0.6)	17.7	1.9(0.4)	23.4	0.5(0.2)	42.6	4.9(0.9)	17.7	2.6(0.4)	16.2	24.5(1.6)	6.6	29.3(1.9)	6.5	4.3(0.7)	15.9
대학교 이상	61.4(2.3)	3.7	9.4(1.4)	14.6	9.4(1.4)	14.8	1.1(0.4)	37.4	3.5(0.8)	23.6	0.4(0.2)	48.7	11.5(1.3)	11.6	3.5(0.7)	20.9	14.2(1.3)	9.4	18.3(1.7)	9.2	4.4(0.8)	18.1
직업																						
전문행정관리	57.2(3.7)	6.5	9.7(2.1)	22.1	12.5(2.5)	19.7	2.0(0.9)	42.2	4.1(1.6)	38.3	0.8(0.5)	59.1	9.7(2.4)	24.3	3.5(1.0)	27.3	19.3(2.6)	13.6	19.2(3.0)	15.8	3.6(1.0)	27.0
사무직	64.7(4.6)	7.1	12.8(3.6)	27.9	8.8(2.5)	28.2	0.3(0.2)	58.8	0.9(0.6)	59.6	0.0(0.0)	.	9.0(2.8)	31.3	5.6(2.1)	36.5	16.3(2.8)	17.1	16.2(3.3)	20.5	6.0(2.4)	40.4
판매·서비스직	40.4(2.8)	6.8	4.2(0.8)	18.1	16.1(2.3)	14.1	1.2(0.4)	31.3	1.3(0.4)	29.8	0.1(0.1)	100.0	2.9(0.8)	27.5	1.6(0.4)	27.0	18.6(1.9)	10.2	55.7(2.9)	5.2	4.4(0.8)	18.8
농림어업	80.1(1.7)	2.1	11.9(1.0)	8.1	24.7(1.7)	6.8	16.7(1.2)	7.2	2.2(0.3)	13.2	0.8(0.3)	31.4	0.6(0.3)	48.8	8.0(0.9)	10.7	58.1(2.1)	3.6	7.6(0.9)	11.7	2.8(0.6)	21.7
기능단순노무직	62.7(2.4)	3.8	9.8(1.3)	13.4	15.1(1.7)	11.4	3.5(0.6)	15.8	1.6(0.6)	34.9	0.9(0.4)	41.0	2.4(0.7)	29.6	3.1(0.7)	21.2	30.4(2.0)	6.7	21.8(2.0)	9.1	3.7(0.8)	20.5
기타[3]	80.4(1.3)	1.7	7.2(0.8)	10.6	14.1(1.0)	7.3	10.1(0.8)	8.0	2.4(0.4)	17.5	0.9(0.2)	20.3	5.7(0.7)	11.9	5.0(0.4)	9.0	33.7(1.3)	3.9	8.8(0.9)	10.6	2.6(0.5)	17.8
월 가구소득																						
100만원 이하	87.1(1.3)	1.5	9.3(0.9)	9.3	20.8(1.4)	6.9	17.1(1.3)	7.6	1.9(0.3)	17.4	1.4(0.3)	21.6	0.1(0.1)	70.9	7.7(0.7)	9.2	50.2(1.7)	3.5	8.2(1.0)	12.0	1.8(0.5)	25.9
101-200만원	72.4(2.5)	3.4	9.2(1.3)	14.3	16.1(1.6)	9.7	9.6(1.2)	12.4	1.9(0.6)	33.1	0.8(0.3)	38.6	3.6(1.1)	29.9	4.6(0.7)	14.9	42.1(2.2)	5.3	14.2(1.9)	13.2	3.4(0.8)	23.2
201-300만원	59.2(2.6)	4.4	9.2(1.5)	16.5	16.7(1.9)	11.3	3.3(0.6)	17.3	2.2(0.6)	25.7	0.7(0.4)	49.8	7.4(1.3)	17.1	3.5(0.8)	21.6	30.0(2.1)	7.0	16.8(1.9)	11.3	3.0(0.7)	21.6
301-400만원	68.1(2.4)	3.5	6.3(1.2)	19.2	10.8(1.3)	12.3	4.3(0.8)	18.7	2.5(0.7)	28.9	0.2(0.1)	63.5	6.1(1.1)	18.7	4.0(0.8)	21.0	19.3(1.7)	8.9	25.6(2.5)	9.7	5.2(1.2)	23.1
401만원 이상	58.2(2.3)	3.9	8.3(1.0)	12.0	13.6(1.5)	10.8	2.8(0.5)	18.0	2.5(0.7)	29.5	0.5(0.2)	41.1	6.1(1.3)	20.6	2.9(0.6)	20.3	20.6(1.6)	7.7	27.0(2.2)	8.2	3.9(0.6)	16.3
거주유형																						
동	60.8(1.9)	3.1	6.9(0.8)	12.1	10.5(1.2)	11.3	2.4(0.6)	24.2	1.5(0.4)	29.7	0.2(0.1)	50.0	5.4(0.9)	16.1	1.7(0.4)	24.8	16.6(1.4)	8.2	25.1(1.7)	6.6	3.8(0.5)	14.3
읍·면	76.2(0.9)	1.2	9.9(0.5)	5.3	20.2(0.9)	4.2	12.0(0.7)	5.6	2.7(0.3)	10.8	1.1(0.2)	16.9	3.7(0.4)	11.5	7.1(0.4)	6.2	46.5(1.0)	2.2	12.7(0.7)	5.3	2.9(0.3)	10.2

주 : 1) 보건기관 이용 서비스 종류 : (보건기관 이용 서비스 종류별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 202> 보건기관 서비스 만족도[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	5,702	77.8(0.9)	1.1	2,233	78.6(1.3)	1.6	3,469	77.3(1.1)	1.4
연령									
19-29	271	72.8(4.0)	5.4	95	71.5(6.4)	9.0	176	73.7(4.1)	5.6
30-39	592	72.2(2.7)	3.7	192	78.8(3.7)	4.7	400	68.1(3.2)	4.7
40-49	537	74.7(2.8)	3.7	205	75.0(4.0)	5.4	332	74.5(3.7)	4.9
50-59	1,002	78.8(1.9)	2.4	385	79.1(2.8)	3.6	617	78.6(2.3)	3.0
60-69	1,195	79.4(1.6)	2.1	523	82.6(2.1)	2.6	672	77.0(2.3)	3.0
70 이상	2,105	83.3(1.1)	1.3	833	80.2(1.8)	2.2	1,272	85.5(1.3)	1.6
생애주기별									
19-64	2,944	75.7(1.2)	1.6	1,122	77.6(1.8)	2.4	1,822	74.5(1.5)	2.0
65 이상	2,758	81.9(1.0)	1.2	1,111	80.4(1.5)	1.9	1,647	82.9(1.3)	1.6
교육수준[2]									
무학	1,330	84.5(1.4)	1.7	253	82.0(3.6)	4.4	1,077	85.0(1.5)	1.8
초등학교	1,499	80.7(1.4)	1.7	621	80.8(2.3)	2.8	878	80.6(1.9)	2.3
중학교	728	76.5(1.9)	2.5	357	77.9(2.7)	3.4	371	75.4(2.8)	3.8
고등학교	1,310	75.1(1.6)	2.2	611	76.4(2.6)	3.4	699	74.1(2.3)	3.1
대학교 이상	833	74.9(2.2)	3.0	390	78.8(2.7)	3.5	443	71.2(3.0)	4.2
직업									
전문행정관리	310	72.8(3.5)	4.8	141	78.5(4.7)	6.0	169	67.7(4.8)	7.1
사무직	202	73.1(4.2)	5.7	84	78.4(6.0)	7.6	118	68.1(5.8)	8.6
판매·서비스직	564	78.6(2.2)	2.8	137	79.6(4.8)	6.0	427	78.3(2.3)	3.0
농림어업	1,408	81.1(1.2)	1.5	776	80.6(1.7)	2.1	632	81.8(1.9)	2.3
기능단순노무직	862	76.5(2.2)	2.8	460	77.7(2.7)	3.5	402	74.7(3.2)	4.3
기타[3]	2,355	78.7(1.2)	1.6	635	77.6(2.2)	2.8	1,720	79.1(1.4)	1.8
월 가구소득									
100만원 이하	1,684	79.6(1.3)	1.6	595	79.6(2.1)	2.6	1,089	79.6(1.6)	2.1
101-200만원	1,094	81.8(1.6)	2.0	475	82.2(2.5)	3.0	619	81.5(2.0)	2.5
201-300만원	870	76.1(2.0)	2.7	377	75.6(2.9)	3.9	493	76.4(2.8)	3.7
301-400만원	676	76.7(2.6)	3.3	263	78.8(3.6)	4.6	413	75.2(3.0)	3.9
401만원 이상	1,044	75.7(2.0)	2.7	404	78.4(2.9)	3.6	640	74.1(2.3)	3.1
거주유형									
동	1,035	75.0(1.6)	2.2	365	77.4(2.5)	3.2	670	73.6(2.0)	2.7
읍·면	4,667	80.3(0.8)	1.0	1,868	79.5(1.2)	1.5	2,799	80.9(0.9)	1.1

주 : 1) 보건기관 서비스 만족도 : ("대단히 만족 한다" 또는 "만족한 편이다"에 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 203〉 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유[1]

(단위 : %)

구분	N	거리가 가까워서		비용이 저렴해서		신뢰할 수 있어서		시설이 좋아서		직원이 친절해서		다른 곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	5,713	23.2(0.7)	3.2	36.6(1.1)	2.9	7.6(0.5)	6.2	1.0(0.2)	19.3	2.2(0.2)	9.4	22.4(1.0)	4.6	7.0(0.5)	7.5
성															
남자	2,242	27.2(1.2)	4.3	32.9(1.5)	4.4	8.8(0.8)	8.6	1.2(0.3)	27.6	2.3(0.4)	16.2	20.6(1.3)	6.5	7.1(0.9)	12.2
여자	3,471	20.5(0.8)	3.7	39.1(1.3)	3.3	6.7(0.5)	7.7	0.9(0.2)	24.3	2.1(0.2)	11.5	23.6(1.3)	5.6	7.0(0.5)	7.4
연령															
19-29	271	11.9(2.1)	17.3	32.8(3.6)	10.8	7.0(1.6)	22.2	1.8(0.9)	51.7	0.3(0.2)	71.7	33.4(3.7)	11.1	12.8(2.7)	20.9
30-39	593	12.2(1.6)	12.7	49.0(2.8)	5.6	6.8(1.1)	16.4	1.2(0.4)	35.6	0.8(0.3)	40.6	24.2(2.6)	10.9	5.7(1.0)	17.7
40-49	538	19.9(2.0)	10.1	25.0(2.8)	11.3	8.3(1.4)	16.9	0.9(0.4)	41.2	1.5(0.9)	56.3	32.5(3.3)	10.3	11.9(2.3)	19.1
50-59	1,006	26.6(1.7)	6.4	31.5(2.1)	6.6	8.3(1.1)	12.8	1.4(0.6)	44.2	2.1(0.5)	21.1	22.3(2.0)	8.8	7.7(1.0)	13.1
60-69	1,199	27.3(1.6)	5.7	37.6(2.1)	5.5	8.1(1.0)	12.8	0.6(0.3)	42.3	2.7(0.5)	17.7	19.2(2.0)	10.6	4.5(0.7)	15.2
70 이상	2,106	31.5(1.4)	4.4	39.2(1.8)	4.7	7.1(0.7)	10.6	0.7(0.2)	32.4	3.8(0.5)	12.3	13.7(1.3)	9.6	4.2(0.6)	13.9
생애주기별															
19-64	2,953	19.5(0.9)	4.5	35.1(1.4)	3.9	7.5(0.6)	7.7	1.2(0.3)	22.3	1.5(0.2)	16.4	26.6(1.3)	5.0	8.6(0.8)	9.0
65 이상	2,760	30.3(1.2)	3.8	39.4(1.6)	4.0	7.7(0.7)	9.5	0.7(0.2)	27.1	3.6(0.4)	10.7	14.3(1.2)	8.1	4.0(0.5)	12.7
교육수준[2]															
무학	1,328	32.6(1.7)	5.3	40.4(2.1)	5.2	5.7(0.8)	14.1	0.7(0.3)	40.0	4.2(0.7)	16.3	11.8(1.4)	11.6	4.5(0.9)	18.8
초등학교	1,506	31.7(1.5)	4.7	33.9(1.7)	5.0	7.8(0.9)	11.9	0.6(0.3)	48.4	4.0(0.5)	12.8	17.6(1.8)	10.0	4.5(0.7)	15.2
중학교	731	26.9(1.8)	6.9	33.8(2.6)	7.7	6.7(1.1)	16.6	0.6(0.4)	69.8	1.4(0.4)	30.3	22.5(2.7)	12.2	8.2(1.3)	15.6
고등학교	1,309	18.0(1.3)	7.0	34.9(2.0)	5.8	7.8(0.9)	11.1	0.9(0.3)	32.7	1.1(0.3)	23.7	28.9(2.0)	6.9	8.3(1.0)	12.5
대학교 이상	836	14.1(1.4)	10.3	39.9(2.3)	5.8	8.8(1.0)	11.7	2.0(0.6)	29.6	1.0(0.5)	50.4	25.5(2.2)	8.6	8.8(1.2)	14.0
직업															
전문행정관리	310	17.7(2.7)	15.2	38.2(3.8)	10.1	8.5(1.6)	18.6	2.0(1.1)	56.8	1.7(1.2)	73.2	24.0(3.5)	14.6	7.9(1.9)	24.6
사무직	203	21.8(3.3)	15.1	40.0(4.5)	11.3	7.3(2.2)	29.6	1.3(0.8)	62.6	1.0(0.6)	63.9	22.4(4.1)	18.1	6.2(2.3)	36.2
판매·서비스직	565	13.6(1.8)	13.4	26.3(2.5)	9.6	6.9(1.2)	16.8	1.1(0.6)	56.0	1.1(0.4)	34.0	40.6(3.2)	7.8	10.5(1.6)	15.7
농림어업	1,411	46.5(1.8)	3.9	27.1(1.6)	5.9	8.7(1.0)	11.4	1.5(0.6)	40.9	5.2(0.8)	16.1	7.3(0.9)	11.9	3.9(0.6)	16.5
기능단순노무직	864	17.1(1.4)	8.2	36.8(2.3)	6.2	7.8(1.1)	13.9	0.9(0.4)	43.9	1.3(0.4)	27.3	26.8(2.2)	8.0	9.3(1.6)	17.3
기타[3]	2,359	21.9(1.0)	4.7	42.7(1.5)	3.6	7.1(0.6)	8.9	0.7(0.2)	28.7	2.0(0.3)	14.1	19.7(1.4)	7.1	6.0(0.7)	11.7
월 가구소득															
100만원 이하	1,688	33.0(1.7)	5.1	37.4(1.9)	5.0	6.8(0.8)	12.4	0.5(0.2)	38.3	4.4(0.6)	13.2	13.5(1.3)	9.7	4.5(0.8)	17.2
101-200만원	1,097	26.6(1.9)	7.1	32.7(2.5)	7.6	8.6(1.3)	15.2	1.0(0.4)	39.7	2.3(0.4)	19.0	22.7(2.5)	11.2	6.0(0.9)	15.4
201-300만원	872	22.1(1.8)	8.2	36.7(2.5)	6.7	9.7(1.3)	13.8	0.8(0.3)	39.5	1.0(0.3)	35.5	23.0(2.4)	10.6	6.7(1.2)	18.2
301-400만원	678	14.9(1.6)	10.5	39.6(2.9)	7.3	6.2(1.0)	16.0	1.4(0.5)	36.2	1.4(0.4)	30.4	28.3(2.6)	9.1	8.2(1.6)	19.4
401만원 이상	1,045	17.1(1.5)	8.9	36.2(2.2)	6.2	7.2(0.9)	13.0	1.5(0.6)	36.7	1.3(0.4)	29.3	27.7(2.4)	8.5	9.0(1.4)	15.4
거주유형															
동	1,034	5.9(0.8)	14.0	41.6(2.0)	4.7	6.9(0.8)	11.9	0.9(0.3)	36.3	1.3(0.3)	20.5	34.4(2.0)	5.8	9.0(1.0)	10.9
읍·면	4,679	38.2(1.1)	2.9	32.3(1.1)	3.3	8.1(0.5)	6.2	1.1(0.2)	20.9	2.9(0.3)	10.3	12.0(0.6)	5.3	5.4(0.5)	9.1

주 : 1) 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 204〉 보건기관을 이용하지 않는 이유[1]

(단위 : %)

구분	N	위치를 잘 몰라서		거리가 멀고 교통이 불편해서		원하는 서비스가 제공되지 않아서		제공되는 서비스의 질이 높지 않다고 생각하기 때문에		저소득층, 특수계층이 이용한다고 생각하기 때문에		제공되는 서비스가 어떤 것들이 있는지 몰라서		주로 이용하는 병원이 있어서		건강해서		기타	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	5,876	1.8(0.3)	15.4	5.5(0.4)	8.1	1.7(0.2)	10.0	2.2(0.2)	10.5	0.7(0.1)	16.6	5.8(0.4)	7.2	39.0(0.8)	2.0	41.6(0.8)	2.0	1.7(0.2)	13.8
성																			
남자	3,068	2.0(0.4)	19.6	3.4(0.4)	12.4	1.4(0.2)	14.5	2.1(0.3)	14.5	0.7(0.2)	22.0	5.4(0.6)	10.8	34.0(1.0)	2.9	49.5(1.1)	2.2	1.4(0.2)	16.5
여자	2,808	1.5(0.3)	21.1	8.3(0.8)	9.3	2.1(0.3)	13.5	2.3(0.3)	13.6	0.7(0.2)	22.2	6.4(0.7)	10.5	45.1(1.1)	2.4	31.8(1.1)	3.6	1.9(0.3)	15.9
연령																			
19-29	764	3.7(1.0)	25.5	3.9(1.0)	24.2	0.8(0.2)	27.9	0.9(0.3)	37.6	0.1(0.1)	74.7	8.8(1.3)	15.1	18.1(1.6)	8.6	62.6(2.2)	3.5	0.9(0.5)	51.9
30-39	1,009	1.6(0.5)	33.5	6.1(1.2)	19.4	1.9(0.4)	20.4	3.3(0.6)	18.5	0.5(0.2)	44.3	6.0(0.8)	12.8	30.0(1.8)	5.9	48.0(1.8)	3.8	2.6(0.5)	17.5
40-49	1,419	1.5(0.5)	33.4	6.6(1.0)	14.8	2.1(0.4)	20.1	2.3(0.5)	22.4	1.5(0.3)	22.3	5.7(0.7)	13.2	38.2(1.6)	4.2	40.8(1.6)	3.9	1.4(0.3)	25.2
50-59	1,474	0.8(0.3)	40.5	4.4(0.9)	20.8	2.0(0.3)	16.9	2.6(0.6)	21.8	0.9(0.3)	30.2	4.4(0.8)	17.6	50.2(1.7)	3.5	33.0(1.6)	4.7	1.7(0.4)	23.6
60-69	733	0.5(0.4)	74.8	5.8(1.1)	18.4	1.7(0.5)	28.3	1.7(0.6)	38.7	0.4(0.3)	58.4	3.6(1.1)	29.9	64.8(2.2)	3.4	19.5(1.9)	9.7	2.0(0.6)	29.5
70 이상	477	3.0(1.2)	41.6	9.2(2.3)	25.1	1.3(0.5)	37.8	1.4(0.7)	46.2	0.0(0.0)	.	2.9(1.7)	56.1	73.8(2.9)	3.9	6.6(2.0)	30.5	1.8(0.5)	25.5
생애주기별																			
19-64	5,104	1.8(0.3)	16.5	5.3(0.5)	9.3	1.7(0.2)	10.6	2.2(0.2)	10.9	0.8(0.1)	16.7	6.1(0.4)	7.4	35.9(0.8)	2.2	44.6(0.9)	2.0	1.6(0.2)	15.2
65 이상	772	1.9(0.8)	40.2	8.6(1.7)	19.6	1.5(0.4)	25.6	1.3(0.4)	31.2	0.0(0.0)	100.1	3.3(1.3)	38.6	72.3(2.3)	3.2	9.1(1.5)	16.5	1.9(0.5)	23.8
교육수준[2]																			
무학	372	2.0(1.2)	57.2	10.1(2.3)	22.8	1.6(0.8)	52.6	2.6(1.2)	43.6	0.1(0.1)	100.3	4.8(2.2)	46.2	67.2(3.5)	5.2	7.9(1.7)	21.3	3.6(1.1)	30.0
초등학교	798	0.6(0.4)	73.7	7.2(1.2)	17.0	2.1(0.5)	24.4	2.1(0.6)	26.6	1.0(0.5)	51.2	4.0(0.9)	23.7	58.6(2.0)	3.4	22.1(1.7)	7.5	2.2(0.5)	24.1
중학교	658	1.5(0.8)	49.8	4.7(1.2)	25.5	2.2(0.6)	26.1	2.1(0.6)	29.8	1.7(0.5)	27.9	4.4(1.1)	25.0	52.9(2.5)	4.7	28.5(2.3)	7.9	1.9(0.6)	30.7
고등학교	2,419	2.2(0.4)	19.1	5.9(0.7)	11.9	1.4(0.2)	17.4	1.6(0.3)	17.0	0.6(0.2)	27.8	6.7(0.7)	10.2	34.2(1.1)	3.2	45.9(1.2)	2.7	1.5(0.3)	22.4
대학교 이상	1,622	1.8(0.5)	26.9	4.3(0.7)	15.3	1.8(0.3)	17.6	2.9(0.5)	18.6	0.6(0.2)	29.5	5.6(0.8)	13.5	33.4(1.5)	4.4	48.1(1.6)	3.2	1.4(0.3)	25.4
직업																			
전문행정관리	728	1.5(0.6)	40.6	5.1(1.2)	22.4	1.0(0.2)	23.7	1.6(0.5)	32.5	0.9(0.3)	30.6	5.4(1.0)	18.8	34.3(2.1)	6.1	47.9(2.1)	4.4	2.3(0.9)	38.8
사무직	539	2.1(0.9)	44.9	3.6(1.0)	29.3	2.7(0.7)	24.2	2.2(0.8)	37.5	0.6(0.4)	59.2	4.8(1.3)	27.7	34.5(2.5)	7.1	47.5(2.8)	5.8	2.0(1.0)	49.1
판매·서비스직	728	0.9(0.6)	71.0	7.6(1.5)	20.3	0.3(0.2)	55.3	2.5(0.7)	28.0	0.8(0.3)	38.4	7.2(1.3)	18.0	38.8(2.2)	5.6	40.9(2.3)	5.5	0.9(0.3)	31.0
농림어업	683	0.3(0.2)	55.7	2.4(0.8)	31.7	3.1(0.7)	23.9	1.4(0.5)	38.7	0.4(0.2)	40.9	2.8(0.9)	31.9	45.4(2.4)	5.3	42.6(2.4)	5.7	1.5(0.5)	31.8
기능단순노무직	1,546	2.6(0.8)	29.9	4.8(0.7)	15.5	2.0(0.4)	19.7	2.0(0.4)	18.3	0.8(0.2)	26.1	5.7(0.9)	16.1	35.8(1.5)	4.3	43.9(1.5)	3.4	2.5(0.4)	16.2
기타[3]	1,651	1.9(0.5)	25.0	6.8(0.8)	11.6	1.7(0.3)	18.9	2.6(0.4)	15.9	0.6(0.2)	36.7	6.5(0.8)	12.6	44.5(1.5)	3.3	34.5(1.4)	4.1	0.9(0.2)	25.9
월 가구소득																			
100만원 이하	609	1.8(0.8)	47.3	6.1(1.4)	22.5	2.4(0.7)	28.3	2.7(0.7)	25.8	0.1(0.1)	100.1	5.8(1.6)	27.8	54.9(2.9)	5.3	24.0(2.3)	9.4	2.3(0.5)	21.3
101-200만원	853	1.0(0.5)	47.7	6.2(1.2)	19.5	2.4(0.6)	23.1	1.7(0.6)	35.9	1.1(0.5)	48.5	5.5(1.3)	23.1	45.4(2.4)	5.2	35.4(2.3)	6.4	1.3(0.4)	28.6
201-300만원	1,053	1.9(0.6)	33.3	6.0(1.1)	18.5	1.9(0.3)	17.3	1.5(0.3)	22.1	0.4(0.2)	49.3	5.3(0.9)	16.9	38.8(1.9)	4.8	43.1(2.0)	4.7	1.1(0.3)	30.5
301-400만원	1,019	1.7(0.8)	46.7	5.3(1.1)	20.4	1.8(0.5)	29.2	1.4(0.4)	33.1	1.0(0.3)	30.7	6.2(1.0)	16.1	36.8(2.0)	5.4	44.2(2.1)	4.7	1.7(0.4)	23.1
401만원 이상	2,039	2.0(0.5)	24.8	5.1(0.7)	14.6	1.2(0.3)	20.6	2.9(0.4)	15.1	0.8(0.2)	23.1	5.9(0.6)	10.8	35.4(1.3)	3.6	44.8(1.4)	3.1	1.9(0.5)	24.8
거주유형																			
동	2,196	2.2(0.4)	18.4	7.1(0.7)	9.2	1.4(0.2)	14.8	2.2(0.3)	14.2	0.7(0.2)	24.7	6.7(0.6)	9.0	38.8(1.0)	2.6	39.5(1.1)	2.8	1.5(0.3)	21.3
읍·면	3,680	1.0(0.2)	21.0	2.5(0.3)	13.3	2.2(0.3)	13.0	2.1(0.3)	13.1	0.9(0.2)	18.4	4.1(0.4)	9.3	39.3(1.0)	2.5	45.8(1.1)	2.3	2.0(0.3)	14.0

주 : 1) 보건기관을 이용하지 않는 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건기관을 이용하지 않은 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 205〉 보건기관 질병(고혈압, 당뇨병, 관절염, 아토피·천식, 치매) 홍보 및 교육 경험률

(단위 : %)

구분	보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률[1]		보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률[2]		보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률[3]		보건기관 아토피·천식 홍보 및 교육 경험률[4]		보건기관 치매 홍보 및 교육 경험률[5]	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	25.7(0.6)	2.4	25.3(0.6)	2.5	19.9(0.6)	2.8	17.6(0.5)	3.1	22.6(0.6)	2.7
성										
남자	23.9(0.8)	3.2	23.3(0.8)	3.3	17.9(0.7)	4.0	16.2(0.7)	4.3	20.2(0.8)	3.8
여자	27.6(0.8)	2.9	27.2(0.8)	3.0	21.9(0.7)	3.4	19.0(0.7)	3.8	25.1(0.8)	3.2
연령										
19-29	14.3(1.3)	8.9	14.8(1.3)	8.9	10.1(1.1)	11.0	11.1(1.1)	10.2	13.1(1.2)	9.3
30-39	20.4(1.3)	6.2	19.7(1.2)	6.3	14.1(1.1)	7.6	13.9(1.2)	8.4	17.5(1.2)	6.7
40-49	25.9(1.4)	5.4	26.4(1.4)	5.3	20.4(1.3)	6.2	18.1(1.2)	6.6	23.5(1.4)	5.8
50-59	30.3(1.2)	4.0	29.7(1.2)	4.0	23.8(1.1)	4.7	21.2(1.1)	5.0	25.9(1.1)	4.4
60-69	31.5(1.6)	4.9	30.3(1.5)	5.0	25.0(1.4)	5.7	20.4(1.2)	6.1	26.7(1.4)	5.1
70 이상	36.9(1.4)	3.7	34.4(1.4)	4.0	30.9(1.2)	4.0	22.9(1.1)	5.0	33.4(1.3)	3.9
생애주기별										
19-64	23.6(0.7)	2.9	23.4(0.7)	3.0	17.8(0.6)	3.5	16.5(0.6)	3.7	20.6(0.7)	3.3
65 이상	35.9(1.2)	3.3	34.0(1.2)	3.4	30.0(1.1)	3.5	22.6(0.9)	4.2	32.1(1.1)	3.4
교육수준[6]										
무학	31.8(1.6)	4.9	30.1(1.6)	5.3	27.1(1.4)	5.1	18.6(1.1)	6.1	28.0(1.4)	5.1
초등학교	32.7(1.3)	4.1	31.0(1.3)	4.3	26.0(1.2)	4.7	20.2(1.1)	5.3	28.2(1.2)	4.4
중학교	29.8(1.5)	5.0	29.7(1.5)	5.1	22.9(1.3)	5.8	20.1(1.3)	6.4	26.2(1.4)	5.5
고등학교	22.0(0.9)	4.2	22.1(0.9)	4.2	17.5(0.8)	4.8	16.5(0.8)	4.8	20.0(0.9)	4.4
대학교 이상	24.7(1.0)	4.1	24.3(1.0)	4.1	17.7(0.9)	5.1	16.8(0.9)	5.3	21.2(1.0)	4.7
직업										
전문행정관리	25.8(1.8)	6.9	25.5(1.7)	6.7	19.2(1.5)	8.0	18.2(1.5)	8.3	23.3(1.7)	7.4
사무직	24.1(1.8)	7.4	24.7(1.9)	7.5	17.4(1.6)	9.0	15.9(1.5)	9.7	20.7(1.7)	8.3
판매·서비스직	26.4(1.5)	5.6	26.2(1.5)	5.6	20.0(1.3)	6.6	18.4(1.3)	7.0	22.0(1.4)	6.5
농림어업	40.3(1.5)	3.7	38.9(1.5)	3.8	33.2(1.4)	4.2	26.0(1.3)	4.8	35.4(1.5)	4.2
기능단순노무직	22.8(1.1)	5.0	22.5(1.1)	5.1	17.8(1.1)	5.9	16.2(1.1)	6.5	20.0(1.1)	5.6
기타[7]	24.3(1.0)	4.0	23.4(1.0)	4.1	18.9(0.9)	4.5	16.3(0.8)	4.8	21.7(0.9)	4.2
월 가구소득										
100만원 이하	32.7(1.4)	4.3	31.1(1.4)	4.5	26.2(1.3)	4.9	20.0(1.2)	5.7	28.6(1.3)	4.6
101-200만원	27.1(1.5)	5.5	26.9(1.5)	5.6	21.5(1.4)	6.5	18.3(1.3)	7.3	23.2(1.4)	6.0
201-300만원	26.4(1.4)	5.4	25.6(1.4)	5.4	20.2(1.3)	6.4	18.5(1.2)	6.6	24.1(1.3)	5.5
301-400만원	25.5(1.5)	5.8	25.9(1.6)	6.1	19.7(1.3)	6.4	18.4(1.2)	6.7	22.2(1.4)	6.5
401만원 이상	23.3(1.1)	4.8	22.8(1.1)	4.9	17.5(1.0)	5.6	15.9(1.0)	6.0	20.4(1.1)	5.2
거주유형										
동	23.1(0.9)	3.8	22.9(0.9)	3.9	17.1(0.8)	4.6	15.9(0.8)	4.9	20.3(0.9)	4.2
읍·면	29.6(0.8)	2.8	28.7(0.8)	2.9	24.0(0.8)	3.2	20.1(0.7)	3.6	26.1(0.8)	3.2

주 : 1) 보건기관 고혈압 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 고혈압의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 보건기관 당뇨병 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 당뇨병의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 보건기관 관절염 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 관절염의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 보건기관 아토피·천식 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 아토피·천식의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

5) 보건기관 치매 홍보 및 교육 경험률 : (보건기관에서 치매의 예방 및 관리를 위한 홍보를 보거나 들어본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

6) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

7) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 206〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율[1]

(단위 : %)

구분	이웃상호 신뢰감[2]		상호부조[3]		전반적인 안전수준[4]		자연환경 만족도[5]		생활환경 만족도[6]		대중교통 만족도[7]		의료서비스 만족도[8]	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	64.3(0.8)	1.2	50.6(0.8)	1.6	77.0(0.6)	0.8	81.8(0.6)	0.7	80.1(0.6)	0.8	67.1(0.8)	1.2	69.2(0.8)	1.2
성														
남자	63.8(1.0)	1.5	50.3(1.0)	2.1	78.6(0.7)	1.0	81.5(0.7)	0.9	80.2(0.8)	0.9	67.0(1.0)	1.5	68.8(0.9)	1.4
여자	64.8(0.9)	1.4	50.8(1.0)	1.9	75.4(0.8)	1.1	82.0(0.8)	0.9	80.0(0.8)	1.0	67.2(0.9)	1.3	69.6(0.9)	1.3
연령														
19-29	44.2(2.1)	4.8	30.0(1.9)	6.3	68.1(1.9)	2.7	80.4(1.6)	2.0	73.9(1.8)	2.4	61.2(2.0)	3.2	66.1(1.8)	2.7
30-39	53.9(1.7)	3.2	33.2(1.6)	4.8	66.7(1.5)	2.3	76.2(1.4)	1.8	76.4(1.5)	1.9	59.4(1.8)	3.0	64.7(1.7)	2.6
40-49	66.8(1.5)	2.3	46.0(1.6)	3.4	78.3(1.2)	1.5	81.6(1.2)	1.5	80.4(1.2)	1.5	68.8(1.4)	2.1	69.4(1.5)	2.1
50-59	70.0(1.4)	2.0	60.6(1.7)	2.8	80.2(1.2)	1.4	81.7(1.1)	1.4	81.7(1.0)	1.2	71.5(1.3)	1.9	70.1(1.5)	2.1
60-69	75.4(1.6)	2.2	70.0(2.0)	2.8	83.9(1.2)	1.5	84.4(1.4)	1.6	83.2(1.3)	1.6	71.2(1.6)	2.3	73.3(1.5)	2.1
70 이상	82.0(1.2)	1.5	76.6(1.5)	2.0	90.7(0.9)	0.9	89.6(0.9)	1.0	88.3(0.8)	0.9	73.0(1.3)	1.8	74.6(1.2)	1.6
생애주기별														
19-64	60.6(0.9)	1.5	45.0(0.9)	2.0	74.4(0.7)	1.0	80.4(0.7)	0.8	78.7(0.7)	0.9	65.9(0.9)	1.4	68.2(0.9)	1.3
65 이상	80.5(1.1)	1.3	76.0(1.3)	1.7	89.2(0.8)	0.9	88.2(0.8)	0.9	86.9(0.8)	0.9	72.5(1.2)	1.6	74.0(1.1)	1.5
교육수준[9]														
무학	81.1(1.5)	1.9	76.8(1.6)	2.0	89.1(1.1)	1.2	89.2(1.0)	1.1	88.6(1.0)	1.1	69.2(1.7)	2.5	71.5(1.5)	2.1
초등학교	76.5(1.5)	2.0	72.2(1.7)	2.3	82.8(1.1)	1.4	85.4(1.0)	1.2	83.8(1.1)	1.3	72.5(1.4)	2.0	73.2(1.4)	1.9
중학교	69.4(1.7)	2.4	67.3(1.9)	2.8	77.0(1.6)	2.0	79.6(1.6)	2.0	78.3(1.3)	1.7	73.1(1.6)	2.1	71.6(1.5)	2.1
고등학교	58.5(1.2)	2.1	44.6(1.3)	2.8	74.8(1.0)	1.4	81.5(0.9)	1.1	78.3(1.0)	1.3	67.1(1.1)	1.7	68.2(1.2)	1.8
대학교 이상	59.9(1.6)	2.7	36.0(1.4)	3.9	74.2(1.2)	1.7	79.2(1.1)	1.4	79.2(1.1)	1.3	62.3(1.4)	2.2	67.3(1.4)	2.0
직업														
전문행정관리	60.1(2.2)	3.7	33.6(2.1)	6.2	73.9(1.8)	2.4	78.4(1.6)	2.0	79.1(1.5)	1.9	63.9(2.0)	3.1	68.6(1.9)	2.8
사무직	57.6(2.5)	4.3	35.0(2.2)	6.4	75.7(2.0)	2.7	78.3(1.9)	2.5	79.3(1.8)	2.2	63.9(2.4)	3.7	68.2(2.3)	3.4
판매·서비스직	62.8(1.9)	3.1	48.5(2.1)	4.2	74.8(1.8)	2.4	81.8(1.3)	1.6	81.3(1.3)	1.6	69.4(1.8)	2.7	70.4(1.7)	2.3
농림어업	86.3(1.0)	1.2	94.0(0.8)	0.8	84.9(1.1)	1.3	85.0(1.2)	1.4	79.2(1.1)	1.4	60.7(1.6)	2.6	61.7(1.5)	2.4
기능단순노무직	60.0(1.4)	2.3	47.4(1.4)	2.9	72.6(1.3)	1.8	79.7(1.1)	1.3	78.7(1.1)	1.4	69.6(1.3)	1.8	68.4(1.4)	2.0
기타[10]	65.2(1.1)	1.8	52.3(1.2)	2.4	80.4(0.9)	1.1	84.4(0.9)	1.1	81.4(0.9)	1.1	68.2(1.2)	1.8	71.7(1.2)	1.7
월 가구소득														
100만원 이하	77.3(1.5)	1.9	71.6(1.6)	2.2	84.7(1.2)	1.5	88.2(0.9)	1.1	84.0(1.2)	1.4	69.0(1.5)	2.2	71.0(1.4)	2.0
101-200만원	64.7(1.7)	2.6	61.2(1.7)	2.8	80.6(1.4)	1.7	81.6(1.5)	1.8	79.3(1.5)	1.9	67.1(1.7)	2.5	70.3(1.6)	2.2
201-300만원	60.2(1.7)	2.9	49.6(1.9)	3.8	73.7(1.5)	2.0	81.6(1.4)	1.7	77.1(1.4)	1.8	66.4(1.9)	2.9	67.6(1.8)	2.6
301-400만원	60.2(1.8)	3.0	43.0(2.0)	4.5	72.4(1.6)	2.2	79.1(1.6)	2.0	77.7(1.6)	2.0	67.5(1.7)	2.6	67.7(1.6)	2.4
401만원 이상	63.0(1.4)	2.3	42.2(1.5)	3.6	76.2(1.2)	1.6	81.1(1.0)	1.3	81.3(1.1)	1.3	67.3(1.3)	1.9	70.1(1.4)	2.0
거주유형														
동	57.3(1.2)	2.0	35.0(1.2)	3.4	74.4(0.9)	1.3	83.0(0.8)	1.0	83.6(0.8)	1.0	76.5(1.1)	1.4	77.3(1.2)	1.5
읍·면	74.8(0.7)	1.0	73.3(0.9)	1.3	80.9(0.7)	0.8	80.0(0.7)	0.9	75.1(0.8)	1.1	53.1(1.0)	2.0	57.1(0.9)	1.6

주 : 1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율 : (지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다
3) 이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다
4) 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다
5) 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다
6) 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다
7) 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다
8) 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병의원, 한방병의원, 약국 등)에 대해 만족한다
9) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
10) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 207〉 사회적 연결망 : 친척(가족포함)[1]

(단위 : %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	11,592	19.9(0.7)	3.7	13.4(0.5)	4.1	15.8(0.5)	3.2	14.0(0.5)	3.3	15.7(0.5)	3.2	21.2(0.6)	2.8
성													
남자	5,307	20.8(0.9)	4.5	15.5(0.8)	5.0	16.4(0.7)	4.4	14.5(0.6)	4.3	15.3(0.7)	4.3	17.5(0.7)	4.0
여자	6,285	18.9(0.8)	4.3	11.3(0.6)	5.2	15.2(0.6)	4.1	13.6(0.6)	4.3	16.2(0.7)	4.0	24.9(0.8)	3.2
65세 이상[2]	3,538	17.6(1.0)	5.7	10.3(0.7)	6.7	14.9(0.8)	5.7	16.8(0.9)	5.4	18.7(1.0)	5.2	21.5(1.1)	5.0
연령													
19-29	1,036	32.4(2.1)	6.5	13.9(1.4)	9.9	12.9(1.2)	9.3	9.8(1.2)	11.8	11.7(1.1)	9.7	19.4(1.5)	7.9
30-39	1,602	16.3(1.4)	8.7	13.1(1.1)	8.5	17.9(1.1)	6.4	13.8(1.1)	8.1	15.7(1.0)	6.7	23.3(1.3)	5.7
40-49	1,957	16.5(1.1)	6.9	16.3(1.3)	7.8	18.8(1.2)	6.4	15.2(1.1)	7.1	15.4(1.1)	6.9	17.9(1.1)	5.9
50-59	2,478	18.6(1.1)	5.8	13.7(1.1)	8.3	14.5(0.9)	6.4	13.4(0.9)	7.0	16.5(1.1)	6.7	23.3(1.2)	5.1
60-69	1,932	17.1(1.4)	8.2	11.2(1.2)	10.3	13.2(1.1)	8.2	17.2(1.4)	8.1	18.8(1.3)	6.7	22.5(1.3)	5.9
70 이상	2,587	18.0(1.2)	6.5	9.9(0.8)	7.8	15.9(1.0)	6.4	16.4(1.1)	6.5	18.0(1.2)	6.6	21.8(1.3)	5.8
생애주기별													
19-64	8,054	20.3(0.8)	4.0	14.0(0.6)	4.5	16.0(0.6)	3.6	13.4(0.5)	3.8	15.1(0.6)	3.8	21.1(0.7)	3.2
65 이상	3,538	17.6(1.1)	6.0	10.3(0.7)	6.8	14.9(0.9)	5.9	16.8(0.9)	5.5	18.7(1.0)	5.4	21.5(1.1)	5.0
교육수준[3]													
무학	1,703	20.5(1.5)	7.2	10.0(1.1)	10.7	16.3(1.2)	7.6	15.7(1.1)	7.3	17.6(1.3)	7.3	20.0(1.4)	7.2
초등학교	2,303	16.9(1.3)	7.9	11.7(0.9)	7.8	13.4(1.0)	7.2	15.8(1.1)	6.7	18.2(1.0)	5.6	24.0(1.3)	5.5
중학교	1,390	15.6(1.2)	7.7	10.3(1.1)	10.4	17.5(1.4)	8.2	14.1(1.3)	9.1	17.4(1.4)	7.9	25.1(1.6)	6.6
고등학교	3,728	22.3(1.1)	5.1	13.9(0.8)	6.0	15.7(0.8)	5.2	12.8(0.7)	5.4	15.0(0.8)	5.3	20.3(0.9)	4.4
대학교 이상	2,458	19.2(1.2)	6.5	15.4(1.0)	6.6	16.3(1.1)	6.5	14.4(0.9)	6.6	14.6(0.9)	6.0	20.2(1.1)	5.3
직업													
전문행정관리	1,038	20.9(1.9)	8.9	16.5(1.6)	9.8	13.2(1.3)	10.0	16.8(1.4)	8.5	14.9(1.4)	9.3	17.8(1.5)	8.3
사무직	742	19.8(2.0)	10.1	16.8(2.2)	13.4	16.5(1.7)	10.3	14.5(1.6)	11.4	11.9(1.6)	13.2	20.4(1.9)	9.1
판매·서비스직	1,293	16.6(1.6)	9.7	11.4(1.1)	9.4	17.7(1.5)	8.4	12.7(1.3)	10.3	17.7(1.5)	8.4	23.9(1.5)	6.4
농림어업	2,099	12.8(1.0)	7.9	14.0(1.2)	8.8	13.8(0.8)	6.1	14.2(0.9)	6.2	21.4(1.2)	5.6	23.8(1.4)	5.7
기능단순노무직	2,408	20.7(1.3)	6.1	14.0(1.0)	7.3	17.1(1.1)	6.1	14.3(1.0)	6.7	15.2(0.9)	6.0	18.7(1.0)	5.5
기타[4]	4,010	21.9(1.2)	5.3	11.6(0.8)	6.5	15.5(0.9)	5.5	13.1(0.7)	5.5	15.2(0.8)	5.4	22.7(0.9)	4.1
월 가구소득													
100만원 이하	2,293	20.4(1.3)	6.5	10.0(0.9)	9.4	18.0(1.2)	6.5	15.3(1.0)	6.3	15.7(1.1)	6.8	20.7(1.2)	5.9
101-200만원	1,952	18.4(1.7)	9.2	11.4(1.0)	8.4	13.9(1.2)	8.6	13.7(1.2)	8.9	20.5(1.6)	7.6	22.1(1.5)	6.9
201-300만원	1,927	17.6(1.3)	7.6	12.9(1.3)	9.7	18.2(1.2)	6.7	13.6(1.0)	7.5	16.3(1.1)	6.8	21.3(1.4)	6.8
301-400만원	1,698	19.5(1.7)	8.9	14.0(1.2)	8.9	14.7(1.2)	8.0	14.3(1.2)	8.5	15.4(1.2)	8.0	22.1(1.5)	6.6
401만원 이상	3,085	21.0(1.3)	6.1	15.5(1.0)	6.7	15.3(0.9)	5.9	13.5(0.8)	6.3	14.0(0.8)	5.7	20.6(1.0)	5.0
거주유형													
동	3,229	23.1(1.2)	5.0	13.6(0.8)	6.1	16.0(0.8)	4.7	13.0(0.7)	5.4	13.4(0.7)	5.4	20.9(0.8)	4.0
읍·면	8,363	15.2(0.6)	4.2	13.1(0.6)	4.6	15.4(0.6)	3.6	15.5(0.5)	3.4	19.2(0.7)	3.5	21.6(0.8)	3.9

주 : 1) 사회적 연결망(친척(가족포함)) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(친척(가족포함))(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 208〉 사회적 연결망 : 이웃[1]

(단위 : %)

구분	N	한 달에 1번 미만 % (표준오차)	한 달에 1번 미만 변동계수	한 달에 1번 % (표준오차)	한 달에 1번 변동계수	한 달에 2~3번 % (표준오차)	한 달에 2~3번 변동계수	일주일에 1번 % (표준오차)	일주일에 1번 변동계수	일주일에 2~3번 % (표준오차)	일주일에 2~3번 변동계수	일주일에 4번 이상 % (표준오차)	일주일에 4번 이상 변동계수
전체	11,518	33.6(0.8)	2.5	7.5(0.4)	5.1	7.2(0.4)	5.0	8.6(0.4)	4.1	14.5(0.5)	3.4	28.6(0.6)	2.1
성													
남자	5,259	38.4(1.1)	3.0	8.2(0.6)	6.7	7.0(0.5)	6.8	8.8(0.5)	5.5	13.1(0.6)	4.5	24.4(0.7)	2.8
여자	6,259	28.9(0.9)	3.2	6.8(0.4)	6.5	7.3(0.5)	6.3	8.4(0.5)	5.5	15.8(0.6)	4.1	32.7(0.8)	2.5
65세 이상[2]	3,537	11.6(1.0)	8.7	2.7(0.3)	12.3	5.0(0.5)	10.3	7.3(0.6)	7.8	17.6(0.9)	5.1	55.8(1.2)	2.2
연령													
19-29	1,008	59.7(1.9)	3.2	9.1(1.1)	12.4	7.2(1.0)	14.0	6.7(0.8)	12.4	9.7(1.0)	10.3	7.5(0.9)	11.8
30-39	1,584	43.6(1.7)	3.8	10.5(0.8)	7.7	8.0(0.8)	10.0	9.8(0.8)	8.5	10.8(0.8)	7.4	17.3(1.0)	5.6
40-49	1,938	35.2(1.6)	4.7	8.7(0.8)	9.7	8.8(0.9)	10.1	9.6(0.9)	9.4	15.9(1.1)	7.1	21.7(1.1)	5.1
50-59	2,471	25.6(1.5)	5.7	7.2(0.8)	10.4	6.4(0.6)	9.7	9.2(0.8)	8.4	16.5(1.1)	6.8	35.1(1.4)	3.9
60-69	1,930	15.0(1.5)	10.2	4.3(0.6)	13.6	5.8(0.9)	14.6	8.5(0.9)	10.8	18.2(1.3)	6.9	48.0(1.6)	3.4
70 이상	2,587	10.5(1.1)	10.2	2.4(0.4)	15.9	5.5(0.7)	12.3	6.9(0.7)	10.3	17.1(1.1)	6.2	57.6(1.4)	2.5
생애주기별													
19-64	7,981	38.4(0.9)	2.4	8.6(0.5)	5.3	7.6(0.4)	5.5	8.9(0.4)	4.6	13.8(0.6)	4.0	22.8(0.6)	2.7
65 이상	3,537	11.6(1.0)	8.9	2.7(0.3)	12.4	5.0(0.5)	10.3	7.3(0.6)	8.6	17.6(1.0)	5.5	55.8(1.3)	2.3
교육수준[3]													
무학	1,703	10.6(1.4)	13.3	3.2(0.6)	19.8	4.5(0.6)	14.2	6.4(0.8)	11.9	17.1(1.3)	7.7	58.2(1.8)	3.2
초등학교	2,301	13.8(1.1)	8.2	3.5(0.5)	15.0	6.4(0.8)	13.0	7.7(0.8)	10.6	17.0(1.1)	6.4	51.7(1.5)	2.9
중학교	1,389	19.7(1.6)	7.9	6.9(1.1)	15.4	5.9(0.8)	14.0	6.9(0.8)	11.7	17.9(1.4)	7.9	42.7(1.9)	4.3
고등학교	3,686	37.1(1.3)	3.6	9.0(0.6)	6.7	8.5(0.6)	7.1	8.3(0.5)	6.6	14.4(0.8)	5.7	22.7(0.9)	3.8
대학교 이상	2,429	48.3(1.5)	3.2	8.7(0.7)	8.6	6.8(0.6)	9.1	10.6(0.7)	7.0	11.6(0.8)	6.8	13.9(0.8)	5.5
직업													
전문행정관리	1,024	52.4(2.3)	4.5	6.9(1.0)	14.4	5.9(0.8)	13.4	9.2(1.0)	10.6	12.2(1.2)	10.0	13.4(1.2)	8.7
사무직	735	47.2(2.5)	5.2	11.7(1.4)	12.2	10.3(1.5)	14.4	8.1(1.1)	14.2	10.5(1.3)	12.8	12.3(1.3)	10.3
판매·서비스직	1,283	34.2(2.0)	5.8	8.9(1.1)	12.6	8.0(1.0)	12.6	9.2(0.9)	10.1	14.0(1.2)	8.9	25.7(1.5)	6.0
농림어업	2,096	2.9(0.6)	20.2	2.0(0.4)	20.3	4.4(0.6)	12.7	5.9(0.7)	11.6	17.8(1.0)	5.7	66.9(1.4)	2.2
기능단순노무직	2,386	37.6(1.4)	3.6	8.9(0.8)	9.1	8.6(0.8)	9.5	9.3(0.8)	8.1	13.8(0.8)	6.1	21.8(1.0)	4.6
기타[4]	3,992	28.0(1.2)	4.3	6.7(0.6)	8.9	6.3(0.5)	8.3	8.5(0.5)	6.4	16.1(0.8)	5.2	34.5(1.0)	2.9
월 가구소득													
100만원 이하	2,295	15.6(1.7)	11.2	3.5(0.7)	19.1	4.8(0.5)	11.1	7.4(0.8)	10.3	15.5(1.0)	6.6	53.2(1.6)	3.1
101-200만원	1,947	26.1(1.8)	7.1	5.6(0.7)	13.4	6.1(0.8)	13.3	7.5(0.8)	10.4	15.2(1.1)	7.5	39.6(1.6)	4.0
201-300만원	1,915	34.2(1.6)	4.7	7.2(0.8)	11.1	7.6(0.8)	11.1	9.5(0.9)	9.3	13.4(1.0)	7.8	28.1(1.3)	4.7
301-400만원	1,687	33.6(1.9)	5.5	9.4(1.0)	10.5	7.1(0.8)	11.2	8.8(1.0)	11.3	17.2(1.2)	7.2	23.9(1.4)	5.7
401만원 이상	3,037	43.0(1.6)	3.8	8.8(0.7)	8.1	8.1(0.7)	8.3	9.0(0.7)	7.5	13.0(0.9)	6.6	18.1(0.9)	5.1
거주유형													
동	3,227	42.9(1.2)	2.9	8.6(0.6)	6.8	7.4(0.6)	7.5	8.0(0.5)	6.5	13.4(0.7)	5.5	19.6(0.8)	3.9
읍·면	8,291	20.1(0.8)	4.1	6.0(0.4)	6.1	6.8(0.3)	5.2	9.4(0.4)	4.5	16.1(0.5)	3.2	41.7(0.9)	2.1

주 : 1) 사회적 연결망(이웃) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 사회적 연결망(이웃)(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 209〉 사회적 연결망 : 친구(이웃제외)[1]

(단위 : %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	11,552	18.3(0.5)	2.6	13.2(0.4)	3.4	14.3(0.4)	3.0	11.2(0.4)	3.6	17.8(0.5)	3.0	25.2(0.6)	2.5
성													
남자	5,303	14.9(0.6)	4.3	13.6(0.7)	4.9	15.9(0.7)	4.3	11.6(0.6)	5.0	17.4(0.7)	4.2	26.6(0.9)	3.6
여자	6,249	21.7(0.7)	3.0	12.8(0.6)	4.5	12.6(0.6)	4.4	10.8(0.6)	5.3	18.1(0.7)	4.0	23.9(0.7)	2.9
65세 이상[2]	3,507	32.1(1.1)	3.4	11.8(0.7)	6.2	9.1(0.7)	7.3	9.1(0.7)	7.2	12.7(0.8)	6.4	25.2(1.0)	4.0
연령													
19-29	1,036	6.0(0.9)	14.8	5.3(0.8)	15.3	11.5(1.1)	9.9	11.5(1.2)	10.2	20.7(1.6)	7.5	44.9(2.1)	4.6
30-39	1,603	16.5(1.2)	7.3	15.0(1.1)	7.0	17.6(1.1)	6.2	13.4(1.0)	7.6	20.2(1.2)	5.8	17.3(1.1)	6.4
40-49	1,954	17.7(1.2)	6.5	15.8(1.1)	6.7	18.0(1.2)	6.9	11.4(0.9)	7.9	17.5(1.1)	6.6	19.6(1.2)	6.1
50-59	2,471	17.9(1.0)	5.7	15.7(1.0)	6.3	14.9(1.0)	6.4	10.9(0.8)	6.9	17.8(1.1)	6.2	22.7(1.2)	5.1
60-69	1,929	24.6(1.4)	5.7	15.0(1.0)	6.6	11.3(0.9)	8.1	9.3(1.0)	10.5	16.1(1.3)	7.8	23.7(1.4)	6.0
70 이상	2,559	34.2(1.3)	3.9	11.4(0.9)	7.7	8.7(0.8)	9.5	9.2(0.9)	9.9	11.9(1.0)	8.0	24.6(1.1)	4.5
생애주기별													
19-64	8,045	15.4(0.5)	3.4	13.5(0.5)	3.8	15.4(0.5)	3.2	11.6(0.5)	4.1	18.8(0.6)	3.3	25.3(0.7)	2.8
65 이상	3,507	32.1(1.1)	3.5	11.8(0.7)	6.3	9.1(0.7)	7.6	9.1(0.7)	7.7	12.7(0.8)	6.5	25.2(1.0)	4.1
교육수준[3]													
무학	1,680	41.9(1.8)	4.2	9.5(1.0)	10.1	6.8(0.8)	11.7	7.2(1.0)	14.5	10.6(1.1)	10.8	24.0(1.5)	6.2
초등학교	2,289	27.8(1.3)	4.5	17.2(1.1)	6.7	10.7(0.8)	7.5	10.2(0.9)	8.8	13.0(0.9)	7.1	21.0(1.1)	5.4
중학교	1,387	19.2(1.3)	7.0	13.9(1.2)	8.6	13.1(1.1)	8.2	10.3(1.1)	10.6	19.4(1.6)	8.1	24.1(1.6)	6.5
고등학교	3,728	14.1(0.7)	4.8	11.7(0.6)	5.5	15.3(0.7)	4.5	10.2(0.6)	5.6	18.5(0.8)	4.5	30.3(1.0)	3.3
대학교 이상	2,458	13.2(1.0)	7.3	14.3(0.9)	6.5	16.9(1.0)	5.8	14.3(0.9)	6.0	20.1(1.1)	5.7	21.2(1.2)	5.7
직업													
전문행정관리	1,037	11.5(1.1)	9.1	14.8(1.5)	9.8	19.0(1.6)	8.4	13.5(1.2)	9.1	19.8(1.7)	8.7	21.4(2.0)	9.5
사무직	741	11.4(1.4)	12.2	14.4(1.5)	10.4	18.1(2.0)	10.8	16.9(1.7)	10.0	18.8(1.9)	10.1	20.4(1.7)	8.6
판매·서비스직	1,291	12.9(1.2)	9.1	12.2(1.2)	9.8	15.4(1.4)	9.3	12.4(1.4)	11.4	18.8(1.5)	7.8	28.4(1.5)	5.4
농림어업	2,091	26.0(1.2)	4.6	14.1(0.9)	6.2	12.7(0.9)	7.0	9.5(0.8)	8.1	16.6(1.3)	7.7	21.0(1.2)	5.8
기능단순노무직	2,406	16.1(0.9)	5.7	15.1(0.9)	6.2	15.4(0.9)	6.0	11.8(0.8)	7.1	18.7(1.1)	5.9	22.9(1.2)	5.2
기타[4]	3,984	24.4(1.0)	3.9	11.0(0.7)	6.2	10.7(0.7)	6.1	8.5(0.5)	6.5	16.0(0.8)	5.0	29.5(1.1)	3.6
월 가구소득													
100만원 이하	2,272	35.3(1.4)	3.9	11.1(0.8)	7.4	8.8(0.8)	8.8	7.5(0.7)	9.4	11.6(0.9)	7.5	25.6(1.4)	5.5
101-200만원	1,942	22.5(1.3)	5.8	13.2(1.1)	8.0	11.8(0.9)	7.7	11.3(1.0)	8.9	15.8(1.2)	7.8	25.4(1.4)	5.4
201-300만원	1,923	15.3(1.1)	6.9	13.0(1.1)	8.2	17.3(1.1)	6.4	10.4(0.9)	8.4	18.6(1.3)	6.8	25.4(1.5)	5.7
301-400만원	1,697	16.3(1.0)	6.3	14.3(1.1)	7.9	13.8(1.1)	7.8	12.6(1.1)	8.5	19.7(1.2)	6.3	23.4(1.4)	6.1
401만원 이상	3,082	13.0(0.8)	5.9	13.4(0.8)	6.0	16.0(0.8)	5.2	12.4(0.7)	5.7	18.9(0.9)	4.8	26.2(1.1)	4.4
거주유형													
동	3,230	14.6(0.7)	4.7	12.8(0.7)	5.3	15.1(0.6)	4.3	11.6(0.6)	5.3	18.8(0.8)	4.4	27.1(0.9)	3.5
읍·면	8,322	23.8(0.6)	2.5	13.7(0.5)	3.4	13.1(0.4)	3.3	10.5(0.4)	3.7	16.3(0.5)	3.1	22.6(0.7)	2.9

주 : 1) 사회적 연결망(친구(이웃제외)) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 사회적 연결망(친구(이웃제외))(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 210〉 사회활동 참여율[1] (단위 : %)

구분	종교 활동		친목 활동		여가 / 레저 활동		자선단체 활동	
	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	시간(표준오차)	변동계수
전체	24.7(0.7)	2.8	62.1(0.7)	1.1	31.5(0.7)	2.3	7.8(0.4)	4.7
성								
남자	18.2(0.8)	4.3	66.3(0.9)	1.4	39.7(1.0)	2.5	7.1(0.4)	5.9
여자	31.2(0.9)	2.8	58.0(0.9)	1.5	23.2(0.8)	3.3	8.6(0.5)	6.1
연령								
19-29	16.5(1.4)	8.7	46.2(2.0)	4.3	36.8(1.8)	4.9	3.4(0.6)	18.2
30-39	19.8(1.2)	6.3	61.1(1.5)	2.5	37.3(1.5)	4.0	6.4(0.8)	13.2
40-49	23.0(1.3)	5.8	72.3(1.3)	1.8	40.4(1.6)	4.1	12.6(1.1)	8.4
50-59	29.9(1.3)	4.3	75.1(1.3)	1.7	31.7(1.3)	4.1	11.0(0.9)	8.0
60-69	31.7(1.6)	5.0	67.2(1.6)	2.3	20.5(1.4)	6.8	7.1(0.9)	13.3
70 이상	31.7(1.5)	4.8	43.5(1.6)	3.7	10.0(0.8)	8.5	3.6(0.6)	16.7
생애주기별								
19-64	23.2(0.8)	3.4	65.0(0.8)	1.2	35.6(0.8)	2.4	8.6(0.4)	5.0
65 이상	32.0(1.2)	3.9	48.8(1.4)	2.8	12.0(0.9)	7.3	4.3(0.5)	12.3
교육수준[2]								
무학	31.3(1.7)	5.5	36.3(1.7)	4.8	3.9(0.6)	14.8	2.4(0.7)	30.7
초등학교	28.5(1.4)	4.8	57.3(1.4)	2.5	13.3(1.0)	7.7	3.9(0.5)	14.1
중학교	25.4(1.5)	5.9	69.5(1.7)	2.5	20.4(1.4)	6.7	8.7(0.9)	10.0
고등학교	21.3(1.0)	4.9	62.2(1.2)	1.9	33.9(1.1)	3.3	6.8(0.5)	7.5
대학교 이상	25.6(1.2)	4.7	68.7(1.3)	1.9	47.1(1.4)	2.9	12.0(0.9)	7.6
직업								
전문행정관리	28.1(1.7)	6.1	70.2(1.7)	2.4	51.4(2.1)	4.0	14.6(1.4)	9.8
사무직	18.1(1.7)	9.2	69.8(2.2)	3.1	49.2(2.5)	5.0	9.8(1.3)	12.9
판매·서비스직	27.9(1.7)	6.2	71.3(1.8)	2.5	32.4(1.6)	4.8	10.7(1.0)	9.7
농림어업	25.5(1.4)	5.5	66.5(1.4)	2.1	15.3(0.9)	6.2	7.3(0.7)	9.1
기능단순노무직	18.4(1.0)	5.7	67.7(1.2)	1.7	30.9(1.3)	4.3	5.3(0.5)	10.3
기타[3]	28.1(1.1)	3.8	48.6(1.2)	2.4	23.5(1.0)	4.4	5.6(0.5)	8.9
월 가구소득								
100만원 이하	30.9(1.4)	4.4	41.2(1.5)	3.6	10.6(1.0)	9.1	3.0(0.6)	19.1
101-200만원	26.8(1.6)	5.9	54.7(1.8)	3.3	19.8(1.3)	6.4	5.4(0.6)	10.6
201-300만원	24.5(1.7)	7.1	63.3(1.4)	2.3	28.6(1.5)	5.2	6.8(0.8)	11.1
301-400만원	22.0(1.5)	6.7	64.6(1.5)	2.3	34.8(1.7)	4.8	7.2(0.8)	11.3
401만원 이상	23.5(1.3)	5.7	70.0(1.3)	1.8	42.8(1.3)	3.1	11.2(0.8)	6.8
거주유형								
동	24.7(1.0)	4.1	65.3(1.1)	1.7	35.0(1.1)	3.2	7.9(0.6)	7.1
읍·면	24.7(0.8)	3.3	57.4(0.8)	1.3	26.4(0.8)	3.1	7.7(0.4)	5.0

주 : 1) 사회활동 참여율 : (한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동에 참여하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 211〉 손 씻기 감염병 예방 인지율[1)]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,488	99.0(0.1)	0.1	5,259	98.8(0.2)	0.2	6,229	99.3(0.1)	0.1
연령									
19-29	1,034	99.4(0.3)	0.3	469	99.0(0.6)	0.6	565	99.9(0.0)	0.0
30-39	1,600	98.9(0.3)	0.3	756	98.3(0.5)	0.5	844	99.5(0.2)	0.2
40-49	1,954	99.5(0.2)	0.2	964	99.7(0.1)	0.1	990	99.2(0.3)	0.3
50-59	2,468	99.5(0.2)	0.2	1,172	99.2(0.3)	0.3	1,296	99.7(0.1)	0.1
60-69	1,915	98.6(0.3)	0.3	884	98.5(0.4)	0.4	1,031	98.8(0.5)	0.5
70 이상	2,517	97.6(0.4)	0.4	1,014	96.4(0.7)	0.7	1,503	98.4(0.3)	0.3
생애주기별									
19-64	8,029	99.3(0.1)	0.1	3,828	99.0(0.2)	0.2	4,201	99.6(0.1)	0.1
65 이상	3,459	97.8(0.3)	0.3	1,431	97.1(0.5)	0.6	2,028	98.3(0.3)	0.3
교육수준[2)]									
무학	1,654	97.3(0.5)	0.5	317	94.5(1.6)	1.7	1,337	97.9(0.4)	0.4
초등학교	2,267	98.3(0.4)	0.4	946	97.4(0.6)	0.7	1,321	98.9(0.4)	0.4
중학교	1,383	98.9(0.3)	0.3	678	98.4(0.4)	0.4	705	99.4(0.4)	0.4
고등학교	3,719	99.1(0.2)	0.2	1,918	98.7(0.4)	0.4	1,801	99.5(0.1)	0.1
대학교 이상	2,455	99.8(0.1)	0.1	1,397	99.7(0.2)	0.2	1,058	99.9(0.1)	0.1
직업									
전문행정관리	1,037	99.6(0.1)	0.1	544	99.4(0.0)	0.0	493	99.8(0.2)	0.2
사무직	742	99.6(0.3)	0.3	382	99.3(0.6)	0.6	360	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	1,291	99.1(0.3)	0.3	421	99.0(0.7)	0.7	870	99.2(0.3)	0.3
농림어업	2,067	98.5(0.3)	0.3	1,186	98.1(0.4)	0.4	881	99.0(0.3)	0.3
기능단순노무직	2,397	98.9(0.2)	0.2	1,577	98.8(0.3)	0.3	820	99.1(0.3)	0.3
기타[3)]	3,952	98.9(0.2)	0.2	1,148	98.2(0.5)	0.5	2,804	99.2(0.1)	0.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,242	97.7(0.4)	0.4	843	96.8(0.7)	0.8	1,399	98.3(0.3)	0.3
101-200만원	1,934	98.2(0.5)	0.5	884	97.5(0.9)	0.9	1,050	98.8(0.3)	0.4
201-300만원	1,912	99.2(0.3)	0.3	932	99.3(0.5)	0.5	980	99.1(0.3)	0.3
301-400만원	1,691	99.3(0.3)	0.3	827	99.1(0.4)	0.5	864	99.6(0.2)	0.2
401만원 이상	3,081	99.5(0.1)	0.1	1,500	99.3(0.2)	0.2	1,581	99.8(0.1)	0.1
거주유형									
동	3,222	99.4(0.2)	0.2	1,462	99.2(0.3)	0.3	1,760	99.7(0.1)	0.1
읍·면	8,266	98.4(0.2)	0.2	3,797	98.2(0.2)	0.2	4,469	98.7(0.2)	0.2

주 : 1) 손 씻기 감염병 예방 인지율 : ("매우 도움이 된다" 또는 "도움이 된다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 212〉 손 씻기 실천율 (단위 : %)

구분	식사 전[1]			화장실 다녀온 후[2]			외출 후[3]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	86.3(0.5)	0.5	11,598	90.4(0.3)	0.4	11,597	82.2(0.5)	0.6
성									
남자	5,311	80.1(0.8)	1.0	5,311	86.1(0.6)	0.7	5,311	78.7(0.7)	0.9
여자	6,288	92.6(0.4)	0.5	6,287	94.6(0.3)	0.3	6,286	85.8(0.5)	0.6
연령									
19-29	1,036	80.3(1.5)	1.9	1,036	94.9(0.8)	0.8	1,036	84.1(1.3)	1.6
30-39	1,603	88.5(1.0)	1.2	1,603	95.0(0.7)	0.7	1,603	87.4(1.0)	1.1
40-49	1,957	87.8(1.0)	1.1	1,957	91.6(0.8)	0.8	1,957	84.5(1.0)	1.1
50-59	2,481	89.2(0.8)	0.9	2,481	89.6(0.8)	0.9	2,480	82.4(0.9)	1.1
60-69	1,933	88.5(1.0)	1.2	1,932	87.3(1.0)	1.2	1,932	80.5(1.2)	1.5
70 이상	2,589	82.6(1.0)	1.2	2,589	79.3(1.0)	1.3	2,589	69.4(1.2)	1.8
생애주기별									
19-64	8,059	86.8(0.5)	0.6	8,059	92.3(0.4)	0.4	8,058	84.2(0.5)	0.6
65 이상	3,540	84.4(0.8)	1.0	3,539	81.5(0.9)	1.1	3,539	72.8(1.0)	1.4
교육수준[4]									
무학	1,705	83.4(1.2)	1.4	1,704	80.9(1.2)	1.5	1,704	69.4(1.5)	2.2
초등학교	2,306	85.1(1.1)	1.2	2,306	81.4(1.1)	1.3	2,306	73.2(1.2)	1.6
중학교	1,390	90.5(1.0)	1.1	1,390	89.9(1.0)	1.1	1,389	82.4(1.2)	1.4
고등학교	3,730	84.3(0.9)	1.0	3,730	92.4(0.6)	0.6	3,730	82.8(0.8)	1.0
대학교 이상	2,458	88.9(0.7)	0.8	2,458	94.3(0.6)	0.6	2,458	88.7(0.8)	0.9
직업									
전문행정관리	1,038	90.3(1.0)	1.1	1,038	94.8(0.8)	0.8	1,038	89.6(1.0)	1.2
사무직	742	86.1(1.6)	1.9	742	94.8(1.1)	1.1	742	87.6(1.4)	1.6
판매·서비스직	1,294	90.7(1.0)	1.1	1,294	95.0(0.8)	0.8	1,294	85.7(1.3)	1.5
농림어업	2,099	83.9(1.0)	1.2	2,099	78.3(1.1)	1.4	2,099	71.7(1.3)	1.8
기능단순노무직	2,411	83.8(1.0)	1.2	2,411	88.4(0.8)	0.9	2,410	81.1(1.0)	1.2
기타[5]	4,013	85.6(0.9)	1.0	4,012	90.3(0.6)	0.7	4,012	80.2(0.9)	1.1
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	82.7(1.1)	1.3	2,297	79.5(1.0)	1.3	2,297	73.0(1.3)	1.7
101-200만원	1,953	87.8(1.0)	1.2	1,953	90.6(0.8)	0.8	1,953	81.6(1.2)	1.5
201-300만원	1,927	85.3(1.0)	1.2	1,926	91.0(0.8)	0.9	1,926	83.7(1.1)	1.3
301-400만원	1,698	85.3(1.1)	1.3	1,698	91.6(0.9)	1.0	1,698	81.5(1.2)	1.4
401만원 이상	3,086	87.9(0.8)	0.9	3,086	93.3(0.6)	0.6	3,086	85.6(0.8)	1.0
거주유형									
동	3,231	86.7(0.7)	0.8	3,230	92.6(0.5)	0.5	3,230	84.2(0.7)	0.8
읍·면	8,368	85.8(0.5)	0.6	8,368	87.2(0.4)	0.5	8,367	79.4(0.5)	0.7

주 : 1) 손 씻기 실천율(식사 전) : (식사하기 전 손을 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 손 씻기 실천율(화장실 다녀온 후) : (화장실 다녀온 후 손을 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 손 씻기 실천율(외출 후) : (외출 후 집에 돌아왔을 때 손을 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 213〉 비누, 손 세정제 사용률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	74.7(0.5)	0.7	5,311	73.8(0.8)	1.1	6,287	75.6(0.7)	0.9
연령									
19-29	1,036	82.5(1.5)	1.8	471	79.3(2.3)	2.9	565	86.4(1.7)	2.0
30-39	1,603	83.9(1.1)	1.3	758	80.8(1.9)	2.3	845	87.1(1.3)	1.5
40-49	1,957	79.3(1.1)	1.3	965	79.1(1.5)	1.9	992	79.6(1.6)	2.0
50-59	2,481	72.9(1.1)	1.5	1,179	71.1(1.6)	2.2	1,302	74.8(1.5)	2.0
60-69	1,932	65.5(1.3)	1.9	895	64.6(1.9)	3.0	1,037	66.3(1.8)	2.7
70 이상	2,589	54.0(1.4)	2.6	1,043	54.4(2.1)	3.8	1,546	53.8(1.7)	3.2
생애주기별									
19-64	8,059	78.4(0.6)	0.7	3,845	76.6(0.8)	1.1	4,214	80.4(0.7)	0.9
65 이상	3,539	57.4(1.2)	2.1	1,466	57.8(1.6)	2.8	2,073	57.2(1.5)	2.6
교육수준[2]									
무학	1,704	47.7(1.7)	3.6	327	36.4(3.7)	10.3	1,377	50.5(1.9)	3.8
초등학교	2,306	62.9(1.4)	2.2	972	58.1(2.0)	3.5	1,334	66.3(1.8)	2.7
중학교	1,390	72.2(1.6)	2.2	684	69.9(2.2)	3.1	706	74.2(2.1)	2.8
고등학교	3,730	77.4(0.9)	1.1	1,925	75.1(1.2)	1.6	1,805	80.0(1.1)	1.4
대학교 이상	2,458	84.4(0.9)	1.1	1,400	81.3(1.3)	1.6	1,058	88.9(1.2)	1.4
직업									
전문행정관리	1,038	84.6(1.4)	1.6	545	82.1(1.9)	2.4	493	87.6(2.0)	2.3
사무직	742	83.2(1.6)	2.0	382	79.2(2.5)	3.2	360	88.7(1.8)	2.0
판매·서비스직	1,294	79.3(1.4)	1.8	423	77.2(2.7)	3.5	871	80.5(1.6)	2.0
농림어업	2,099	60.0(1.3)	2.1	1,204	59.9(1.6)	2.7	895	60.3(1.8)	3.0
기능단순노무직	2,411	74.8(1.1)	1.4	1,586	76.8(1.3)	1.7	825	69.8(2.0)	2.9
기타[3]	4,012	70.8(1.0)	1.3	1,170	67.2(1.7)	2.5	2,842	72.6(1.1)	1.5
월 가구소득									
100만원 이하	2,297	56.6(1.6)	2.8	863	55.6(2.3)	4.1	1,434	57.3(1.8)	3.2
101-200만원	1,953	72.2(1.4)	1.9	898	71.1(1.9)	2.6	1,055	73.1(1.9)	2.5
201-300만원	1,926	76.3(1.1)	1.5	939	77.6(1.6)	2.1	987	74.8(1.6)	2.1
301-400만원	1,698	76.4(1.3)	1.6	831	74.1(2.0)	2.7	867	78.9(1.7)	2.2
401만원 이상	3,086	80.4(0.9)	1.1	1,504	77.8(1.3)	1.7	1,582	83.2(1.1)	1.3
거주유형									
동	3,230	78.4(0.8)	1.0	1,467	77.1(1.2)	1.5	1,763	79.7(1.0)	1.3
읍·면	8,368	69.4(0.7)	1.0	3,844	69.3(0.9)	1.3	4,524	69.5(0.8)	1.2

주 : 1) 비누, 손 세정제 사용률 : (평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 "항상 사용한다" 또는 "자주 사용한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 214〉 손 씻기 교육 및 홍보 경험률[1]

(단위 : %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,576	61.4(0.7)	1.2	5,304	57.9(0.9)	1.6	6,272	64.8(0.9)	1.4
연령									
19-29	1,035	66.2(2.0)	3.0	470	63.3(2.8)	4.5	565	69.6(2.4)	3.4
30-39	1,603	69.8(1.4)	2.0	758	62.7(1.9)	3.0	845	77.5(1.7)	2.2
40-49	1,957	70.0(1.4)	2.0	965	64.9(2.0)	3.0	992	75.5(2.0)	2.7
50-59	2,481	61.5(1.3)	2.2	1,179	56.3(1.8)	3.3	1,302	67.1(1.7)	2.5
60-69	1,929	54.1(1.6)	3.0	894	51.9(2.2)	4.2	1,035	55.8(2.1)	3.8
70 이상	2,571	33.8(1.4)	4.1	1,038	33.9(2.0)	5.8	1,533	33.7(1.7)	5.0
생애주기별									
19-64	8,056	66.0(0.8)	1.2	3,843	61.1(1.0)	1.7	4,213	71.2(1.0)	1.4
65 이상	3,520	39.6(1.3)	3.2	1,461	39.1(1.8)	4.5	2,059	39.9(1.5)	3.7
교육수준[2]									
무학	1,691	29.2(1.6)	5.4	326	21.9(2.8)	12.8	1,365	31.0(1.8)	5.7
초등학교	2,302	47.9(1.5)	3.0	969	41.9(2.2)	5.1	1,333	52.1(1.9)	3.6
중학교	1,387	59.0(1.9)	3.2	682	50.2(2.5)	4.9	705	66.5(2.7)	4.0
고등학교	3,729	64.7(1.1)	1.6	1,925	59.0(1.4)	2.4	1,804	71.2(1.4)	2.0
대학교 이상	2,457	72.1(1.3)	1.8	1,399	66.5(1.7)	2.5	1,058	80.0(1.6)	2.0
직업									
전문행정관리	1,038	74.9(1.6)	2.2	545	64.6(2.3)	3.5	493	87.0(1.7)	2.0
사무직	742	70.2(2.3)	3.2	382	68.3(3.0)	4.4	360	72.8(2.7)	3.8
판매·서비스직	1,294	72.7(1.6)	2.2	423	72.0(2.5)	3.5	871	73.0(2.1)	2.8
농림어업	2,094	47.3(1.4)	3.0	1,201	46.6(1.7)	3.7	893	48.5(1.9)	4.0
기능단순노무직	2,411	58.1(1.4)	2.4	1,586	57.0(1.5)	2.7	825	60.9(2.5)	4.2
기타[3]	3,995	55.4(1.2)	2.2	1,166	50.0(2.1)	4.2	2,829	58.1(1.3)	2.2
월 가구소득									
100만원 이하	2,283	40.6(1.5)	3.7	858	40.6(2.5)	6.2	1,425	40.5(1.7)	4.1
101-200만원	1,952	55.5(1.7)	3.0	898	50.6(2.1)	4.2	1,054	60.0(2.2)	3.6
201-300만원	1,927	63.2(1.6)	2.5	939	58.6(2.2)	3.7	988	68.2(2.0)	3.0
301-400만원	1,698	64.5(1.8)	2.9	831	59.9(2.4)	3.9	867	69.5(2.0)	2.9
401만원 이상	3,083	69.3(1.2)	1.8	1,503	65.1(1.7)	2.7	1,580	73.8(1.5)	2.1
거주유형									
동	3,229	62.4(1.1)	1.8	1,467	57.6(1.4)	2.5	1,762	67.1(1.3)	2.0
읍·면	8,347	59.8(0.8)	1.4	3,837	58.4(1.0)	1.8	4,510	61.2(1.0)	1.6

주 : 1) 손 씻기 교육 및 홍보 경험률 : (최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

제4부 부록

Community Health Survey

Ⅰ. 지표정의
Ⅱ. 개인조사표
Ⅲ. 가구조사표
Ⅳ. 2010-2013 순환조사지표

제4부 ≫ 부록

Ⅰ. 지표정의

1. 현재흡연율 / 남자 현재흡연율

분자	평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수
분모	조사대상 응답자 수 / 조사대상 응답자 중 "남자"의 수
단위	%

2. 흡연시작연령

분자	처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합
분모	평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수
단위	세

3. 흡연자의 금연시도율

분자	최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수
분모	현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수
단위	%

4. 흡연자의 1개월 내 금연계획률

분자	현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수
분모	현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수
단위	%

5. 금연캠페인 경험률

분자	최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

6. 금연교육 경험률 / 현재 흡연자의 금연교육 경험률

분자	최근 1년(365일) 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수 / 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수
단위	%

7. 월간음주율

분자	최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

8. 음주시작연령

분자	처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합
분모	1잔 이상의 술을 마신 음주자 수
단위	세

9. 고위험음주율

분자	최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수
분모	최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수
단위	%

10. 운전 시 안전벨트 착용률

분자	자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수
분모	자동차 운전자 수
단위	%

11. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

분자	다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수
분모	동승차량 앞좌석 탑승자 수
단위	%

12. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

분자	최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람의 수
분모	자동차 또는 오토바이 운전자 수
단위	%

13. 격렬한 신체활동 실천율

분자	최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

14. 중등도 신체활동 실천율

분자	최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

15. 중등도 이상 신체활동 실천율

분자	최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

16. 걷기 실천율

분자	최근 1주일(7일) 동안 걷기를 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

17. 저염선호율(Type Ⅰ, Type Ⅱ, Type Ⅲ)

분자	① 평소 음식을 먹을 때 "약간 싱겁게 먹는다" 또는 "아주 싱겁게 먹는다"에 응답한 사람의 수 ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 "전혀 더 넣지 않는다"에 응답한 사람의 수 ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 "찍어 먹지 않는다"에 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%
비고	3문항 중 한 가지만 선택한 경우 Type Ⅰ, 두 가지를 선택한 경우 Type Ⅱ, 세 가지 모두 선택 시 Type Ⅲ

18. 가공식품 선태 시 영양표시 이용률

분자	영양표시를 "항상 읽는다" 또는 "가끔 읽는다"에 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

19. 영양교육 및 상담수혜율

분자	최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

20. 식품 안정성 확보율

분자	"우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다" 또는 "우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다"에 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

21. 비만율

분자	체질량지수(kg/㎡) 25 이상인 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

22. 주관적 비만인지율

분자	"약간 비만" 또는 "매우 비만"이라고 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

23. 체중조절 시도율

분자	최근 1년(365일) 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

24. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

분자	"나쁘다" 또는 "매우 나쁘다"에 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

25. 저작불편호소율(65세 이상)

분자	"매우 불편하다" 또는 "불편하다"에 응답한 사람의 수
분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%

26. 틀니 이용 행태_위아래 둘 다 있음, 위쪽만 있음, 아래쪽만 있음(65세 이상)

분자	틀니 이용 행태별 사람의 수
분모	65세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%

27. 점심식사 후 칫솔질 실천율

분자	점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수
분모	점심식사 한 사람의 수
단위	%

28. 구강검진 수진율

분자	최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

29. 연간 스케일링 경험률

분자	최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

30. 치과진료 미치료율

분자	최근 1년(365일) 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

31. 스트레스 인지율

분자	평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느낀다"에 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

32. 우울감 경험률

분자	최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

33. 연간 인플루엔자 예방접종률

분자	최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

34. 만성·급성질환 및 사고중독 경험률

분자	최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

35. 고혈압 평생 의사진단 경험률(30세 이상)

분자	의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수
분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%

36. 고혈압 약물치료율(30세 이상)

분자	현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수
분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%

37. 고혈압 관리교육 이수율(30세 이상)

분자	고혈압 관리교육을 받은 사람의 수
분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%

38. 당뇨병 평생 의사진단 경험률(30세 이상)

분자	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수
분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%

39. 당뇨병 치료율(30세 이상)

분자	현재 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한다고 응답한 사람의 수
분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%

40. 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상)

분자	당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수
분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%

41. 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율(30세 이상)

분자	최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수
분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%

42. 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율(30세 이상)

분자	최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수
분모	의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수
단위	%

43. 관절염 평생 의사진단 경험률(50세 이상)

분자	의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수
분모	50세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%

44. 관절염 관리교육 이수율(50세 이상)

분자	관절염 관리교육을 받은 사람의 수
분모	의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수
단위	%

45. 이상지질혈증 평생 의사진단 경험률(30세 이상)

분자	의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수
분모	30세 이상 조사대상 응답자 수
단위	%

46. 대사증후군 인지율

분자	대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

47. 에이즈 인지율

분자	에이즈에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

48. 필요의료서비스 미치료율

분자	최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

49. 연간 사고중독 경험률

분자	연간 사고중독 경험자 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

50. 양호한 주관적 건강수준 인지율

분자	주관적 건강수준을 "매우 좋다" 또는 "좋다"에 응답한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

51. 침상와병 경험률

분자	최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

52. 결근결석 경험률

분자	최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 학교나 직장에 가지 못한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

53. 오늘의 건강상태(EQ-VAS)

분자	건강상태 점수의 총 합
분모	조사대상 응답자 수
단위	평균

54. 보건기관 이용률

분자	최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수
분모	조사대상 응답자 수
단위	%

55. 보건기관 서비스 만족도

분자	"대단히 만족 한다" 또는 "만족한 편이다"에 응답한 사람의 수
분모	최근 1년(365일) 동안 보건기관('보건소(보건의료원)', '보건지소', '보건진료소')을 이용한 사람의 수
단위	%

제4부 » 부록

Ⅱ. 개인조사표

CHS

다음은 2013년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. ➔

	지역사회건강조사 **Community Health Survey**	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

안녕하십니까?

질병관리본부에서는「지역보건법」제4조(지역보건의료계획의 내용),「지역보건법 시행령」제4조(지역보건의료계획의 수립방법 등), 제5조(지역보건의료계획의 수립시기 등)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 253개 보건소에서 매년 8월에서 10월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 본인이 조사에 응하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)
① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

보건복지부

질병관리본부

시도 보건소 표본지점 가구 가구원

관리번호 :

2013년 지역사회건강조사 참여 동의서

본인은 『지역사회건강조사』 내용을 충분히 이해하고 자의(自意)에 의해 건강면접조사에 참여합니다.

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강통계 생산을 목적으로 수행되고 있으며, 수집된 정보는 통계용으로만 활용됩니다. 또한, 개인을 구별할 수 있는 정보가 발표되거나 공개되지 않으며, 설문에 대한 참여는 조사대상자의 자발적인 동의하에 이루어집니다.

○ 수집 개인정보 범위 : 성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 주소
○ 개인정보 보유기간 : 조사수행일부터 2014년 2월 28일까지
※ 2014년 3월 1일, 수집된 개인정보 파기
○ 개인정보 이용목적 : 조사의 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

※ 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 지역사회건강조사 홈페이지 (http://chs.cdc.go.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

2013년 월 일

참여자 성명 : ____________(인) 또는 서명
설명자 성명 : ____________(인) 또는 서명

승인번호
제117075호

2013년 지역사회건강조사

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하시오.

시도번호	보건소번호			표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자

성명		주민등록 생년월일	□□□□년 □□월 □□일 가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.
성별	① 남자 ② 여자		

조사원명 ____________________(서명)

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

□

흡연

1. 지금까지 살아오는 동안 5갑(100개비) 이상의 담배를 피웠습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 6번 문항으로)

1-1. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까?

만 □□□세 888. 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음)

□

□□□세
888. 비해당

2. 현재 담배를 피웁니까?

□
8. 비해당

① 매일 피움 ➡ 하루 평균 흡연량 □□□개비 (➡ 3번 문항으로)
888. 비해당(문항1/②, 문항2/②③)

□□□개비
888. 비해당

② 가끔 피움 ➡ 지난 1달간 흡연일 수 □□일
➡ 흡연하는 날 하루 평균 흡연량 □□□개비 (➡ 3번 문항으로)
88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①③)

□□일
□□□개비
88 888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음
➡ 과거흡연 기간 □□년 □□개월
➡ 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량 □□□개비 (➡ 6번 문항으로)
88 88 888. 비해당(문항1/②, 문항2/①②)

□□년□□월
□□□개비
88 88 888. 비해당

⑧ 비해당(문항 1/②: 평생 5갑(100개비)이상 피우지 않았음)

3. 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

① 최근 1년간 금연한 적이 있다
② 과거에는 있었지만, 최근 1년간 없다
③ 금연한 적이 없다
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

□
8. 비해당

4. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2/③: 과거흡연자)

□
8. 비해당

5. 본인이 담배를 피우는 것에 대하여 주위 사람들로부터 담배를 끊거나 줄이라는 말을 듣는 편입니까?
   ① 전혀 그렇지 않다
   ② 거의 그렇지 않다
   ③ 대체로 그렇다
   ④ 항상 그렇다
   ⑧ 비해당(문항1②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2③: 과거흡연자)

☐
8. 비해당

6. 흡연자의 금연을 돕기 위한 금연클리닉 또는 금연상담전화가 있다는 것을 알고 있습니까?
   ① 예　　　② 아니오 (➡ 7번 문항으로)

☐

6-1. 최근 1년 동안 금연클리닉 또는 금연상담전화를 이용해 본 적이 있습니까?
   ① 예　　　② 아니오
   ⑧ 비해당(문항1②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항6②: 금연클리닉이나 금연상담전화가 있다는 것을 모름)

☐
8. 비해당

※ 7-9번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

7. 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?
   ① 0시간
   ② 1시간 미만
   ③ 1시간 이상 ➡ ☐☐시간

☐ ☐☐시간
1 00. 0시간
2 00. 1시간미만

8. 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?
   ※ 농사 등 실외에서만 근무하는 경우 0시간에 해당
   ① 0시간
   ② 1시간 미만
   ③ 1시간 이상 ➡ ☐☐시간
   ④ 직장을 다니고 있지 않음(주부, 학생, 무직 등)

☐ ☐☐시간
1 00. 0시간
2 00. 1시간미만
4 88. 직장 안다님

9. 최근 1년 동안 공공장소(버스/택시 정거장, 길거리, 음식점, 유흥업소, PC방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있습니까?
   ① 예　　　② 아니오

☐

10. 최근 1년 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?
   ① 예　　　② 아니오

☐

11. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?
   ① 예　　　② 아니오

☐

12. 금연구역이 설정되어 있다는 것을 알고 있습니까?
   ① 설정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다
   ② 설정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다 (➡「음주」 1번 문항으로)
   ③ 설정된 것을 모른다 (➡「음주」 1번 문항으로)

☐

12-1. 금연구역 내에서 흡연한 적이 있습니까?

① 금연구역 내에서 항상 흡연한다
② 금연구역 내에서 가끔 흡연한다
③ 금연구역 내에서 흡연을 하지 않는다
⑧ 비해당(문항1-②: 평생 5갑(100개비) 이상 피우지 않았음, 문항2-③: 과거흡연자, 문항 12-①②: 금연구역 모름)

☐
8. 비해당

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡ 「안전의식」 1번 문항으로)

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?
만 □□□세 888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

□□□세
888. 비해당

1-2. 처음 술을 마신 이유(동기)는 무엇입니까?
① 주위 사람(가족, 친척, 친구, 동료, 선후배 등)이 권해서
② 호기심으로
③ 친목도모를 위해
④ 축하할 일이 있어서
⑤ 스트레스를 풀기위해
⑥ 광고, TV, 영화에 멋있게 보여서
⑦ 기타( )
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

□
8. 비해당

2. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡3번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

□
8. 비해당

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?
① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번 정도
③ 한 달에 2~4번 정도
④ 일주일에 2~3번 정도
⑤ 일주일에 4번 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

□
8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?
(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다)
① 1~2잔 ② 3~4잔 ③ 5~6잔 ④ 7~9잔 ⑤ 10잔 이상
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

□
8. 비해당

2-3. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2/②: 평생 또는 최근 1년간 술을 마셔본 적이 없음)

□
8. 비해당

3. <u>최근 1년 동안</u> 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

③ 비해당(문항1)③: 평생 술을 마셔본 적이 없음)

□
8. 비해당

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전을 합니까?
   ① 예　　② 아니오 (➡ 2번 문항으로)

□

1-1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?
① 전혀 매지 않는다
② 거의 매지 않는 편이다
③ 가끔 매는 편이다
④ 대체로 매는 편이다
⑤ 항상 맨다
⑧ 비해당(문항1②: 자동차 운전을 하지 않음)

□
8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?
① 예 ➡ □□□회　　② 아니오
⑧ 비해당(문항1②: 자동차 운전을 하지 않음)

□ □□□회
2 000. 아니오
8 888. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉습니까?
   ① 예　　② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

□

2-1. 앞좌석에 앉을 때 안전벨트를 맵니까?
① 전혀 매지 않는다
② 거의 매지 않는 편이다
③ 가끔 매는 편이다
④ 대체로 매는 편이다
⑤ 항상 맨다
⑧ 비해당(문항2②: 앞좌석에 앉지 않음)

□
8. 비해당

3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?
   ① 예 ➡ □□□회　　② 아니오

□ □□□회
2 000. 아니오.

【오토바이 운전】

4. 오토바이 운전을 합니까?
   ① 예　　② 아니오 (➡ 5번 문항으로)

□

4-1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

① 전혀 착용하지 않는다
② 거의 착용하지 않는 편이다
③ 가끔 착용하는 편이다
④ 대체로 착용하는 편이다
⑤ 항상 착용한다
⑧ 비해당(문항4/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

□
8. 비해당

4-2. <u>최근 1년 동안</u> 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

① 예 ➡ □□□회　　② 아니오
⑧ 비해당(문항4/②: 오토바이 운전을 하지 않음)

□ □□□회
2 000. 아니오
8 888. 비해당

【자전거 운전】

5. 자전거를 탑니까?

① 예　　② 아니오 (➡ 「운동 및 신체활동」 1번 문항으로)

□

5-1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

① 전혀 착용하지 않는다
② 거의 착용하지 않는 편이다
③ 가끔 착용하는 편이다
④ 대체로 착용하는 편이다
⑤ 항상 착용한다
⑧ 비해당(문항5/②: 자전거를 타지 않음)

□
8. 비해당

운동 및 신체활동

1. <u>최근 1주일 동안</u> 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까? □일 | □일

※ 격렬한(고강도) 신체활동
달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? | □□시 □□분 88 88. 비해당

하루에 □□시간 □□분 88 88. 비해당(문항1/0일: 격렬한 신체활동 없음)

2. <u>최근 1주일 동안</u> 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 <u>10분 이상</u> 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.) □일 | □일

※ 중등도(중강도) 신체활동
천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? | □□시 □□분 88 88. 비해당

하루에 □□시간 □□분 88 88. 비해당(문항2/0일: 중등도 신체활동 없음)

3. <u>최근 1주일 동안</u> 한 번에 적어도 <u>10분 이상</u> 걸었던 날은 며칠입니까? □일 | □일

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? | □□시 □□분 88 88. 비해당

하루에 □□시간 □□분 88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

4. <u>최근 1주일 동안</u> 스트레칭, 맨손체조 등의 유연성 운동을 한 날은 며칠입니까? | □
① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

5. <u>최근 1주일 동안</u> 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까? | □
① 전혀 하지 않음
② 1일
③ 2일
④ 3일
⑤ 4일
⑥ 5일 이상

6. <u>지난주 주중(월~금요일)</u> 여가시간에 TV 보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까?
   ① 하루 1시간 미만
   ② 하루 1시간~2시간 미만
   ③ 하루 2시간~3시간 미만
   ④ 하루 3시간~4시간 미만
   ⑤ 하루 4시간 이상

7. <u>지난주 주말(토~일요일)</u> 여가시간에 TV보기, 게임, 인터넷 등으로 앉아서 보낸 시간이 하루에 보통 몇 시간 정도입니까?
   ① 하루 1시간 미만
   ② 하루 1시간~2시간 미만
   ③ 하루 2시간~3시간 미만
   ④ 하루 3시간~4시간 미만
   ⑤ 하루 4시간 이상

영양

1. 최근 1주일 동안 아침식사를 한 날은 며칠입니까? □일

□일

2. 최근 1달 동안 과일(과일 주스 제외)을 얼마나 자주 먹었습니까? □
   ① 한 달 동안 과일을 먹지 않았다
   ② 하루에 1번 미만
   ③ 하루 1번
   ④ 하루 2번
   ⑤ 하루 3번 이상

3. 최근 1달 동안 생으로 먹는 채소(쌈, 샐러드, 생채소 무침)를 얼마나 자주 먹었습니까? □
   ① 한 달 동안 생으로 먹는 채소를 먹지 않았다.
   ② 하루에 1번 미만
   ③ 하루 1번
   ④ 하루 2번
   ⑤ 하루 3번 이상

4. 평상시 음식을 먹을 때, 다음 중 본인은 어디에 해당합니까? □
   ① 아주 짜게 먹는다
   ② 약간 짜게 먹는다
   ③ 보통으로 먹는다
   ④ 약간 싱겁게 먹는다
   ⑤ 아주 싱겁게 먹는다

5. 식탁이나 상에 차려진 음식을 먹을 때, 소금이나 간장을 더 넣어 먹습니까? □
   ① 항상 더 넣는다
   ② 자주 더 넣는다
   ③ 거의 더 넣지 않는다
   ④ 전혀 더 넣지 않는다

6. 전, 부침, 튀김을 먹을 때, 간장에 찍어 먹습니까? □
   ① 항상 찍어 먹는다
   ② 가끔 찍어 먹는다
   ③ 찍어 먹지 않는다

7. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까? □
   ① 항상 읽는다
   ② 가끔 읽는다
   ③ 읽지 않는다
   ④ 영양표시가 무엇인지 모른다
   ⑤ 가공식품을 먹지 않는다

8. <u>최근 1년 동안</u> 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오

9. 다음 중 <u>최근 1년 동안</u> 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

비만 및 체중조절

1. **현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?**
   ① 매우 마른 편임
   ② 약간 마른 편임
   ③ 보통임
   ④ 약간 비만임
   ⑤ 매우 비만임

□

2. **최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?**
   ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
   ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
   ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
   ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

□

3. **현재 본인의 키는 얼마입니까?**
   □□□.□cm

□□□.□cm

4. **현재 본인의 몸무게는 얼마입니까?**
   □□□.□kg

□□□.□kg

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?

① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

3. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 명확히 발음을 하는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

① 매우 불편하다
② 불편하다
③ 그저 그렇다
④ 별로 불편하지 않다
⑤ 전혀 불편하지 않다

4. 위쪽 치아 혹은 아래쪽 치아 모두가 빠진 상태입니까?

① 위아래 치아 모두가 빠졌다
② 위쪽 치아만 모두 빠졌다
③ 아래쪽 치아만 모두 빠졌다
④ 아니오

5. 현재 끼었다 뺐다 할 수 있는 틀니를 하고 있습니까?

① 위아래 둘 다 있음 — (➡ 6번 문항으로)
② 위쪽만 있음
③ 아래쪽만 있음
④ 아니오
(②~④ ➡ 5-1번 문항으로)

5-1. 현재 틀니가 필요하다고 생각합니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항5(①): 위아래 둘 다 있음)

8. 비해당

6. <u>어제 하루 동안 점심 식사 후</u> 칫솔질(잇솔질)을 했습니까?

① 예 ② 아니오 ③ 식사하지 않음

7. 치약과 칫솔이외에 치아의 건강을 위해 평소에 치실(floss) 혹은 치간솔을 사용합니까?

① 예 ② 아니오

8. 치과가 아닌 곳에서 무자격자에 의한 치과시술(야매)을 받아 본 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

9. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡ 10번 문항으로)

9-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?(한 가지만 선택)
① 경제적인 이유로
② 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
③ 직장이나 학교를 비울 수 없어서
④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
⑤ 아이를 봐줄 사람이 없어서
⑥ 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
⑦ 치과진료를 받기가 무서워서
⑧ 기타( )
88. 비해당(문항9(②: 진료를 받지 못한 적이 없음)

88. 비해당

10. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?
※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함
① 예 ② 아니오

11. 최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

12. 치주조직(잇몸)의 건강은 어느 정도라고 생각합니까?
① 이가 흔들린다
② 잇몸이 자주 붓는다
③ 치석이 많다
④ 잇몸에서 피가 난다
⑤ 정상이다

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까? □□시간

□□시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다 (➡ 2-1번 문항으로)
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다 (➡ 3번 문항으로)

□

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오
⑧ 비해당(문항2/③④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

□
8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

□

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오
⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적이 없음)

□
8. 비해당

4. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오 (➡ 5번 문항으로)

□

4-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오
⑧ 비해당(문항4/②: 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

□
8. 비해당

5. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오 (➡ 6번 문항으로)

□

5-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?

① 예　　　② 아니오
⑧ 비해당(문항5/②: 자살 시도를 해 본 적이 없음)

□
8. 비해당

6. <u>최근 1년 동안</u> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용으로 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

① 전혀 없다
② 한 달에 1번 미만
③ 한 달에 1번 정도
④ 일주일에 1번 정도
⑤ 거의 매일
⑥ 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음 (➡ 「예방접종」 1번 문항으로)

7. 주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 지적을 받는 편입니까?

8. 비해당

① 전혀 그렇지 않다
② 거의 그렇지 않다
③ 대체로 그렇다
④ 항상 그렇다
⑤ 비해당(문항6-⑥: 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음)

예방접종

1. <u>최근 1년 동안</u> 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?
   ① 예　　　　② 아니오

□

이환

1. <u>최근 2주 동안</u> 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?
   ① 예 ➡ □□일　　　　② 아니오

□ □□일
2 00. 아니오

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 걸리는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. <u>최근 1년 동안</u> 혈압을 몇 번이나 잿습니까?
   ① 하루에
   ② 일주일에
   ③ 한 달에
   ④ 일 년에
   ➡ □□□회
   ⑤ 전혀 안함

□ □□□회
5 000. 전혀 안함

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?
   ① 예　　　　② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

□

2-1. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까?
   ① 예　　　　② 아니오
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

□
8. 비해당

2-2 현재 치료를 받고 있습니까?
   ① 예　　　　② 아니오 (➡ 2-3번 문항으로)
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

□
8. 비해당

2-2-1. 혈압을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

혈압약 복용	① 예 ➡ 한 달에 □□일　② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예　② 아니오

8 88 8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항2-2/②: 현재 치료를 받지 않음)

□한달에□□일
2 00. 아니오
8 88. 비해당
□ 8. 비해당

2-3. **고혈압을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외)**

병의원	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
한방병의원	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당

888 비해당(문항2-②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-4. **<u>최근 1년 동안</u> 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?**

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2-②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

2-5. **<u>최근 1년 동안</u> 고혈압으로 인한 심장질환 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있습니까?**

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2-②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

2-6. **<u>최근 1년 동안</u> 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있습니까?**

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2-②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

☐ 8. 비해당

3. **본인의 혈압수치를 알고 있습니까?**

① 예 ② 아니오

☐

【당뇨병】

1. **<u>최근 1년 동안</u> 혈당을 몇 번이나 쟀습니까?**

① 하루에
② 일주일에
③ 한 달에
④ 일 년에
→ ☐☐☐회

⑤ 전혀 안함

☐ ☐☐☐회
5 000. 전혀 안함

2. **의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?**

① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

☐

2013 지역사회건강조사 19

2-1. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2(②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-2. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 2-3번 문항으로)

⑧ 비해당(문항2(②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-2-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? <u>모두</u> 응답해 주십시오.

인슐린 주사	① 예 ② 아니오	8. 비해당
당뇨병약(경구 혈당강하제)	① 예 ② 아니오	8. 비해당
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예 ② 아니오	8. 비해당

888. 비해당(문항2(②: 의사에게 진단받은 적이 없음,
문항2-2(②: 현재 치료를 받고 있지 않음)

2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오	8. 비해당
한방병의원	① 예 ② 아니오	8. 비해당
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오	8. 비해당

888. 비해당(문항2(②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

2-4. <u>최근 1년 동안</u> 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2(②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

2-5. <u>최근 1년 동안</u> 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2(②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

3. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

① 예 ② 아니오

【이상지질혈증(고지혈증 포함)】

1. 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 2번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예　　　　② 아니오(➡ 2번 문항으로)

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

□ 8. 비해당

1-1-1. 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

이상지질혈증 약 복용	① 예 ➡ 한 달에 □□일 ② 아니오
비약물요법(운동, 식사요법)	① 예　② 아니오

8 88 8. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음, 문항1-1/②: 현재 치료를 받고 있지 않음)

□ 한 달에 □□ 일
2 00. 아니오
8 88. 비해당
□ 8. 비해당

2. 본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있습니까?

① 예　　　　② 아니오

□

【뇌졸중(중풍)】

1. 의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 적이 있습니까?

① 예　　　　② 아니오 (➡ 「심근경색증」 1번 문항으로)

□

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예　　　　② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

□ 8. 비해당

【심근경색증】

1. 의사에게 심근경색증을 진단받은 적이 있습니까?

① 예　　　　② 아니오 (➡ 「협심증」 1번 문항으로)

□

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예　　　　② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

□ 8. 비해당

【협심증】

1. 의사에게 협심증을 진단받은 적이 있습니까?

① 예　　　　② 아니오 (➡ 「심뇌혈관질환 예방관리」 1번 문항으로)

□

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예　　　　② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

□ 8. 비해당

【심뇌혈관질환 예방관리】

1. 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 2번 문항으로)

1-1. 심뇌혈관질환에 대한 내용을 어떤 경로를 통해 보거나 들어 보았습니까? 모두 응답해 주십시오.

인터넷	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
병의원	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소)	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당

8888. 비해당(문항1/②: 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

2. '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 본 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 「관절염」 1번 문항으로)

2-1. '심뇌혈관질환 예방과 관리를 위한 9대 생활수칙'에 관한 홍보물(소책자, 동영상, 홍보물품)을 어떤 경로를 통해 보았습니까? 모두 응답해 주십시오.

인터넷	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
TV, 라디오, 옥외광고, 지하철 등	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
병의원	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소)	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당

8888. 비해당(문항1/②: 심뇌혈관질환에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 없음)

【관절염】

1. 의사에게 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 「골다공증」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

1-2. 관절염(골관절염 또는 류마티스성 관절염)을 관리하는 방법에 대해, 다음의 기관에서 교육을 받은 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외).

병의원	① 예 ② 아니오	8. 비해당
한방병의원	① 예 ② 아니오	8. 비해당
보건소(보건지소, 진료소, 의료원)	① 예 ② 아니오	8. 비해당

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【골다공증】

1. 의사에게 골다공증을 진단받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡ 「천식」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)
8. 비해당

1-2. 의사에게 다음의 부위가 골절되었다고 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

엉덩이뼈	① 예 ② 아니오	8. 비해당
척추	① 예 ② 아니오	8. 비해당
손목뼈	① 예 ② 아니오	8. 비해당

888. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

【천식】

1. 최근 1년 동안 숨 쉴 때, 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

2. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨 쉴 때, 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

3. 의사에게 천식을 진단받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡ 「알레르기비염」 1번 문항으로)

3-1. 현재 치료를 받고 있습니까?
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)
8. 비해당

3-2. <u>최근 1년 동안</u> 천식의 증상이 악화되었습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

3-3. <u>최근 1년 동안</u> 천식증상으로 급작스럽게 응급실 또는 병의원에 간 적이 있습니까?

① 예, 응급실에 간 적이 있다

② 예, 병의원에 간 적이 있다

③ 아니오

⑧ 비해당(문항3/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【알레르기비염】

1. 의사에게 알레르기비염을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 「아토피피부염」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【아토피피부염】

1. 의사에게 아토피피부염을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 「백내장」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【백내장】

1. 의사에게 백내장을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 「B형 간염」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【B형 간염】

1. 의사에게 B형 간염을 진단받은 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 「우울증」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【우울증】

1. 의사에게 우울증을 진단받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡ 「대사증후군」 1번 문항으로)

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적이 없음)

8. 비해당

【대사증후군】

1. 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

【에이즈(AIDS)】

1. 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

※ 다음의 질문들은 귀하의 에이즈에 대한 지식을 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각되시면 "예", 아니라고 생각되시면 "아니오", 혹은 잘 모르겠다고 생각되시면 "모르겠다"를 선택해 주십시오.

2-1. 콘돔으로 에이즈를 예방할 수 있다.
① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

2-2. 에이즈에 걸린 사람도 건강해 보일 수 있다.
① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

2-3. 모기로도 에이즈에 감염될 수 있다.
① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

2-4. 에이즈에 감염된 사람과 함께 식사를 하면 에이즈에 감염될 수 있다.
① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

※ 다음의 질문들은 귀하의 에이즈에 대한 태도를 알아보기 위한 것입니다. 맞다고 생각되시면 "예", 아니라고 생각되시면 "아니오", 혹은 잘 모르겠다고 생각되시면 "모르겠다"를 선택해 주십시오.

3-1. 가족 중 에이즈 감염인이 생긴다면 집에서 돌보겠다.

① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

3-2. 에이즈 감염인이 일하는 가게에서도 채소나 과일을 사겠다.

① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

3-3. 자녀가 에이즈 감염인과 같은 학교에 다니도록 허용하겠다.

① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

3-4. 가족 중 에이즈 감염인이 있다면 가족 이외의 사람에게는 비밀로 하겠다.

① 예
② 아니오
③ 모르겠다
⑧ 비해당(문항1/②: 에이즈에 대한 내용을 보거나 들어 본 적이 없음)

8. 비해당

의료이용

1. <u>최근 1년 동안</u> 본인이 병의원(치과 미포함)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ☐

① 예 ② 아니오 (➡ 「사고 및 중독(낙상)」 1번 문항으로)

1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까? (한 가지만 선택) ☐ 8. 비해당

① 경제적인 이유로
② 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
③ 교통편이 불편해서
④ 내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서
⑤ 병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 증상이 가벼워서
⑦ 기타(   )
⑧ 비해당(문항1/②: 병의원에 가지 못한 적이 없음)

사고 및 중독(낙상)

1. 최근 1년 동안 넘어진 적이 있습니까?
   ※ 미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음, 떨어짐 포함

   ① 예 ➡ □회 ② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

□ 회
2 0. 아니오

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 낙상에 대해 2~3번 문항을 반복합니다.

낙상 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회
□□	□□	□□	□□	□□
□ 기타	□ 기타	□ 기타	□ 기타	□ 기타

2. 넘어진 장소는 어디입니까?

집안	① 화장실/욕조
	② 방
	③ 부엌
	④ 거실/마루
	⑤ 계단
	⑥ 기타 집안 지역(장소)
집밖	⑦ 농어업시설
	⑧ 운송지역
	⑨ 스포츠 또는 운동장소
	⑩ 상업 또는 서비스 시설
	⑪ 기타 집밖 지역(장소)

3. 넘어진 이유는 무엇이었습니까?
   ① 바닥이 미끄러워서
   ② 사람이나 사물에 부딪혀서
   ③ 보도나 문의 턱에 걸려
   ④ 경사가 급해서
   ⑤ 조명이 어두워서
   ⑥ 다리를 접질려서(발을 헛디뎌서)
   ⑦ 갑자기 어지러워서(갑자기 주저앉아서)
   ⑧ 기타( )

4. 평소 넘어지는 것에 대한 두려움을 느낍니까?
   ① 전혀 두려워하지 않는다
   ② 약간 두려워 한다
   ③ 많이 두려워 한다

□

5. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외

   ① 예 ➡ □회 ② 아니오

□□회
2 0. 아니오

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '1'로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까? □

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

매우 불만족 　　　　　　　　　　　　 매우 만족

※ 지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다. 질문을 잘 듣고 응답해 주십시오.

2. <u>최근 1달 동안</u> 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 적이 있습니까? □ □□일

① 예 ➡ □□일 　　　 ② 아니오

2 00. 아니오

3. <u>최근 1달 동안</u> 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 했던 적이 있습니까? □ □□일
※ 농사/장사를 못나간 경우 결근에 해당

① 예 ➡ □□일 　　　 ② 아니오 　　　 ③ 학교 또는 직장을 다니고 있지 않음

2 00. 아니오
3 88. 학교, 직장 안 다님

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력 □
① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

4-2. 자기관리 □
① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

4-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동) □
① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

4-4. 통증/불편 □
① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

4-5. 불안/우울 □
① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 표현하는 것을 돕고자, 당신이 상상할 수 있는 최고의 상태를 100으로, 당신이 상상할 수 있는 최저의 상태를 0으로 표시한 눈금자(온도계와 비슷함)를 그려 놓았습니다.

당신의 생각에 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를, 아래의 상자로부터, 오늘 당신의 건강상태가 얼마나 좋고 나쁜지를 나타낸 눈금자위의 한곳으로 선을 그어서 표시해 주십시오.

오늘 당신의 건강상태

상상할 수 있는 최고의 건강상태



상상할 수 있는 최저의 건강상태

	백	십	일
점수			

보건기관 이용

1. 최근 1년 동안 주로 이용한 보건기관은 어디입니까?

① 이용한 적 없다 — (➡ 1-4번 문항으로)
② 보건소(보건의료원 포함)
③ 보건지소
④ 보건진료소
(② ~ ④ ➡ 1-1번 문항으로)

1-1. 보건기관을 이용한 주된 이유는 무엇입니까?

① 거리가 가까워서
② 비용이 저렴해서
③ 신뢰할 수 있어서
④ 시설이 좋아서
⑤ 직원이 친절해서
⑥ 다른 곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공하기 때문에(만성질환자등록관리 등)
⑦ 기타( )
⑧ 비해당(문항1.①: 보건기관 이용한 적이 없음)

기타

8. 비해당

1-2. 보건기관을 이용하였다면, 어떤 서비스에 참여했습니까? 모두 응답해 주십시오.

예방접종	① 예	② 아니오	8. 비해당
건강교실(금연, 절주, 운동, 영양)	① 예	② 아니오	8. 비해당
건강검진	① 예	② 아니오	8. 비해당
방문보건서비스	① 예	② 아니오	8. 비해당
영양보충서비스	① 예	② 아니오	8. 비해당
정신보건서비스	① 예	② 아니오	8. 비해당
모자보건서비스	① 예	② 아니오	8. 비해당
구강보건서비스	① 예	② 아니오	8. 비해당
진료서비스	① 예	② 아니오	8. 비해당
민원서비스(서류, 증명서발급)	① 예	② 아니오	8. 비해당
기타	① 예	② 아니오	8. 비해당

88888888888. 비해당(문항1.①: 보건기관 이용한 적이 없음)

1-3. 보건기관의 서비스 전반에 대해 어느 정도 만족했습니까?

① 대단히 만족한다
② 만족한 편이다
③ 보통이다
④ 불만족한 편이다
⑤ 대단히 불만족한다
(➡ 2번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1.①: 보건기관 이용한 적이 없음)

8. 비해당

1-4. **보건기관을 이용하지 않은 주된 이유는 무엇입니까?**
① 위치를 잘 몰라서
② 거리가 멀고 교통이 불편해서
③ 원하는 서비스가 제공되지 않아서
④ 제공되는 서비스의 질이 높지 않다고 생각하기 때문에
⑤ 저소득층이나 특수계층만이 이용한다고 생각하기 때문에
⑥ 제공되는 서비스가 어떤 것들이 있는지 몰라서
⑦ 주로 이용하는 병원이 있어서
⑧ 건강해서
⑨ 기타( )
88. 비해당(문항1-③참①: 보건기관 이용한 적이 있음)

기타

88. 비해당

2. 보건기관(보건소(보건의료원), 보건지소, 진료소)에서 다음 질병의 예방 및 관리를 위한 홍보(교육 포함)를 보거나 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

고혈압	① 예 ② 아니오
당뇨병	① 예 ② 아니오
관절염	① 예 ② 아니오
아토피·천식	① 예 ② 아니오
치매	① 예 ② 아니오

사회 물리적 환경

1. 다음 문항에 대한 생각은 어떻습니까? 모두 응답해 주십시오.

우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다	① 예 ② 아니오
이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다	① 예 ② 아니오
우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병의원, 한방병의원, 약국 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오

2. 가장 많이 접촉하는 친척(가족포함)과 얼마나 자주보거나 연락합니까?
   ① 한 달에 1번 미만
   ② 한 달에 1번
   ③ 한 달에 2~3번
   ④ 일주일에 1번
   ⑤ 일주일에 2~3번
   ⑥ 일주일에 4번 이상

3. 가장 많이 접촉하는 이웃과 얼마나 자주보거나 연락합니까?
   ① 한 달에 1번 미만
   ② 한 달에 1번
   ③ 한 달에 2~3번
   ④ 일주일에 1번
   ⑤ 일주일에 2~3번
   ⑥ 일주일에 4번 이상

4. 가장 많이 접촉하는 친구(이웃제외)와 얼마나 자주보거나 연락합니까?
   ① 한 달에 1번 미만
   ② 한 달에 1번
   ③ 한 달에 2~3번
   ④ 일주일에 1번
   ⑤ 일주일에 2~3번
   ⑥ 일주일에 4번 이상

5. **다음 활동에 한 달에 한 번(1회) 이상 정기적으로 참여합니까?**

종교활동	① 예 ② 아니오	□
친목활동(계모임, 동창회, 노인정, 향우회, 종친회 등)	① 예 ② 아니오	□
여가/레저 활동	① 예 ② 아니오	□
자선단체 활동	① 예 ② 아니오	□

손 씻기

1. 손 씻기가 감염병(전염병) 예방에 어느 정도 도움이 된다고 생각합니까?
① 매우 도움이 된다
② 도움이 된다
③ 도움이 되지 않는다
④ 전혀 도움이 되지 않는다

2. 최근 1주일 동안 식사하기 전 얼마나 자주 손을 씻었습니까?
① 항상 씻었다
② 자주 씻었다
③ 가끔 씻었다
④ 거의 씻지 않았다

3. 최근 1주일 동안 화장실 다녀온 후 얼마나 자주 손을 씻었습니까?
① 항상 씻었다
② 자주 씻었다
③ 가끔 씻었다
④ 거의 씻지 않았다

4. 최근 1주일 동안 외출 후 집에 들어왔을 때 얼마나 자주 손을 씻었습니까?
① 항상 씻었다
② 자주 씻었다
③ 가끔 씻었다
④ 거의 씻지 않았다

5. 평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 얼마나 자주 사용합니까?
① 항상 사용한다
② 자주 사용한다
③ 가끔 사용한다
④ 거의 사용하지 않는다
⑤ 전혀 사용하지 않는다

6. 최근 1년 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있습니까?
① 예 ② 아니오

교육 및 경제활동

1. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

① 예 ② 아니오

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해주십시오. (예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배, 내과질환진료 및 치료 등)

일의 종류	

일의 종류

직업분류		
	① 관리자	② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자	④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자	⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자	⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자	⑩ 군인(직업군인)
	⑪ 학생/재수생 ⑫ 주부	⑬ 무직

2-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까? (※ 문항 2번 보기문항 ①~⑩에 응답하신 분만 응답해 주십시오.)

① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
⑧ 비해당(문항2/⑪, ⑫, ⑬: 학생/재수생, 주부, 무직)

8. 비해당

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학 (➡ 4번 문항으로) ② 서당/한학(➡ 4번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

3-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

① 졸업 ② 수료 ③ 중퇴 ④ 재학/휴학 중
⑧ 비해당(문항3/①, ②: 무학, 서당/한학)

8. 비해당

4. 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고·보장보험 등의 의료비를 보조해주는 민간 의료보험에 가입했습니까?

① 예 ② 아니오

5. 귀하께서는 결혼한 적(사실혼 포함)이 있습니까?

① 예 ② 아니오 (➡ 6번 문항으로)

5-1. 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까?

① 배우자가 있으며, 함께 살고 있음
② 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음(출장 등의 일시적 상태 제외)

8. 비해당

③ 배우자 사망으로 배우자가 없음
④ 이혼으로 배우자가 없음
⑤ 비해당(문항5-①: 결혼한 적이 없음)

6. 현재 살고 있는 광역 시·도에서 얼마나 오래 살았습니까?

① 5년 미만
② 5-10년 미만
③ 10-15년 미만
④ 15-20년 미만
⑤ 20년 이상

7. 현재 살고 있는 시·군·구에서 얼마나 오래 살았습니까?

① 5년 미만
② 5-10년 미만
③ 10-15년 미만
④ 15-20년 미만
⑤ 20년 이상

최 종 점 검 자			
입 력 완 료 일			
재 조 사 일			
재조사 완료일			

설문에 응해주셔서 감사합니다.

답례품 수령 확인

설문을 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2013년　　월　　일

성명 ______________ (서명 또는 날인)

※ 개인조사는 마쳤습니다. 가구대표 1명이 가구조사에 참여하여 주십시오.

제4부 » 부록

Ⅲ. 가구조사표

CHS

다음은 2013년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. ➔

2013년 지역사회건강조사 가구명부

	시도	보건소	표본지점	가구	
번호 :					

가구현황

			총 방문횟수	(____)회
주소	(표본가구 주소)		방문일 1차	2013. . .
	(이하 상세주소)	집전화 ☎( ) −	방문일 2차	2013. . .
			방문일 3차	2013. . .

가구구분	□ 본표본가구 □ 예비표본가구(본표본가구 번호:__________)	가구대체 발생시 본표본 가구번호를 기입합니다
성인거주여부	□ 성인거주 □ 성인미거주 □ 모름	성인기준: 주민등록상 생일로 1994.7.31 이전 출생자
조사적합여부	□ 적합 ➡ 가구원정보 기입 □ 부적합 ➡ 조사종료 & 가구대체 (사유:______________________________)	

가구원현황

'가구조사' 기입란은 가구조사를 할 대표 가구원 1인만 표시합니다.

가구원 번호	가구원 성명	성별	주민등록상 생년월일	가구주와의 관계	휴대전화	조사수행 여부	미수행 사유	가구 조사
01		남 / 여			− −	Y / N		□
02		남 / 여			− −	Y / N		□
03		남 / 여			− −	Y / N		□
04		남 / 여			− −	Y / N		□
05		남 / 여			− −	Y / N		□
06		남 / 여			− −	Y / N		□
07		남 / 여			− −	Y / N		□
08		남 / 여			− −	Y / N		□
09		남 / 여			− −	Y / N		□
10		남 / 여			− −	Y / N		□
11		남 / 여			− −	Y / N		□
12		남 / 여			− −	Y / N		□

조사원 성명:________________

가구완료

조사인원 : 만 19세 이상 성인 (   )명 중 (   )명 조사

조사완료 : 만 19세 이상 성인을 모두 조사하였습니까? □예 □아니오

가구조사 : 가구 대표1명만 가구조사를 실시하였습니까? □예 □아니오

답례품전달 : 조사인원 수만큼 답례품을 제공하였습니까? □예 □아니오

가구선정통지문 : 이 가구는 가구선정통지문을 받았습니까? □예 □아니오

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1세대	□ 1. 1인 가구	□ 2. 응답자+미혼형제자매	□ 7. 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
	□ 3. 부부(응답자+배우자)	□ 4. 부부+기타 친인척	
	□ 5. 부부+미혼형제자매	□ 6. 응답자+기타 친인척	
2세대	□ 8. 부부+미혼자녀	□ 9. 부부+양친	□ 10. 조부모 부부+미혼 손자녀
	□ 11. 편부+미혼자녀	□ 12. 부부+편부모	□ 13. 편조부/편조모+미혼 손자녀
	□ 14. 편모+미혼자녀	□ 15. 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매	□ 16. 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	□ 17. 부부+미혼자녀+양친		
	□ 18. 부부+미혼자녀+편부모		
	□ 19. 기타 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구		

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 지금 살고 있는 집은 다음 중 어떤 형태에 해당합니까?

① 단독주택
② 아파트
③ 연립주택
④ 다세대 주택
⑤ 영업용 건물 내 주택
⑥ 기타(　　　　　　　)

기타

4. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간)　(소득액)
① 연
② 월　□□□□□ 만원

(연/월)
만원

5. 귀 가구는 현재 치매환자와 함께 거주하고 있습니까?

① 예　② 아니오

제4부 >> 부록

Ⅳ. 2010-2013 순환조사지표

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
흡연	흡연시작연령	○	○	○	○	'08년 지표명: 처음 흡연경험연령
	현재 흡연율	○	○	○	○	
	남자 현재흡연율	○	○	○	○	
	매일 흡연자의 하루 평균 흡연량	○	○	○	○	
	흡연자의 1개월 내 금연 계획률	○	○	○	○	
	흡연자의 금연 시도율	○	○	○	○	
	흡연자의 금연이유	○	-	○	-	
	흡연자의 금연방법	○	-	○	-	
	가정실내 간접흡연 노출률	○	○	-	○	'08년 지표명: 가정 내 간접흡연 노출률
	가정실내 간접흡연 노출시간	○	○	-	○	
	직장실내 간접흡연 노출률	○	○	-	○	
	직장실내 간접흡연 노출시간	○	○	-	○	
	금연캠페인 경험률	○	○	○	○	
	금연교육 경험률	○	○	○	○	
	현재흡연자의 금연교육 경험률	○	○	○	○	
	금연구역 내 흡연 경험률	-	○	-	○	
	금연구역 인지율	-	○	-	○	
	공공장소 간접흡연 노출률	-	○	-	○	
	현재 흡연자의 금연권고 경험률	-	-	-	○	
	금연클리닉, 금연상담전화 인지율	-	-	-	○	
	현재 흡연자의 금연클리닉, 금연상담전화 이용율	-	-	-	○	
음주	평생 음주율	○	○	○	○	
	음주시작연령	○	○	○	○	'08년 지표명: 처음 음주경험연령
	연간 음주율	○	○	○	○	
	월간 음주율	○	○	○	○	
	고위험 음주율	○	○	○	○	
	알코올 의존정도(AUDIT)	○	-	○	-	
	고위험 음주행동 분포	-	-	-	-	
	음주문제로 인한 상담 경험률	○	○	○	○	
	음주시작동기	-	-	-	○	
	연간 음주자의 금주권고 경험률	-	-	-	○	

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
안전의식	운전 시 안전벨트 착용률	○	○	○	○	
	동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	○	○	○	○	
	연간 음주운전 경험률 (자동차 또는 오토바이)	○	○	○	○	'08년 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차, 오토바이)
	연간 자동차 음주운전 경험횟수	○	○	○	○	
	연간 자동차 음주운전차량 동승률	○	○	○	○	
	오토바이 헬멧 착용률	○	○	-	○	'09년 지표명: 오토바이 보호장구(헬멧 등) 착용률
	연간 오토바이 음주운전 경험횟수	○	○	-	-	
	자전거 헬멧 착용률	○	○	-	○	'09년 지표명: 자전거 보호 장구(헬멧, 무릎보호대) 착용률
	스쿨존 인지율	-	○	-	-	
	스쿨존 과속운전 경험률	-	○	-	-	
	'1339' 전화번호 인지율	-	○	-	-	
운동 및 신체활동	격렬한 신체활동 실천율	○	○	○	○	
	중등도 신체활동 실천율	○	○	○	○	
	중등도 이상 신체활동 실천율	○	○	○	○	
	걷기 실천율	○	○	○	○	'08년 지표명: 걷기운동 실천율
	지역사회 내 운동시설 접근율	○	-	○	-	'08년 지표명: 지역사회 내 운동시설 접근성
	지역사회 내 운동프로그램 참여율	○	-	○	-	
	주중 (월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	○	-	○	
	주말 (토~일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간	-	○	-	○	
	근력운동 실천율	-	○	-	○	
	유연성운동 실천 빈도	-	○	-	○	
식생활	아침식사 섭취빈도	○	○	○	○	
	아침결식예방 인구비율	○	○	○	○	
	저염 선호율	○	○	○	○	
	가공식품 선택 시 영양표시 이용률	○	○	○	○	
	영양교육 및 상담 수혜율	○	○	○	○	
	식품 안정성 확보율	○	○	○	○	
	식생활 지침 인지율	○	-	○	-	
	식생활 실천지침 점수	○	-	-	-	
	과일 섭취율	-	○	-	○	
	생채소 섭취율	-	○	-	○	

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
비만 및 체중조절	비만율	○	○	○	○	'08년 지표명: 비만인구율
	평균 BMI(체질량지수)	○	○	○	○	
	주관적 비만인지율	○	○	○	○	
	체중조절 시도율	○	○	○	○	
	체중조절 시도방법	○	-	○	-	
구강건강	주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	○	○	○	○	
	저작불편 호소율(65세 이상)	○	○	○	○	
	발음불편 호소율(65세 이상)	○	○	○	○	
	틀니 이용 행태(65세 이상)	○	○	○	○	
	점심식사 후 칫솔질 실천율	○	○	○	○	
	구강검진 수진율	○	○	○	○	
	연간 스케일링 경험률	○	○	○	○	
	치아 결손 형태(65세 이상)	-	○	-	○	'08년 지표명: 치아결손형태
	치실 및 치간솔 이용률	-	○	-	○	
	무자격자 치과시술률	-	○	-	○	
	치과진료 미치료율	-	○	○	○	
	치과진료 미치료 이유	-	○	○	○	
	주관적 틀니 필요 인지율(65세 이상)	-	○	-	○	
	주관적 잇몸 건강인지율	-	○	-	○	
정신건강	하루 평균 수면시간	○	○	○	○	
	스트레스 인지율	○	○	○	○	'08년 지표명: 주관적 스트레스 인지율
	주관적 스트레스 인지정도	-	-	-	-	
	스트레스로 인한 정신 상담률	○	○	○	○	
	우울감 경험률	○	○	○	○	
	우울증상으로 인한 정신상담률	○	○	○	○	
	자살생각률	-	-	-	○	
	자살생각으로 인한 정신상담률	-	-	-	○	
	자살시도율	-	-	-	○	
	자살시도로 인한 정신상담률	-	-	-	○	
	인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 일상생활 지장 경험 빈도	-	-	-	○	
	인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률	-	-	-	○	

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
건강검진 및 예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	○	○	○	○	
	건강검진 수진율	○	-	○	-	
	건강검진 사후 관리 상담률	○	-	○	-	
	건강검진 미수진 이유	○	-	○	-	
	암 검진율	○	-	○	-	
	최근 2년간 수검 암 검진 종류(남/여)	○	-	○	-	종류: 암종별
	암 검진 사후관리 상담률	○	-	○	-	
	암 검진 미수진 이유	○	-	○	-	
	신종 인플루엔자 예방접종률	○	-	-	-	
이환	만성·급성질환 및 사고중독 경험률	○	○	○	○	'08-'10년 영역: 활동제한 삶의 질
	만성·급성질환 및 사고중독 경험일수	○	○	○	○	
고혈압	연간 평균 혈압 측정횟수	○	○	○	○	
	고혈압 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 고혈압 평생 의사진단 유병률
	본인 인지 혈압조절률	○	○	○	○	
	고혈압 현재치료율	○	○	○	○	
	고혈압 약물치료율	○	○	○	○	'08년 지표명: 혈압조절약의 정기적 복용률
	고혈압 관리교육 이수율	○	○	○	○	
	고혈압 관리교육 장소	○	○	○	○	
	고혈압 의료기관 방문횟수	-	-	○		
	혈압 인지율	-	○	-	○	
	고혈압 신장질환 합병증검사 수진율	-	○	-	○	
	고혈압 심장질환 합병증검사 수진율	-	○	-	○	
	고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율	-	○	-	○	
당뇨병	연간 평균 혈당 측정횟수	○	○	○	○	
	당뇨병 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 평생 의사진단 유병률
	본인 인지 혈당조절율	○	○	○	○	
	당뇨병 현재치료율	○	○	○	○	
	당뇨병 치료율	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 관리형태(혈당관리방법)
	당뇨병 관리교육 이수율	○	○	○	○	
	당뇨병 관리교육 장소	○	○	○	○	
	당뇨병 의료기관 방문횟수	-	-	○	-	
	당화혈색소 인지율	-	-	○	-	
	당화혈색소 검사 횟수	-	-	○	-	
	당뇨병 안질환 합병증검사 수진율	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율
	당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	○	○	○	○	'08년 지표명: 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율
	혈당 인지율	-	○	-	○	

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
이상 지질혈증	이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 고지혈증 평생 의사진단 유병률 '09-'10년 지표명: 고지혈증 평생의사진단 경험률
	총 콜레스테롤 인지율	-	○	-	○	
뇌졸중	뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 유병률
심근경색증	심근경색증 평생 의사진단 경험률(≥40)	○	○	○	○	'08년 지표명: 심근경색증 평생 의사진단 유병률
협심증	협심증 평생 의사진단 경험률(≥40)	○	○	○	○	'08년 지표명: 협심증 평생 의사진단 유병률
관절염	관절염 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 골관절염 평생 의사진단 유병률
	관절염 현재치료율(≥50)	○	○	○	○	
	관절염 관리교육 이수율(≥50)	○	○	○	○	
	관절염 관리교육 장소(≥50)	○	○	○	○	
골다공증	골다공증 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 골다공증 평생 의사진단 유병률
폐결핵	폐결핵 평생 의사진단 경험률	○	○	○	-	'08년 지표명: 폐결핵 평생 의사진단 유병률
천식	천식 증상 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 천식 평생 의사진단 유병률
	운동성 천식이환율	○	○	○	○	
	천식 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	
알레르기 비염	알레르기비염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 알레르기성 비염 평생 의사진단 유병률
아토피 피부염	아토피피부염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 아토피피부염 평생 의사진단 유병률
백내장	백내장 평생 의사진단 경험률(≥50)	○	○	○	○	'08년 지표명: 백내장 평생 의사진단 유병률
녹내장	녹내장 평생 의사진단 경험률(≥50)	-	○	-	-	'08년 지표명: 녹내장 평생 의사진단 유병률
B형 간염	B형 간염 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: B형 간염 평생 의사진단 유병률
C형 간염	C형 간염 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
빈혈	빈혈 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
중이염	중이염 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
위십이지장 궤양	위십이지장궤양 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
치질	치질 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
암	암 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
요실금	요실금 평생 의사진단 경험률	-	○	○	-	'08년 지표명: 요실금 평생 의사진단 유병률

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
전립선	전립선 평생 의사진단 경험률	-	○	-	-	
	전립선 증상 점수	-	○	-	-	
	배뇨증상 관련 삶의 질	-	○	-	-	
갑상선	갑상선 장애 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
우울증	우울증 평생 의사진단 경험률	○	○	○	○	
대사 증후군	대사증후군 인지율	○	○	○	○	
	대사증후군 매체경험률	○	-	-	-	
에이즈	에이즈 인지율	○	○	○	○	
	에이즈 매체경험률	○	-	-		
	에이즈에 대한 지식 정답률	-	○	-	○	
	에이즈에 대한 긍정적 태도율	-	○	-	○	
과민성 방광	과민성방광 증상 점수	-	-	○	-	
	과민성방광 평생 의사진단 경험률	-	-	○	-	
심뇌혈관 질환 예방관리	심뇌혈관질환 인지율	-	-	-	○	
	심뇌혈관질환 매체 경험률	-	-	-	○	
	심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율	-	-	-	○	
	심뇌혈관질환 예방생활수칙 매체 경험률	-	-	-	○	
의료이용	필요의료서비스 미치료율	○	○	○	○	'10년 치과포함 미치료율
	필요의료서비스 미치료 이유	-	○	○	○	
	필요의료서비스 미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율	○	○	○	○	
사고 및 중독	연간 사고중독 경험률	○	○	○	○	'08년 지표명: 사고중독 발생률
	연간 사고중독 건수율	○	○	○	○	'08년 지표명: 연간 사고중독 발생 건수율
	계절별 사고중독 건수율	○	-	-	-	
	원인별 사고중독 건수율	○	-	-	-	
	의도성 및 비의도성 사고분포	○	-	-	-	
	주 치료처별 분포	○	-	-	-	'08년 지표명: 연간 사고중독 치료 의료기관
	연간 낙상 경험률	-	○	-	○	
	연간 낙상 건수율	-	○	-	○	
	장소별 낙상 분포	-	○	-	○	
	원인별 낙상 분포	-	○	-	○	
	낙상에 대한 두려움	-	○	-	○	

영역	산출지표	(2010-2013) 제1기 순환조사				비고
		2010	2011	2012	2013	
활동제한 및 삶의 질	양호한 주관적 건강수준 인지율	○	○	○	○	'09-'11년 지표명: 주관적 건강주순 인지율
	침상와병 경험률	○	○	○	○	
	침상와병 일수	○	○	-	-	'08년 지표명: 연간 침상와병일수
	결근결석 경험률	○	○	○	○	
	결근결석 일수	○	○	-	-	'08년 지표명: 연간 결근결석일수
	삶의 질 지수(EQ-5D Index)	○	○	○	○	
	오늘의 건강상태(EQ-VAS)	○	○	○	○	
	행복감지수	-	○	-	○	
보건기관 이용	보건기관 이용률	○	○	○	○	
	최근 1년(365일) 동안 주로 이용한 보건기관	○	○	○	○	
	보건기관을 이용하게 되는 주된 이유	○	○	○	○	
	보건기관 이용서비스 종류	○	○	○	○	
	보건기관 서비스 만족도	○	○	○	○	
	보건기관을 이용하지 않는 이유	○	○	○	○	
	보건기관 질병 홍보 및 교육 경험률					
	고혈압, 당뇨병, 관절염	○	○	○	○	
	아토피·천식, 치매	-	○	○	○	
사회 물리적 환경	지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율	-	○	-	○	
	사회적 연결망(친척, 이웃, 친구)	-	○	-	○	
	사회활동 참여율	-	○	-	○	
심정지	심폐소생술 인지율	-	-	○	-	
	심폐소생술 교육경험률	-	-	○	-	
	심폐소생술 마네킹 실습 경험률	-	-	○	-	
	심폐소생술 시행능력률	-	-	○	-	
개인위생	손 씻기 감염병 예방 인지율	-	-	-	○	
	손 씻기 실천율(식사 전)	-	-	-	○	
	손 씻기 실천율(화장실 다녀온 후)	-	-	-	○	
	손 씻기 실천율(외출 후)	-	-	-	○	
	비누 혹은 손세정제 사용 빈도	-	-	-	○	
	손 씻기 교육 및 홍보 경험률	-	-	-	○	

참고문헌

1. 질병관리본부. 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구 보고서. 2007.
2. 질병관리본부. 2008-2013 지역건강통계 한눈에 보기(2013). 2014.
3. 보건복지부. 질병관리본부. 2011년 국민건강통계, 국민건강영양조사 제 5기 2차년도(2011). 2012.
4. 보건복지부. 질병관리본부. 2012년 국민건강통계, 국민건강영양조사 제 5기 3차년도(2012). 2013.

참여연구진

총괄책임교수	장성훈	건국대학교
지역책임교수	장성훈	건국대학교
	강길원	충북대학교
지역부책임교수	이건세	건국대학교
	김형수	건국대학교
	이영성	충북대학교
	탁양주	한국교통대학교
지역담당연구원	김복순	건국대학교
	이재옥	건국대학교
	박 준	충북대학교
	김혜정	충북대학교
지역담당연구보조원	최윤정	건국대학교
	김난희	충북대학교
조사관리담당관	이주원	충청북도청
	김교영	충청북도청
	유진희	충청북도청

2013년 충청북도 지역사회 건강통계

발　　행 : 2014. 5.

발 행 인 : 정 정 순 (충청북도 행정부지사)

편 집 인 : 장 성 훈 (충북권역 책임교수-건국대학교)

발 행 처 : 기 관 명　충청북도청

홈페이지　http://www.cb21.net

주　　소　(360-765) 충청북도 청주시 상당구 상당로 82

전화번호　(043) 220-3143

팩　　스　(043) 220-3139